INFORMACIÓN RELEVANTE:
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 8 son: Yucatán(4.2), Colima(3.8) y Baja California Sur(3.7).

  Precedidas por Campeche (3.6), Sinaloa (3.3), Tlaxcala (3.2), Nayarit (3.1) y Quintana Roo (2.9).

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

- En 12 de las 32 entidades federativas (37.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 13 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

- En la semana epidemiológica 8 , 12 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Tlaxcala (33.3%), Querétaro (21.1%), Campeche (16.1%), Zacatecas (15.8%), Coahuila (11.8%), Sonora (10%), Durango (9.1%) y Guerrero (8.3%).

Información hasta la semana epidemiológica 8 del 2015

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 8 , 12 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Tlaxcala	(33.3 %)
Querétaro	(21.1 %)
Campeche	(16.1 %)
Zacatecas	(15.8 %)
Coahuila	(11.8 %)
Sonora	(10.0 %)
Durango	(9.1 %)
Guerrero	(8.3 %)

Figura 1:

Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 8 son:

Yucatán	(4.2)
Colima	(3.8)
Baja California Sur	(3.7)

Precedidas por Campeche (3.6), Sinaloa (3.3), Tlaxcala (3.2), Nayarit (3.1) y Quintana Roo (2.9).

En 12 de las 32 entidades federativas (37.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 13 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 4 hasta la semana 8, por entidad federativa, México 2015.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	4	5	6	7	8		4	5	6	7	8
Aguascalientes	2.6	3.0	2.3	2.9	2.2	Morelos	3.4	2.9	3.2	3.7	2.8
Baja California	2.0	2.0	1.9	2.2	1.9	Nayarit	3.3	2.9	3.6	3.4	3.1
Baja California Sur	2.5	2.5	3.8	4.0	3.7	Nuevo León	1.9	1.9	2.1	2.4	2.0
Campeche	3.9	3.7	4.0	3.1	3.6	Oaxaca	2.6	2.7	3.1	3.1	2.7
Coahuila	1.7	1.4	1.6	1.7	1.9	Puebla	1.5	1.3	1.5	1.7	1.5
Colima	4.8	3.7	3.4	3.7	3.8	Querétaro	2.3	2.2	2.6	1.9	2.3
Chiapas	1.6	1.8	2.1	2.1	2.2	Quintana Roo	2.7	2.4	2.6	2.9	2.9
Chihuahua	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	San Luis Potosí	1.6	1.7	2.1	2.2	2.1
Distrito Federal	2.0	2.0	2.0	2.3	2.1	Sinaloa	4.0	3.4	3.5	3.3	3.3
Durango	1.8	1.6	2.0	2.2	2.4	Sonora	1.7	1.6	1.8	2.0	2.2
Guanajuato	1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	Tabasco	2.8	2.3	2.6	2.7	2.7
Guerrero	2.3	2.4	2.8	2.4	2.6	Tamaulipas	3.4	2.9	3.3	3.4	2.7
Hidalgo	2.0	2.0	2.3	2.3	2.3	Tlaxcala	2.4	2.0	2.5	2.4	3.2
Jalisco	3.1	2.2	2.5	2.1	1.9	Veracruz	1.5	1.6	1.8	1.5	1.5
México	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	Yucatán	3.5	3.8	4.1	4.1	4.2
Michoacán	2.6	2.2	2.2	2.3	2.0	Zacatecas	2.1	1.8	1.8	1.9	2.2
						Nacional	2.2	2.0	2.2	2.3	2.2

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 8, México, 2015.

Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2010 - 2015.



Información relevante

Gráfica 2:

Hasta la semana 8 del 2015 se registraron 191,394 casos, lo que representa un incremento del 18.9% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 8 se notificaron 2 casos nuevos de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

Acciones realizadas y datos proporcionados por el CENAPRECE, 2015.

29,237	visitas casa a casa.
4,206	casos de diarrea estudiados.
48,542	sobres de VSO entregados.

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 21%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.05%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (0.2%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (4.6%).

Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 18 de Marzo de 2015.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2014 - 2015.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

http://contraparte.mx/2015/03/10/59147/detecta-ssa-23-mil-casos-de-enfermedades-diarreicas/#.VQBiFDSUc9U

Detecta SSA 23 mil casos de enfermedades diarreicas

El nuevo encargado de despacho de la Secretaría de Salud en el estado, Mario Márquez Amezcua, dio a conocer que en lo que va de este año se han detectado más de 23 mil casos de enfermedades diarreicas, por lo que pidió a la población cuidar su alimentación y el agua que toma.

Recordó en entrevista que aguas sucias o negras no son recomendables para el lavado de trastes o frutas y verduras, además de indicar que es necesario vacunarse para evitar enfermedades ante el cambio de temperaturas.

Ante la Cuaresma, indicó que la dependencia estará al pendiente de operativos en puestos de mariscos, con el fin de evitar que se comercialice producto contaminado.

En ese sentido, que aunque el número de enfermedades ha sido alta, Puebla se ubica en los últimos lugares en registrar un mayor número de enfermedades.

Y cuando fue cuestionado sobre la contaminación del Río Atoyac, dijo que la recomendación es que las familias no hagan uso del agua que corre en este cauce, tras recordar que el gobierno del estado y el federal han solicitado a universidades participar para realizar un estudio completo con el fin de encontrar una estrategia de saneamiento.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 8 son: Yucatán(4.2), Colima(3.8) y Baja California Sur(3.7).

  Precedidas por Campeche (3.6), Sinaloa (3.3), Tlaxcala (3.2), Nayarit (3.1) y Quintana Roo (2.9).

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 12 de las 32 entidades federativas (37.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 13 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 8 , 12 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Tlaxcala (33.3%), Querétaro (21.1%), Campeche (16.1%), Zacatecas (15.8%), Coahuila (11.8%), Sonora (10%), Durango (9.1%) y Guerrero (8.3%).