INFORMACIÓN RELEVANTE:
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 5 es: Colima (3.5).

  Precedida por Nayarit (2.9), Campeche (2.8) y Sinaloa (2.8).

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 5, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Seguridad.

- En 11 de las 32 entidades federativas (34.4%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 24 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

- En la semana epidemiológica 5 , 11 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Distrito Federal (23.5%), Guanajuato (15.4%), Querétaro (11.8%), Quintana Roo (11.1%), Chihuahua (7.7%), San Luis Potosí (7.1%), Baja California Sur (6.3%) y Colima (6.1%).

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EDA

Información hasta la semana epidemiológica 5 del 2014

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 5 , 11 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Distrito Federal	(23.5 %)
Guanajuato	(15.4 %)
Querétaro	(11.8 %)
Quintana Roo	(11.1 %)
Chihuahua	(7.7 %)
San Luis Potosí	(7.1 %)
Baja California Sur	(6.3 %)
Colima	(6.1 %)

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 5 es:

Colima (3.5)

Precedida por Nayarit (2.9), Campeche (2.8) y Sinaloa (2.8).

En 11 de las 32 entidades federativas (34.4%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 24 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 5, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Seguridad.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 1 hasta la semana 5, por entidad federativa, México 2014.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
Aguascalientes	2.3	2.7	2.0	2.6	2.0	Morelos	1.6	2.5	2.4	2.9	3.0
Baja California	0.9	1.3	1.3	1.6	1.5	Nayarit	1.9	2.2	2.6	3.0	2.9
Baja California Sur	1.0	1.6	1.7	1.6	1.7	Nuevo León	1.1	1.6	1.8	1.8	1.9
Campeche	2.1	2.1	2.4	2.9	2.8	Oaxaca	1.7	2.3	2.6	2.8	2.5
Coahuila	1.0	0.9	1.2	1.2	1.2	Puebla	0.9	1.1	1.2	1.3	1.2
Colima	1.8	2.5	2.7	3.3	3.5	Querétaro	1.1	1.5	1.6	1.7	1.9
Chiapas	1.0	1.7	1.8	1.7	1.5	Quintana Roo	1.7	1.8	1.7	1.8	2.0
Chihuahua	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	San Luis Potosí	1.0	1.2	1.8	1.4	1.5
Distrito Federal	1.2	1.5	1.9	1.7	2.1	Sinaloa	1.6	2.4	2.8	3.0	2.8
Durango	1.2	1.4	1.7	2.0	1.6	Sonora	1.1	1.3	1.3	1.6	1.4
Guanajuato	0.9	1.2	1.2	1.3	1.5	Tabasco	1.6	2.5	2.8	2.6	2.5
Guerrero	1.6	2.1	2.3	2.5	2.5	Tamaulipas	1.1	1.4	1.8	1.7	1.4
Hidalgo	1.0	1.5	1.6	1.6	1.5	Tlaxcala	1.3	1.5	1.8	2.0	1.9
Jalisco	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	Veracruz	0.8	1.1	1.3	1.5	1.4
México	1.0	1.5	1.7	1.7	1.8	Yucatán	1.9	2.7	2.2	2.4	2.4
Michoacán	1.1	1.4	1.7	1.8	1.7	Zacatecas	1.0	1.3	1.2	1.4	1.4
						Nacional	1.2	1.5	1.7	1.8	1.8

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 5, México, 2014.

Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2009 - 2014.



Información relevante

Gráfica 2:

Hasta la semana 5 del 2014 se registraron 88,431 casos, lo que representa un decremento del 26.9% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 5 se notifico 2 caso nuevo de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

Acciones realizadas y datos proporcionados por el CENAPRECE, 2014.

879,922	visitas casa a casa.
188,772	casos de diarrea estudiados.
1,510,862	sobres de VSO entregados.

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 24%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.05%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (91.5%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (6%).

Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 13 de febrero de 2014.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2013 - 2014.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

http://yancuic.com/yancuic/noticia/41461

Cuenta Durango con equipo para vigilar enfermedades diarreicas agudas

Durango, Dgo.- Tras la importancia de contar con las herramientas necesarias en el campo de las enfermedades infecciosas, en el 2013, la Secretaría de Salud del Estado de Durango (SSD), estableció como estrategia complementaria de la vigilancia epidemiológica de Enfermedades Diarreica Aguda (EDAS), el NuTraVE; Núcleos Trazadores de Vigilancia Epidemiológica.

Eduardo Díaz Juárez, titular de la SSD, señaló que en base a la sensibilidad y preocupación del Gobernador del Estado, Jorge Herrera Caldera, por mantener una buena salud en los duranguenses en el estado, se han implementado cuatro núcleos Trazadores (NuTraVE) conformados por seis hospitales y cuatro unidades de salud de primer nivel, todos ellos ubicados en lugares estratégicos de las cuatro Jurisdicciones Sanitarias.

Cabe resaltar que los NuTraVE, constituyen un sistema de atención novedoso de vigilancia centinela con enfoque sindromático; facilita la vigilancia de agentes infecciosos que no son factibles mediante estrategias del sistema convencional; identifica de manera oportuna los potenciales riesgos a la salud, y emite recomendaciones correspondientes para el establecimiento de medidas de prevención y control eficaces.

Elementos de comunicación a la comunidad

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 5 es: Colima(3.5).

  Precedida por Nayarit (2.9), Campeche (2.8) y Sinaloa (2.8).

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 5, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Seguridad.
- En 11 de las 32 entidades federativas (34.4%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 24 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 5 , 11 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Distrito Federal (23.5%), Guanajuato (15.4%), Querétaro (11.8%), Quintana Roo (11.1%), Chihuahua (7.7%), San Luis Potosí (7.1%), Baja California Sur (6.3%) y Colima (6.1%).