

# Salud Sexual y Reproductiva



**CHIAPAS**






La salud sexual y reproductiva (SSR) es un componente fundamental del bienestar y libertad de las personas. A partir de la Ley General de Población de 1974, el estado mexicano establece una política de población con miras a la reducción de la fecundidad. Asimismo, se hace una modificación al artículo 4o constitucional para garantizar el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos. Actualmente, el Programa Nacional de Población 2014-2018, en el Objetivo 2 establece cinco estrategias con un total de 22 líneas de acción que buscan ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para mujeres y hombres.

A continuación se presentan los principales indicadores de SSR para Chiapas (CS), comparando con la República Mexicana (RM), obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, con la finalidad de proveer insumos que orienten la toma de decisiones y el establecimiento o seguimiento de políticas públicas que permitan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población.

## ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

**Gráfica 1. Chiapas. Pirámides de población y porcentaje de Mujeres en Edad Fértil (MEF<sup>1</sup>) por grupos de edad, 2015 y 2030**



Fuente: CONAPO, Proyecciones de la población de México, 2010-2030.

<sup>1</sup> Mujeres en Edad Fértil: mujeres que tienen entre 15 a 49 años de edad.


## INICIO DE LA VIDA SEXUAL

Algunas de las transformaciones implícitas en el tránsito de la niñez a la adultez tienen que ver con la sexualidad y el inicio de la vida reproductiva, que se estudian a partir de transiciones significativas como la primera relación sexual o el inicio de la trayectoria anticonceptiva.

### Edad mediana<sup>2</sup> a la primera relación sexual

**17.7 años**

CS  
2009



**18.0 años**

RM  
2009

**17.4 años**

CS  
2014

**17.7 años**

RM  
2014

### Edad mediana<sup>2</sup> al uso del primer método

**22.4 años**

CS  
2014




**21.9 años**

RM  
2014

La mitad de las mujeres de **Chiapas** tuvo su primera relación sexual en la adolescencia; sin embargo, el uso del primer método anticonceptivo es hasta **cinco años después**

**Gráfica 2.** Chiapas. Porcentaje de MEF que usaron algún método anticonceptivo en la primera relación sexual por grupos de edad, 2009 y 2014




Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 2009 y 2014

### Adolescentes que usaron un método en su primera relación sexual

**19.8%**

CS  
2014




**54.8%**

RM  
2014


Las adolescentes son el tercer grupo con **mayor uso** de algún método anticonceptivo en su **primera relación sexual**

<sup>2</sup> Para la generación de mujeres que tenían entre 25 a 34 años de edad al momento de la entrevista.

El método más usado por las MEF de Chiapas en su primera relación sexual es el condón




Las adolescentes son el cuarto grupo con mayor uso del condón en su primera relación sexual




77.6%  
CS  
2014

Razones de no uso de método en la primera relación sexual



Porcentaje de adolescentes que no usaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual porque "no creyeron que podrían quedar embarazadas"




Las mujeres sin escolaridad que no usaron métodos por desconocimiento

## MUJERES EN EDAD FÉRTIL SEXUALMENTE ACTIVAS (MEFSA)


La evaluación de la Salud Sexual y Reproductiva, se realizaba comúnmente con base en las mujeres en edad fértil casadas o unidas (MEFU), bajo el supuesto de que la exposición al riesgo de embarazo o de contraer alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS), se iniciaba con el matrimonio o la unión consensual, sin embargo, la realidad del ejercicio de la sexualidad no es imperativo del matrimonio o unión y hace necesario considerar a todas las mujeres que tengan actividad sexual<sup>3</sup> por estar expuestas a los riesgos mencionados.



### Prevalencia anticonceptiva en las adolescentes




### Prevalencia anticonceptiva<sup>4</sup> en MEFSAs



Son las adolescentes quienes hacen menor uso de métodos anticonceptivos de todas la MEFSAs

**Gráfica 3.** Chiapas. Porcentaje de MEFSAs que usan métodos anticonceptivos por grupos de edad, 2009 y 2014



Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 2009 y 2014

<sup>3</sup> Se considera a una mujer sexualmente activa si declaró haber tenido al menos una relación sexual en el mes previo al levantamiento de la encuesta.

<sup>4</sup> Porcentaje de mujeres que hacen uso de métodos anticonceptivos; es el cociente de las mujeres en edad fértil (unidas o sexualmente activas, según el caso) que declararon estar usando, ellas o sus parejas, un método anticonceptivo al momento de la encuesta, cualquiera que éste fuera, entre el total de esas mujeres, multiplicado por cien.

## Uso de métodos modernos<sup>5</sup> de las MEFSA




## Participación masculina<sup>6</sup> en la Prevalencia Anticonceptiva de MEFSAs

A través de este indicador se da cuenta del involucramiento de los hombres en las decisiones y responsabilidades que conlleva ejercer una vida sexual y reproductiva sana; el avance que muestre dicho indicador contribuirá a cerrar brechas de desigualdad de género.

La participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de MEFSAs pasó de **10.4%** en 2009 a **10.5%** en 2014, dato menor al nacional de **18.0%**

## Lugar de obtención<sup>7</sup> de métodos anticonceptivos en Chiapas, 2014



El porcentaje de MEFSAs que obtiene el anticonceptivo en instituciones públicas en Chiapas es mayor al nacional (**69.4%**)

<sup>5</sup> Los métodos modernos son métodos que ayudan a prevenir el embarazo a través de elementos ajenos al cuerpo y se dividen en métodos temporales y definitivos. Los métodos temporales pueden suspenderse en cualquier momento y la fertilidad retornará si la mujer desea quedar embarazada. Los métodos modernos definitivos son procedimientos quirúrgicos que evitarán que el hombre y la mujer vuelvan a tener hijos de por vida.

<sup>6</sup> Se refiere al porcentaje de mujeres en edad fértil (unidas o sexualmente activas, según el caso) que declaran que su pareja hace uso de métodos anticonceptivos como la vasectomía, condón masculino, o bien, los métodos tradicionales (ritmo y retiro).


<sup>7</sup> Por instituciones públicas se entienden: IMSS, ISSSTE, SS, DIF. Las instituciones privadas son farmacia o tienda y consultorio, clínica u hospital privado.

## NECESIDAD INSATISFECHA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS<sup>8</sup> (NIA) EN MEFSA

La necesidad insatisfecha de anticonceptivos es un indicador que permite analizar la relación de los patrones reproductivos con el acceso a la anticoncepción, ya que hace referencia a las mujeres que no usan ningún anticonceptivo a pesar de manifestar su deseo expreso de no querer tener hijos por un tiempo (necesidad para espaciar) o nunca más (necesidad para limitar).

La NIA total para las MEFSA de Chiapas es de **16.3%**, dato superior al nacional de **10.9%**.  
Las mujeres de 15 a 24 años son las que presentan mayor necesidad insatisfecha con **32.3%**, al igual que a nivel nacional con **21.9%**.

**Gráfica 4.** Chiapas. Necesidad insatisfecha de anticonceptivos de MEFSA, 2014




Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 2014

<sup>8</sup> El método de cálculo de este indicador cambió con respecto a 2009; la estimación que realiza CONAPO para 2014 se basa en la adaptación de Juárez y Gadyet (2016) de la metodología usada por la ONU de Bradley, Sarah E.K., Trevor N. Croft, Joy D. Fishel y Charles F. Westoff, (2012) "Revising Unmet Need for Family Planning", DHS Analytical Studies No. 25. Calverton, Maryland, USA: ICF International. Disponible en: <http://dhsprogram.com/pubs/pdf/AS25/AS25%5B12June2012%5D.pdf>




## MUJERES EN EDAD FÉRTIL UNIDAS<sup>9</sup> (MEFU)



En Chiapas en 2014, **61.1%** de las MEFU son mujeres unidas. La mayor concentración de MEFU se encuentra en el grupo de edad de **35 a 39 años** con **80.7%**

### Prevalencia anticonceptiva en MEFU




### Prevalencia anticonceptiva en las adolescentes



Las adolescentes unidas son quienes menos usan métodos de todas las MEFU

**Gráfica 5.** Chiapas. Porcentaje de MEFU que usan métodos anticonceptivos por grupos de edad, 2009 y 2014



Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 2009 y 2014

<sup>9</sup> Mujeres de 15 a 49 años de edad que se encuentran casadas o viven en unión libre.

## Uso de métodos modernos de las MEFU




## Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de MEFU

Actualmente la participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de MEFU a nivel nacional es de **14.4%** dato que se mantuvo igual desde 2009. En Chiapas el nivel de este indicador es inferior al nacional con **7.8%** en 2009 y **8.8%** en 2014




## Lugar de obtención de métodos anticonceptivos en Chiapas, 2014



El porcentaje de MEFU que obtiene el anticonceptivo en instituciones públicas en Chiapas es mayor al nacional (**74.6%**)


## NECESIDAD INSATISFECHA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (NIA) EN MEFU

### NIA en mujeres unidas



La NIA total para las MEFU de Chiapas es de **18.5%**, dato superior al nacional de **11.4%**.  
Las mujeres de 15 a 24 años son las que presentan mayor necesidad insatisfecha con **34.3%**, al igual que a nivel nacional con **23.5%**.

Gráfica 6. Chiapas. Necesidad insatisfecha de anticonceptivos de MEFU, 2014



Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la ENADID, 2014.

## PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS

Las preferencias reproductivas hacen referencia a la planeación o deseo del embarazo, al número ideal de hijos, u otros indicadores del comportamiento reproductivo que influyen en los niveles de la fecundidad.

### Del total de mujeres que estaban embarazadas al momento de la encuesta, declararon que su embarazo:

RM 2014

**63.6%**

Era planeado

**36.4%**

No planeado o no deseado



CS 2014

**72.3%**

Era planeado

**27.7%**

No planeado o no deseado

El mayor porcentaje de embarazo no planeado o no deseado se encuentra entre las mujeres de **15 a 19 años** de edad con **51.5%**, y son también quienes mayor Necesidad Insatisfecha de Anticonceptivos presentan, tanto de las MEFSa como de las MEFU



## FECUNDIDAD


### Tasa Global de Fecundidad (TGF)<sup>10</sup>

**2.21 hijos por mujer**

RM  
2014

**2.89 hijos por mujer**

CS  
2014



### Tasa de Fecundidad Adolescente (TFA)<sup>11</sup>

**77.04**

IC 90% [74.12-79.96]

RM  
2014

**93.25**

IC 90% [80.42-106.07]

CS  
2014

<sup>10</sup> Es el número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años de edad).


<sup>11</sup> IC 90%: intervalos de confianza al 90%

## SALUD MATERNO INFANTIL

La salud materno infantil es uno de los componentes de la salud sexual y reproductiva; se centra en la salud de la mujer y del niño durante el embarazo, parto y posparto. El curso del embarazo influye en gran medida en la salud de la madre, que a su vez impacta en la salud del recién nacido, por ello resulta tan relevante medir el avance en los indicadores asociados al tema.

### Atención prenatal<sup>12</sup> durante el primer trimestre de embarazo

**81.8%**  
CS  
2014



**86.9%**  
RM  
2014

El número promedio de revisiones prenatales fue de **7.3** inferior al promedio nacional de **8.9**

### Durante las consultas a las mujeres en Chiapas:

**92.4%** escucharon y revisaron los movimientos del bebé

**92.3%** se les tomó la presión arterial

**91.9%** se les indicó y proporcionó ácido fólico, hierro o algún otro complemento vitamínico

**86.8%** se les aplicó la vacuna contra el tétanos

**76.1%** se les realizó examen de sangre

**75.8%** se les realizó examen de orina

**75.0%** les enseñaron o explicaron cómo dar a su bebé leche materna

**60.0%** les ofrecieron un método anticonceptivo para después de su embarazo



**52.1%** le realizaron la prueba para detectar VIH/Sida



<sup>12</sup> Comprende cualquier revisión del desarrollo y evolución del embarazo, realizada por personal capacitado (médicos, enfermeras, auxiliares o promotores de salud y parteras).

## Tipo de atención del parto

En Chiapas el porcentaje de partos por cesárea fue **29.9** en 2014, inferior al porcentaje nacional de **46.3**<sup>13</sup>



El **68.9%** de los partos fueron atendidos por un **médico**, proporción inferior a la observada para el país (**94.8%**). Los niveles más bajos de atención por un médico los presentan las mujeres sin escolaridad (**32.2%**)

## Lactancia materna

La práctica de la lactancia es uno de los determinantes más importantes de la salud en el primer año de vida del recién nacido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la lactancia materna sea exclusiva hasta los seis meses y continuada dos años o más, si el niño y la madre así lo desean.

### Recién nacidos que iniciaron el proceso de amamantamiento

**93.0%**  
CS  
2014



**92.2%**  
RM  
2014

### Motivos de no amamantamiento

**38.7%** nunca tuvo leche

**34.4%** el niño la rechazó

**18.2%** por enfermedad de ella o del niño



La duración promedio de la lactancia fue de **11.9 meses** en Chiapas y de **9.2 meses** a nivel nacional



La edad de incorporación de alimentos distintos a la leche materna (ablactación), por distribución porcentual: **59.8%** de recién nacidos en Chiapas lo hicieron antes de los dos meses, **20.0%** de los dos a los tres meses, y **14.2%** de los 4 a 7 meses



<sup>13</sup> La Norma Oficial Mexicana NOM-007-ssa2-1993 establece que toda unidad médica con atención obstétrica debe contar con lineamientos para la indicación de cesárea, cuyo índice ideal se recomienda sea del 15 por ciento en hospitales de segundo nivel, y de 20 por ciento en los de tercer nivel en relación con el total de nacimientos.





**CONAPO**

CONSEJO NACIONAL DE  
POBLACIÓN

<http://www.gob.mx/conapo>



@CONAPO\_mx



/Consejo Nacional de Población



Principales resultados

**ENADID 2014**

