

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida

Mujeres y VIH

**México
Cierre 2014**




Contexto Epidemiológico



Casos acumulados de VIH y Sida, por sexo: 1983-2014

n = 228,200 casos




- Por cada caso acumulado en mujeres existen cuatro casos acumulados en hombres.

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Casos nuevos de VIH y Sida, por sexo: 2014



- Los casos nuevos de VIH y Sida del 2014, representan el 4% de todos los casos acumulados en el periodo 1983-2014.
- La proporción de casos en hombres y mujeres en el año 2014 es similar a la observada en años previos.
- De igual forma, para el año 2014, por cada caso registrado en mujeres, existen de cuatro a cinco casos en hombres.


Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Proporción de casos de VIH y Sida, por año de diagnóstico y sexo

- No se ha registrado cambios en las proporciones por sexo de casos de VIH y Sida por año de diagnóstico.


n = 228,200 casos



Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Casos acumulados de VIH y Sida, por sexo y grupo de edad: 1983-2014




- La mayor proporción de casos para ambos sexos está en el grupo etario de 25 a 34 años (hombres 38.4% y 34.5% mujeres).

Nota: La población ha sido dividida entre 10 habitantes para su mejor visualización

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Casos nuevos de VIH y Sida, por sexo y grupo de edad: 2014




- En el año 2014, la mayor proporción de casos en hombres está en el grupo etario de 20 a 29 años de edad, mientras que en mujeres se encuentra en el grupo de los 25 a 34 años (40.7% y 35.1%, respectivamente)

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Proporción de casos acumulados de VIH y sida, por sexo y grupo de edad: 1983-2014

n = 228, 200 casos




Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

- Los casos acumulados hasta el momento son mayormente en población en edad reproductiva (84% en mujeres y 87% en hombres). Antes de los 25 años, la proporción de casos en mujeres es mayor que en hombres, pero después de esta edad, la relación se invierte; lo cual está relacionado con la mayor supervivencia de las mujeres en los primeros años de vida y la principal vía de transmisión en esas edades (perinatal) mientras que, de los 25 años en adelante, la principal vía de transmisión es la sexual y además los hombres constituyen el sexo más afectado por el VIH en nuestro país.

Proporción de casos nuevos de VIH y Sida, por sexo y grupo de edad: 2014

n = 9,573 casos




Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Casos de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

- Entre los casos nuevos, la mayor proporción de ellos sigue estando entre la población en edad reproductiva en ambos sexos (90.8% en hombres y 86.8% en mujeres) y también se conserva que, antes de los 25 años, las proporciones de casos en mujeres son mayores que en hombres, después de esta edad la relación se invierte.

Proporción de casos acumulados de VIH y Sida en mujeres, por entidad federativa: 1983-2014




- 62.5% de las entidades presentan una proporción de casos acumulados de VIH y sida en mujeres mayor a la nacional (20%).
- Existen cinco entidades en las cuales es mayor la proporción de casos en mujeres, pues tienen las más altas proporciones de casos acumulados: Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.
- Por otro lado, las menores proporciones de casos en mujeres se observan en: Ciudad de México (D.F.), Nuevo León, Yucatán y Querétaro.

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Proporción de casos nuevos de VIH y sida en mujeres, por entidad federativa: 2014




- Para el año 2014, menos de la mitad de las entidades presentan una proporción de casos en mujeres mayor a la nacional (20.5%).
- Las entidad donde existe la más alta proporción de casos en mujeres: Chiapas, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas.
- Las entidades con menores proporciones de casos en mujeres: Ciudad de México (D.F.), San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Nuevo León.

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Incidencia registrada de casos de VIH y Sida en mujeres, por entidad federativa: 2014




- 47% de las entidades presentan una incidencia registrada de casos en mujeres mayor a la registrada a nivel nacional.
- Las incidencias registradas son más altas en los estados de la región sur del país, en comparación con el resto del territorio nacional.

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Distribución de los casos acumulados de las mujeres que viven con VIH, por grupos de edad: 1983-2014




- La mitad de los casos acumulados tienen entre 25 y 39 años de edad.
- 3% de los casos son mujeres adultas mayores, se espera que por la dinámica poblacional del país, este porcentaje se incremente y con ello la necesidad de contar con tratamiento integral que contemple las enfermedades cronicodegenerativas agregadas.

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Casos acumulados de VIH y Sida en menores de 15 años de edad, por categoría de transmisión y sexo: 1983-2014




• En este grupo etario, la principal vía de transmisión es perinatal (87% en hombres y a 93% mujeres).

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.


Casos nuevos de VIH y Sida en menores de 15 años de edad, por categoría de transmisión y sexo: 2014



- La principal vía de transmisión en los casos nuevos en este grupo de edad continúa siendo la perinatal.
- La proporción de casos por vía sexual ha aumentado su proporción, en virtud a la disminución de la transmisión sanguínea que ha sido controlada (transfusión sanguínea) y las personas UDI (poco prevalente en esta población).

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.


Casos acumulados de VIH y Sida en personas de 15 años de edad o más, por categoría de transmisión y sexo: 1983-2014



Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.


Casos nuevos de VIH y Sida en personas de 15 años de edad o más, por categoría de transmisión y sexo: 2014



Nota: Datos de todo el sector salud


Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Cascada de la atención al VIH en México, 2014



Fuente: SS/CENSIDA. Boletín de Atención Integral de Personas con VIH. 3° Ed. Vol. 1(1). Enero-marzo 2015.

Cascada de la atención al VIH en México: Hombres y Mujeres, 2014




• Las mujeres que viven con VIH son detectadas en mayor proporción que los hombres, probablemente por su contacto más frecuente con los servicios de salud.

• Sin embargo, en el resto de los pilares de la cascada de intención, prácticamente no existen diferencias por sexo.

Fuente: SS/CENSIDA. Cascada del Continuo de la Atención del VIH. México, 2014.

Mortalidad por VIH en mujeres, por entidad federativa: 2008 – 2014

• 37.5% de las entidades con mortalidad en mujeres por arriba del promedio nacional




Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: INEGI; SS. (2016, Mayo). *Cubo de defunciones 1979-2014*. Recuperado de <http://pda.salud.gob.mx/cubos/cmortalidadxp.html>. Consultado el día 31 de mayo de 2016.

Procesado por SS/Censida.

Mortalidad por VIH en hombres, por entidad federativa: 2008 – 2014

- 50 % de las entidades con mortalidad en hombres por arriba del promedio nacional
- Las entidades con tasas de mortalidad más altas en hombres también lo son con respecto a las tasas en mujeres.



Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: INEGI; SS. (2016, Mayo). *Cubo de defunciones 1979-2014*. Recuperado de <http://pda.salud.gob.mx/cubos/cmortalidadxp.html>. Consultado el día 31 de mayo de 2016.


Procesado por SS/Censida.

Conocimiento y Prevención de la Infección por VIH y otras ITS



Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años de edad que identifica que una persona de apariencia sana puede estar viviendo con VIH

"¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"




Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2014.

Nota: Datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 de la CONADIC.

Trabajadoras sexuales: programas de prevención

- 3 de cada 10 MTS sabe a donde acudir si desea realizarse una prueba de VIH y ha recibido preservativos en los últimos 12 meses a través de programas de medicina preventiva.
- La proporción de las MTS que han tenido contacto con programas de prevención es 9% menor entre las menores de 25 años en comparación con las mayores de esta edad.



Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2014.


***Notas**

ND: Dato no disponible

MTS: Mujeres trabajadoras sexuales (18 a 60 años, originarias de Guadalajara y Puerto Vallarta en Jalisco; Toluca, Ecatepec y Netzahualcóyotl en Estado de México; y Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán en Veracruz). Gutiérrez JP et. al. "Informe técnico analítico sobre la prevalencia del VIH; así como factores de riesgo y vulnerabilidad en personas que se dedican al trabajo sexual; y en personas transexuales y personas transgénero". INSP. México, 2012.

HTS: Hombres trabajadores sexuales. INSP/CIEE. Resultados principales de la encuesta de seroprevalencia en sitios de encuentro de HSH. Vol.3. No. 3. 2012

Trabajadoras y trabajadores sexuales: Uso de preservativo



- 8 de cada 10 MTS declaró el uso de preservativo en su última relación sexual con un cliente.
- No se observan diferencias por edad.

Uso de preservativo**

■ MTS ■ HTS ■ < 25 años ■ ≥ 25 años

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2014.

**Notas

ND. Dato no disponible

MTS: Mujeres trabajadoras sexuales (18 a 60 años, originarias de Guadalajara y Puerto Vallarta en Jalisco; Toluca, Ecatepec y Netzahualcóyotl en Estado de México; y Veracruz, Coahuila de Zaragoza-Minatitlán en Veracruz). Gutiérrez JP et. al. "Informe técnico analítico sobre la prevalencia del VIH; así como factores de riesgo y vulnerabilidad en personas que se dedican al trabajo sexual; y en personas transexuales y personas transgénero". INSP. México, 2012.


HTS: Hombres trabajadores sexuales. INSP/CIEE. Resultados principales de la encuesta de seroprevalencia en sitios de encuentro de HSH. Vol.3. No. 3. 2012

Detección de la Infección por VIH y otras ITS



Detecciones de VIH realizadas: Hombres y mujeres, 2014

2,409,372 detecciones realizadas a nivel nacional, de las cuales 1,961,509 se aplicaron a mujeres




Fuente: SS/Censida. Boletín del Grupo de Información Sectorial en VIH, sida e ITS No. 12 (con cifras diciembre 2014). México, 2015.

Nota: Las detecciones en mujeres embarazadas incluyen a todo el sector salud. Por otro lado, las detecciones en hombres y mujeres (no embarazadas) sólo se incluye a SS, IMSS, Pemex e ISSSTE .

Incidencia registrada de sífilis: Mujeres y Hombres, 2014

- La incidencia registrada de sífilis en la población de adultos es 4.3 x 100 mil hab.*
- Se estima que por cada 13 casos registrados en hombres, se registran 10 en mujeres.



***Adultos reportados con sífilis**


■ Hombres ■ Mujeres

*Tasa por 100 mil personas de 15 años de edad y más.

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

Incidencia registrada de úlceras genitales: Mujeres y Hombres, 2014



• Mayor incidencia registrada de úlceras genitales en hombres, la cual se relaciona con un mayor número de casos registrados de sífilis adquirida en el sexo masculino.

****Adultos notificados con úlcera genital**

■ Hombres ■ Mujeres

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.


*Tasa por 100 mil personas.

**Úlcera genital incluye: sífilis adquirida, chancro blando y herpes genital.

Nota: Datos de todo el sector salud

Trabajadoras y Trabajadores Sexuales: Detección del VIH

- Casi la totalidad de las MTS declaró haberse realizado una prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocieron sus resultado; en contraste con 6 de cada 10 HTS.
- También, se observan diferencias por edad, que sitúan a las personas mayores de 25 años, con un mayor detección del VIH.



Fuente: SS/Censida. [Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida](#). México, 2014.


**Notas

ND. Dato no disponible

MTS: Mujeres trabajadoras sexuales (Edades entre 18 y 60 años, provenientes de Jalisco, Estado de México y Veracruz). Los datos solo son representativos para las MTS que participaron en el estudio de Gutiérrez JP et. al. "Informe técnico analítico sobre la prevalencia del VIH; así como factores de riesgo y vulnerabilidad en personas que se dedican al trabajo sexual; y en personas transexuales y personas transgénero". INSP. México, 2012.

HTS: Hombres trabajadores sexuales (Muestra con representatividad nacional para el año 2012 y 2013)

Trabajadoras y Trabajadores Sexuales: Prevalencia del VIH



- La proporción de MTS que viven con VIH es 23.5% menor en comparación con la registrada en HTS.
- Los datos por edad no muestra diferencias significativas.

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2014.

***Notas


ND. Dato no disponible

MTS: Mujeres trabajadoras sexuales (Edades entre 18 y 60 años, provenientes de Jalisco, Estado de México y Veracruz). Los datos solo son representativos para las MTS que participaron en el estudio de Gutiérrez JP et. al. "Informe técnico analítico sobre la prevalencia del VIH; así como factores de riesgo y vulnerabilidad en personas que se dedican al trabajo sexual; y en personas transexuales y personas transgénero". INSP. México, 2012.

HTS: Hombres trabajadores sexuales (Muestra con representatividad nacional para el año 2012 y 2013)

Trabajadoras y Trabajadores Sexuales: Detección de Sífilis, 2014

- En 2014, se realizaron 5,168 detecciones de sífilis a MTS y HTS en la Secretaría de Salud.
- El porcentaje de pruebas reactivas a sífilis es mayor entre HTS (4.7%) que en MTS.
- Se registraron cinco prueba de detección de sífilis realizadas en MTS por cada una aplicada en HTS.



Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

***Notas

MTS: Mujeres trabajadoras sexuales.


HTS: Hombres trabajadores sexuales.

Solo se incluye información de la SS correspondiente a los servicios especializados que atienden a personas con VIH e ITS (CAPASITS)

Detección y Prevención de la Transmisión Vertical del VIH



Cascada de atención de mujeres embarazadas con VIH en la SS y el Sector Salud, 2014




**Al cierre de 2014 se diagnosticaron 90 casos de TV de VIH, sin embargo, solo 21 nacieron y diagnosticaron en ese año. Se espera que el número de casos notificados aumente en lo subsecuente por el retraso que se da en este reporte.

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida. Cierre 2014.

Detección y proporción de pruebas de sífilis positivas en mujeres embarazadas, 2014



Nota: En los datos solo se incluye a SS, IMSS y Pemex


Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

Atención y Tratamiento de la Infección por VIH



Atención de la infección por el VIH, por sexo y edad, 2014

- Se mantienen incorporados en servicios de salud un total de 98,638 personas con VIH:
 - 22% son mujeres
 - 6% son menores de 15 años de edad.



Nota: En los datos solo se incluye a SS e IMSS

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

Atención de la infección por el VIH, por sexo y edad, 2014


- Se incorporaron por primera vez a servicios de salud un total de 16,729 personas con VIH:
 - 21% son mujeres
 - 6% son menores de 15 años de edad.
- Por cada 10 hombres con VIH que ingresan por primera vez a servicios de salud del IMSS y SS, hay 3 mujeres.



Nota: En los datos solo se incluye a SS, IMSS, ISSSTE, Pemex y Semar.

Fuente: SS/Censida. [Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida](#). México, 2015.

Personas en TAR, por sexo: 2014



Personas en TAR de entre todos los que viven con VIH*


- 51.3% de las personas que se estiman viven con VIH están en TAR.
- 21% de las personas en TAR son mujeres.
- No existen diferencias por sexo en el acceso a TAR.
- 2,710 mujeres iniciaron TAR por primera vez en el año 2014. (1% del total de mujeres en TAR)

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

Personas en TAR a 12 meses de haberla iniciado, por sexo: 2014


- 83% de las personas que se estiman viven con VIH están en TAR a 12 meses de haberlo iniciado.
- 18.8% son mujeres.
- 64% de las personas que no continuaron en TAR fue por abandono.
- Se observa ligeras diferencias por sexo, en la información reportada para este año.



Nota: En los datos solo se incluye a SS, Pemex, Sedena y Semar.

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

Personas en TAR a 24 meses de haberla iniciado, por sexo: 2014




- 75% de las personas que se estiman viven con VIH están en TAR a 24 meses de haberla iniciado.
- 20.8% son mujeres.
- 68% de las personas que no continuaron en TAR fue por abandono.
- Se observan diferencias por sexo y edad, en la información reportada para este año.

Nota: En los datos solo se incluye a SS, Pemex y Sedena.

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

Personas en TAR a 60 meses de haberla iniciado, por sexo: 2014




- 66% de las personas que se estiman viven con VIH están en TAR a 60 meses de haberla iniciado.
- 22.3% son mujeres.
- 62% de las personas que no continuaron en TAR fue por abandono.
- No se observan diferencias por sexo o edad.

Nota: En los datos solo se incluye a SS, Pemex, Sedena y Semar.

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

Supresión viral y Carga Viral indetectable, por sexo y edad: 2014

• En supresión viral y carga viral indetectable, no se observan diferencias por sexo y edad.




Nota: En los datos solo se incluye a SS, Pemex y Sedena.

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

Casos nuevos de tuberculosis en personas que viven con VIH y que recibieron tratamiento, por sexo y edad: 2014

- Un total de 755 personas con VIH y Tuberculosis recibieron tratamiento*
- 16% de los casos son mujeres.
- 99% de los casos con 15 años de edad y más.
- 94% se incorporaron por primera vez a servicios de salud para la atención de la infección por VIH.



Nota: En los datos solo se incluye a SS, IMSS, Pemex, Sedena y Semar.

Fuente: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.



CENSIDA

Centro Nacional para la Prevención
y el Control del VIH y el sida

tel@sida
5207-4077
01 800 712-0889

www.censida.salud.gob.mx  /censida  @censida

