## INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

Por incidencia\*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica
10 fueron:

Zacatecas (1139), Tlaxcala (1086.1) y Aguascalientes (1052.2).

Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (969.9), Colima (779.4), Hidalgo (765.2), Durango (733.9), Querétaro (732.3) y Tamaulipas (702).

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 5%, con respecto a la semana 7.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 10, con respecto a la anterior fueron: Guerrero (22.8%), Yucatán (12.5%), Baja California (12.4%), Hidalgo (7.2%), Tabasco (5.3%), Jalisco (3.7%), México (3.6%) y Colima (2.2%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 10, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Epidemia.





## Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica

**IRA** 

# Información hasta la semana epidemiológica 10 del 2017

	Información relevante	
Tabla 1:		

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 10, con respecto a la anterior fueron:

Guerrero	(	22.8	%)
Yucatán	(	12.5	%)
Baja California	(	12.4	%)
Hidalgo	(	7.2	%)
Tabasco	(	5.3	%)
Jalisco	(	3.7	%)
México	(	3.6	%)
Colima	(	2.2	%)

### Figura 1:

Por incidencia\*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 10 fueron:

Zacatecas	( 1139	.0)
Tlaxcala	( 1086	.1)
Aguascalientes	( 1052	2.2)

Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (969.9), Colima (779.4), Hidalgo (765.2), Durango (733.9), Querétaro (732.3) y Tamaulipas (702).

En la semana epidemiológica 10, a nivel nacional se notificaron 562 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 5%, con respecto a la semana 7.

## Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 10, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Epidemia.

\*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Tabla 1. Comparativo de incidencia\* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 6 hasta la semana 10 de 2017 por entidad federativa, México.

Entidad	S	emana	Epidem	iológica	a	Entidad	S	emana	Epidem	iológica	a
Emada					10						10
Aguascalientes	921.3	1156.5	1193.3	1065.8	1052.2	Morelos	495.9	524.8	558.0	602.2	610.6
Baja California	522.3	554.5	611.2	529.6	603.5	Nayarit	666.7	708.1	700.6	680.8	702.9
Baja California Sur	1014.8	989.7	978.4	1010.6	969.9	Nuevo León	726.2	715.9	783.6	751.2	651.8
Campeche	530.0	541.0	543.2	505.9	485.2	Oaxaca	453.2	472.0	438.5	393.1	373.3
Coahuila	608.8	623.8	617.5	543.0	508.8	Puebla	532.5	600.9	693.9	643.5	628.4
Colima	585.4	633.0	690.4	750.5	779.4	Querétaro	662.1	796.0	870.9	797.0	732.3
Chiapas	244.4	253.7	246.4	248.5	252.0	Quintana Roo	563.2	535.8	515.0	511.7	523.0
Chihuahua	741.5	796.2	819.5	709.4	634.0	San Luis Potosí	691.2	711.1	701.5	639.9	617.7
Distrito Federal	559.5	649.7	653.3	702.5	648.7	Sinaloa	790.5	824.9	783.4	703.3	652.3
Durango	671.3	776.6	762.1	741.6	733.9	Sonora	607.7	595.3	613.6	594.7	608.5
Guanajuato	578.5	621.0	604.4	552.7	533.5	Tabasco	468.2	461.7	477.0	440.1	467.9
Guerrero	389.1	378.4	415.8	320.5	395.6	Tamaulipas	761.3	757.1	780.3	682.1	702.0
Hidalgo	717.7	745.7	801.1	705.7	765.2	Tlaxcala	911.2	1021.8	1085.3	1124.0	1086.1
Jalisco	447.9	481.7	480.0	452.5	474.4	Veracruz	340.2	349.0	364.6	349.8	315.6
México	420.5	500.7	511.4	513.1	539.3	Yucatán	570.5	590.1	537.9	447.4	509.6
Michoacán	444.1	478.4	460.9	468.7	463.9	Zacatecas	1127.5	1255.6	1302.4	1176.2	1139.0
						Nacional	542.8	585.2	599.6	568.2	561.8

Figura 1. Incidencia\* de IRA durante la semana, 10 de 2017 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2012 - 2017.



### Información relevante

## Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 4.1% en el número de casos.

### Gráfica 3:

La tasa de \*incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 10 en menores de un año es de 18,097 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 12,078

La razón de tasas de incidencia hombremujer es de 1.2.


El 57% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

\*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 23 de Marzo de 2017.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia\* de IRA, por semana epidemiológica, México 2016 - 2017



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 10, México 2017.



#### Noticias relevantes

https://codiceinformativo.com/2017/03/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-agudas/secretaria-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-respiratorias-de-salud-mantiene-acciones-contra-infecciones-contra-

## Secretaría de Salud mantiene acciones contra infecciones respiratorias agudas

La Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones para la población con la finalidad de evitar infecciones respiratorias agudas, incluyendo la influenza. Esto mientras concluye la temporada invernal. Entre las medidas a seguir para evitar este tipo de enfermedades se encuentran: abrigarse cuando baje la temperatura; evitar los cambios bruscos de temperatura; lavarse las manos después de toser o estornudar, posterior al hacer uso del transporte público, de tocar dinero, llaves o teléfonos; desinfectar superficies de contacto común (en casa, trabajo y escuela). Ventilar habitaciones.

Asimismo, es necesario hacer una identificación temprana de síntomas respiratorios, tales como fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza y de garganta, escurrimiento nasal, por mencionar algunos. Y en caso de presentarlos, acudir al médico de inmediato.

Para complementar las acciones anteriores, se debe procurar una dieta basada en alimentos ricos en vitaminas "A" y "C" como naranja, guayaba, limón, limas, mandarinas, piña, jitomate, zanahoria, verduras y vegetales verdes.

En esta temporada invernal 2016-2017 para la campaña de prevención de la influenza fueron vacunadas 505 mil 109 personas.

Cabe mencionar que con el próximo inicio de la temporada de calor, el 19 de marzo se dará por concluida la aplicación de la vacuna contra la influenza en los módulos de vacunación que fueron instalados para este fin en los municipios de Querétaro y de San Juan del Río.

### Elementos de comunicación a la comunidad

Por incidencia\*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 10 fueron:

Zacatecas (1139), Tlaxcala (1086.1) y Aguascalientes (1052.2).

Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (969.9), Colima (779.4), Hidalgo (765.2), Durango (733.9), Querétaro (732.3) y Tamaulipas (702).

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 5%, con respecto a la semana 7.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 10, con respecto a la anterior fueron: Guerrero (22.8%), Yucatán (12.5%), Baja California (12.4%), Hidalgo (7.2%), Tabasco (5.3%), Jalisco (3.7%), México (3.6%) y Colima (2.2%)
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 10, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Epidemia.

Página 2