Primer caso de microcefalia asociado a Infección por virus Zika en México

- ***La Secretaría de Salud informa sobre el primer caso de microcefalia asociado a Zika en una recién nacida en México.***
- ***A las mujeres embarazadas con infección de virus Zika confirmada, se les mantiene en estrecho seguimiento, así como a sus recién nacidos durante los primeros dos años de vida.***

La Secretaría de Salud informa sobre el primer caso de microcefalia asociado a infección por virus Zika en México.

La investigación y confirmación de este caso estuvo a cargo del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) "Isidro Espinosa de los Reyes", en donde desde hace varios meses se lleva aplica un protocolo para identificar defectos al nacimiento que estén relacionados con infección por virus Zika en la madre. Es por ello que el estudio minucioso de esta paciente llevó varias semanas hasta su plena confirmación.

Este primer caso corresponde a producto femenino nacido por inducción del parto el cinco de noviembre del 2016, con una edad gestacional de 33.5 semanas (prematuro), con peso de 995 gr y talla de 34.5 cm. Misma que falleció al momento del parto. La madre es una mujer de 25 años, originaria del estado de Oaxaca.

Después de una exhaustiva valoración al nacimiento, se le diagnosticó microcefalia, encontrándose además otras alteraciones como: *retrognatia (alteración facial caracterizada por tener uno o los dos maxilares retrocedidos respecto al plano frontal de la cara), limitación de la extensión de las extremidades inferiores y dislocación de la rodilla izquierda.*
Mediante estudios especializados se detectó la presencia de virus Zika en líquido amniótico. Este resultado fue confirmado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) "Dr. Manuel Martínez Báez".

Existe la posibilidad de que se pueden presentar más casos de microcefalia relacionados a Zika en el país; por lo que mantenemos activa la vigilancia epidemiológica y el protocolo de confirmación y seguimiento.

La Secretaría de Salud continuará dando atención a las mujeres embarazadas con el diagnóstico de Zika u otras infecciones.

Para disminuir el riesgo de contraer infección por virus Zika en mujeres embarazadas, se aconseja las siguientes medidas preventivas:

- Usar manga larga, pantalón y repelente.
- Lavar los recipientes en los que se guarda el agua y taparlos.
- Voltear cubetas y botellas y tirar lo que no sirva y que pueda acumular agua.
- Mantener puertas y ventanas cerradas o con protección con mosquiteros.
- Utilizar pabellones para dormir.
- Asistir a controles prenatales.
- En caso de presentar síntomas sugestivos de la enfermedad, acudir de inmediato a la unidad de salud**, NO auto medicarse.**

El reforzamiento de las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y promoción, han permitido el control epidemiológico de la infección por virus Zika y otras arbovirosis como el Dengue y Chikungunya; cuyos casos se han reducido en los últimos tres años.

La Secretaría de Salud reconoce el valor de la evidencia científica existente respecto a la asociación entre Zika y microcefalia; por ello refrenda su compromiso de mantener informada a la población mexicana y fortalecer las acciones de prevención y control.