

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 17 fue:

Zacatecas (693.7).

Seguida por las entidades de: Aguascalientes (577.5), Yucatán (536.5), Baja California Sur (526.8), Tamaulipas (526.6), Tlaxcala (507.4) y Colima (474.4) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 22.8%, con respecto a la semana 14.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 17, con respecto a la anterior fueron: Tamaulipas (2.2%), Campeche (2.5%), Yucatán (4.3%), Coahuila (5.4%), Tabasco (5.8%), Distrito Federal (5.9%), Michoacán (6.2%) y Tlaxcala (6.5%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 17, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica
17 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 13 hasta la semana 17 de 2017 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	13	14	15	16	17		13	14	15	16	17
Aguascalientes	933.3	769.2	642.6	755.4	577.5	Morelos	559.7	538.7	391.4	471.8	413.5
Baja California	474.6	465.6	399.7	398.5	348.5	Nayarit	637.6	629.7	472.5	554.3	434.5
Baja California Sur	861.7	813.6	615.2	628.1	526.8	Nuevo León	546.4	474.9	366.7	408.9	344.1
Campeche	595.6	511.8	380.5	458.2	453.2	Oaxaca	337.7	320.7	243.0	305.6	245.3
Coahuila	363.0	371.3	241.7	269.5	257.8	Puebla	549.9	485.9	370.0	402.3	340.1
Colima	628.4	593.6	488.9	580.0	474.4	Querétaro	599.2	466.4	416.9	440.6	371.8
Chiapas	222.9	215.8	156.5	219.4	205.3	Quintana Roo	589.0	456.5	439.0	508.4	468.4
Chihuahua	441.6	406.4	293.6	332.8	287.3	San Luis Potosí	521.8	495.1	362.8	409.8	384.9
Distrito Federal	552.5	528.2	383.1	436.3	409.4	Sinaloa	623.7	555.3	424.0	494.5	416.3
Durango	612.9	548.2	446.2	496.9	411.0	Sonora	509.8	466.4	367.6	370.0	326.4
Guanajuato	417.0	389.1	322.2	366.1	339.6	Tabasco	470.7	442.7	343.7	422.1	401.9
Guerrero	364.4	327.9	267.7	330.6	303.9	Tamaulipas	606.4	547.2	472.3	532.5	526.6
Hidalgo	625.2	589.9	406.0	457.0	400.2	Tlaxcala	884.7	752.2	572.3	535.5	507.4
Jalisco	435.9	429.1	343.3	411.5	345.5	Veracruz	374.4	345.9	279.2	317.9	293.2
México	463.8	443.0	294.6	341.3	303.6	Yucatán	607.6	478.3	478.3	553.4	536.5
Michoacán	410.3	370.8	266.6	333.5	314.7	Zacatecas	953.7	891.3	671.9	774.4	693.7
						Nacional	492.2	453.9	346.8	397.1	354.2

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 17, con respecto a la anterior fueron:

Tamaulipas	(2.2 %)
Campeche	(2.5 %)
Yucatán	(4.3 %)
Coahuila	(5.4 %)
Tabasco	(5.8 %)
Distrito Federal	(5.9 %)
Michoacán	(6.2 %)
Tlaxcala	(6.5 %)

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 17 fue:

Zacatecas (693.7)

Seguida por las entidades de: Aguascalientes (577.5), Yucatán (536.5), Baja California Sur (526.8), Tamaulipas (526.6), Tlaxcala (507.4) y Colima (474.4)


En la semana epidemiológica 17, a nivel nacional se notificaron 354 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 22.8%, con respecto a la semana 14.


Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 17, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 17 de 2017 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2012 - 2017.



*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 1.9% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 17 en menores de un año es de 29,168 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 19,427

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 11 de Mayo de 2017.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2016 - 2017.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 17, México 2017.



Noticias relevantes

<https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/623916-tlaxcala-de-los-estados-con-mayor-numero-de-casos-de-infecciones-respiratorias-agudas-sesa-federal>

Registra Tlaxcala alta incidencia de infecciones respiratorias agudas

Tlaxcala se ubicó dentro de los 10 estados con mayor número de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), durante la semana epidemiológica 16 del año en curso, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud.

Específicamente, se colocó en el séptimo lugar con 532.5 casos. De hecho en la semana 12 presentó 918.6 casos, en la 13 fueron 884.9, mientras que en la 14 reportaron 749.3 casos y en la 15, llegaron a 572.3 casos de IRA.

Las enfermedades respiratorias agudas constituyen un grupo de padecimientos que se produce en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de dos semanas. Los principales síntomas son fiebre, malestar general, congestión y secreción nasal, pero también puede presentarse tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.

La Sesa recomendó a la población en general asistir a las unidades médicas para atender los síntomas y extremar cuidados en los niños y adultos mayores. A nivel nacional, las entidades más afectadas en la semana epidemiológica 16 fueron Zacatecas y Aguascalientes, luego Baja California Sur, Colima, Nayarit, Yucatán, Tlaxcala, Tamaulipas y Durango. En contraparte, los estados que menos reportaron casos de IRA fueron Chiapas, Michoacán, Tabasco, Oaxaca, Morelos, Campeche, Jalisco y Colima.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 17 fue: Zacatecas (693.7).
- Seguida por las entidades de: Aguascalientes (577.5), Yucatán (536.5), Baja California Sur (526.8), Tamaulipas (526.6), Tlaxcala (507.4) y Colima (474.4).
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 22.8%, con respecto a la semana 14.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 17, con respecto a la anterior fueron: Tamaulipas (2.2%), Campeche (2.5%), Yucatán (4.3%), Coahuila (5.4%), Tabasco (5.8%), Distrito Federal (5.9%), Michoacán (6.2%) y Tlaxcala (6.5%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 17, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.