

**AVISO PREVENTIVO DE VIAJE AL ESTADO DE BOLÍVAR EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE CASOS DE SARAMPIÓN**

La **SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL**, a través del **UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA** emite el siguiente aviso preventivo de viaje ante casos de **Sarampión** en el estado de **Bolívar** en la **República Bolivariana de Venezuela**.

01 | Noviembre | 2017

UIES-AVISO-VIAJE-SARAMPION-VENEZUELA-ACTUALIZACION →

**⚠ Atención a los viajeros al estado de Bolívar en la República Bolivariana de Venezuela ante casos de infección por el Virus del Sarampión.**



**LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL RECOMIENDA: TOMAR PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA EL ESTADO DE BOLÍVAR EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DEBIDO A CASOS DE SARAMPIÓN.**

de la nariz, de la boca o la garganta de una persona infectada.

La infección causada por el Virus del Sarampión produce una enfermedad aguda, la cual es una de las más contagiosas del mundo. Clínicamente se caracteriza por presentar fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca y posteriormente, erupciones cutáneas en cara y cuello que se extienden a todo el cuerpo. Se transmite por contacto directo con gotitas provenientes

La enfermedad es más grave en los lactantes, malnutridos y en los adultos, comparado con los niños inmunocompetentes (buenas defensas). Las complicaciones son: diarrea severa, infecciones del oído, neumonía, ceguera y encefalitis (inflamación del cerebro) que puede conducir a la muerte.

A pesar de que el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación, en muchos países las bajas coberturas de vacunación en la población en riesgo ha favorecido la diseminación, sigue siendo persistente en diferentes regiones del mundo, incluyendo África, Asia, Europa y Oceanía. Actualmente existen brotes importantes de Sarampión en Europa, principalmente en Italia y Rumania. De los casos identificados donde se cuenta con el dato, el 84% no tenían antecedente vacunal. Es por ello que pueden aparecer grandes epidemias y los viajeros que no son inmunes, están en riesgo.

El pasado 27 de octubre de 2017 se emitió, por parte de *Organización Panamericana de la Salud (OPS)*, la actualización epidemiológica de sarampión. Entre la semana epidemiológica 35 y la 40 de 2017, se notificaron **570 casos sospechosos de sarampión en 10 parroquias del municipio Caroní, estado Bolívar, Venezuela**. Del total, **217 casos fueron confirmados** por laboratorio (153) y por nexo epidemiológico (64), 292 casos están bajo investigación y 61 fueron descartados. En los últimos años, las coberturas de vacunación en Venezuela contra sarampión, según las estimaciones de la OMS y la UNICEF, para la primera dosis varían entre el 85% y el 92% y para la segunda dosis el 26% y el 53%.

## AVISO PREVENTIVO DE VIAJE AL ESTADO DE BOLÍVAR EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE CASOS DE SARAMPIÓN

La caracterización genética del virus, que está circulando en el actual brote en la República Bolivariana de Venezuela corresponde al genotipo D8, el cual está circulando en países de Europa como Portugal, Francia, Alemania, así como, en Japón, Australia y Nueva Zelanda. Por lo tanto se trata de un virus importado de otras regiones del mundo.

Desde el 27 de septiembre de 2016, la Organización Mundial de la Salud declaró libre de sarampión a la región de las Américas, la primera de las cinco regiones del mundo. Este logro culminó un esfuerzo de 22 años, que involucró una amplia administración de la vacuna contra el sarampión, las parotiditis (paperas) y la rubéola en el continente, así como la constante vigilancia epidemiológica y por laboratorio.

En México, la última epidemia de sarampión ocurrió en 1989-1990 reportándose 89,163 casos. En el 2011 se presentaron tres casos importados: dos en el Distrito Federal y uno en Guanajuato. Del 2013 a 2014 se reportaron casos importados en viajeros extranjeros. **El último caso autóctono en nuestro país fue en 1996.**

La ocurrencia simultánea de brotes activos y la persistencia de casos endémicos de sarampión en diferentes regiones del mundo, la evidencia del mismo virus circulando en diferentes regiones del mundo; así como la posibilidad de reintroducción de la enfermedad en áreas con bajas coberturas de vacunación y aunado al constante flujo de personas representa un riesgo para los viajeros.

**Por lo anterior, la DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA emite y reitera las siguientes recomendaciones a las personas que viajen al estado de Bolívar en la República Bolivariana de Venezuela o que regresen a México provenientes de esta región:**

### RECOMENDACIONES

**Antes de su viaje:** Aplicar la vacuna contra el sarampión (un mínimo de 14 días antes de su viaje).

- Las personas que no puedan demostrar que fueron vacunadas cuando eran niños y que nunca han tenido sarampión deben ser vacunadas.
- **Revise la Cartilla Nacional de Vacunación de sus hijos y de usted.** En México rutinariamente se brinda vacunación contra el sarampión, a los 12 meses de edad se aplica la primera dosis, y a los 6 años de edad o al ingresar a la primaria se aplica la segunda dosis.
- Los niños de 6 a 11 meses de edad deben tener una dosis de vacuna contra el sarampión, **si se viaja internamente.**
- Los lactantes vacunados antes de los 12 meses deben ser revacunados al cumplir el primer año de edad, con un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días.
  - *La vacuna “doble viral” o SR se deberá aplicar en situaciones especiales, cuando haya casos de sarampión en una región, a partir de los seis meses de edad sin que esta dosis forme parte del esquema de vacunación (como fue el caso de la campaña del 2016).*
- Los adolescentes y adultos que no cuenten con dos dosis de vacuna deben vacunarse. Si no cuenta con antecedente de haber padecido sarampión deberá recibir dos dosis separadas por al menos 28 días.
- Dos dosis de SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) representan casi el 100 por ciento de efectividad en la prevención del sarampión.
- **Las mujeres en edad fértil deberán vacunarse con SR.**

## AVISO PREVENTIVO DE VIAJE AL ESTADO DE BOLÍVAR EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE CASOS DE SARAMPIÓN

- Ninguna de estas vacunas deberá aplicarse a embarazadas o con la duda de embarazo.
- Las únicas vacunas contra el sarampión disponibles en México son:
  - Vacuna triple viral (SRP; sarampión, rubéola y parotiditis).
  - Vacuna doble viral (SR; sarampión y rubéola).
- **La vacuna SRP es altamente segura.**
- **Existe evidencia científica que no existe relación entre la vacuna SRP y el autismo.**

**Durante su viaje y a su regreso:** Si usted presenta **fiebre y exantema (erupción)** durante su viaje y hasta después de 21 días de su regreso a México:

- **No se auto-medique y busque atención médica de inmediato.**
- Tome abundantes líquidos, vida suero oral o electrolitos orales para prevenir la deshidratación.
- Comente con el personal médico que lo atienda, sobre su antecedente de viaje a estas regiones. O el contacto con alguna persona con esta situación.
- Evite el contacto cercano con otras personas durante cuatro días después de la aparición de la erupción cutánea (manchas en la piel), con el fin de reducir la propagación a otras personas o familiares que no estén vacunados.
- Si usted todavía está enfermo a su llegada a México, por favor avise al *asistente de vuelo* antes de aterrizar o al oficial de *Sanidad Internacional* cuando salga del vuelo.

**Durante su estancia o tránsito en el estado de Bolívar, Venezuela:** se recomiendan medidas higiénicas generales, para reducir el riesgo de contagio:

- Lávese las manos con frecuencia.
- Si el jabón y agua no están disponibles, desinfecte sus manos con solución alcoholada en gel para manos (que contenga al menos un 60 por ciento de alcohol).
- Procure no tocar sus ojos, nariz o boca. Si tiene que tocar su cara, asegúrese de que sus manos estén limpias.
- Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la manga (no con las manos) al toser o estornudar.
- Está indicado el uso de cubre-bocas (mascarilla) al estar en un grupo de personas.
- Evite el contacto cercano, como besos, abrazos o compartir cubiertos o vasos, con personas que estén enfermas.
- Tenga a la mano los teléfonos, dirección del consulado o embajada de los Estados Unidos Mexicanos más cercano, para contactarlo en caso necesario.

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 53-37-18-45 o LADA sin costo 01-800-00-44-800, donde será atendido por personal altamente capacitado.

Información adicional en:

SECRETARÍA DE SALUD  
www.gob.mx/salud  
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA  
www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia  
CLÍNICA DEL VIAJERO de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
www.clinicadelviajero.com.mx

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
www.gob.mx/sre  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  
www.who.int  
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  
www.paho.org

En caso de antecedente de viaje al estado de Bolívar en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos **21 días** o **haber tenido contacto con personas que hayan viajado a este país** y presentar **fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca, erupciones cutáneas** debe de solicitar atención médica e informar al personal médico del antecedente de viaje. Para que se lleve a cabo la **notificación inmediata** y con carácter de **urgente** a los respectivos niveles de salud y al mismo tiempo a la **DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA** a través de los mecanismos establecidos, así como por medio de la **UIES** al teléfono **53-37-18-45** llamada local del Distrito Federal o LADA sin costo **01-800-00-44-800**.