

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 11 fueron:
Zacatecas (860.4), Aguascalientes (848.1), Baja California Sur (833.8) y Tamaulipas (722.7).
- Seguidas por las entidades de: Nuevo León (710.9), Sinaloa (684), Colima (659.4), Tlaxcala (649.9), Yucatán (623.1), Durango (613.9), Quintana Roo (610.8) y Querétaro (583.6) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 8.4%, con respecto a la semana 8.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 11, con respecto a la anterior fueron: Oaxaca (7.6%), Colima (2.6%), Jalisco (1.8%) y Coahuila (0.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 11, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

Información hasta la semana epidemiológica 11 del 2018

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana 7 hasta la semana 11 de 2018 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	7	8	9	10	11		7	8	9	10	11
Aguascalientes	921.4	844.1	814.7	892.8	848.1	Morelos	572.9	563.1	485.5	474.8	456.3
Baja California	404.1	418.9	401.1	430.3	382.6	Nayarit	557.6	520.7	541.6	585.4	569.0
Baja California Sur	869.8	984.9	920.3	947.7	833.8	Nuevo León	750.2	738.6	668.3	744.7	710.9
Campeche	517.3	551.8	534.5	565.9	564.2	Oaxaca	238.8	254.3	222.2	229.4	248.3
Coahuila	566.9	542.2	479.8	493.8	502.1	Puebla	501.4	514.4	465.1	447.3	428.9
Colima	639.6	668.2	627.0	632.6	659.4	Querétaro	579.4	662.6	565.6	592.7	583.6
Chiapas	251.0	279.1	257.4	273.6	251.7	Quintana Roo	576.6	590.8	557.2	602.8	610.8
Chihuahua	753.7	571.0	499.6	618.5	559.6	San Luis Potosí	616.4	649.8	574.3	598.4	562.3
Distrito Federal	468.0	511.5	463.0	506.5	448.8	Sinaloa	727.1	716.1	677.5	708.2	684.0
Durango	630.2	647.6	596.5	629.9	613.9	Sonora	565.2	537.9	514.7	575.6	526.8
Guanajuato	513.6	487.4	439.2	445.2	431.2	Tabasco	382.5	393.0	393.2	405.2	380.4
Guerrero	350.9	380.6	342.2	331.4	300.5	Tamaulipas	759.4	613.7	682.3	721.9	722.7
Hidalgo	588.3	633.4	532.6	629.9	572.3	Tlaxcala	733.9	828.8	732.4	693.1	649.9
Jalisco	432.5	407.5	379.0	385.7	396.8	Veracruz	377.7	417.3	380.3	397.4	375.6
México	399.8	429.3	356.8	401.9	378.9	Yucatán	602.9	612.0	604.0	638.5	623.1
Michoacán	345.0	352.6	327.1	340.9	336.4	Zacatecas	891.1	926.1	861.8	880.6	860.4
						Nacional	499.3	503.7	459.1	488.7	465.8

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 11, con respecto a la anterior fueron:

Oaxaca	(7.6 %)
Colima	(2.6 %)
Jalisco	(1.8 %)
Coahuila	(0.6 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 11 fueron:

Zacatecas	(860.4)
Aguascalientes	(848.1)
Baja California	(833.8)
Tamaulipas	(722.7)

Seguidas por las entidades de: Nuevo León (710.9), Sinaloa (684), Colima (659.4), Tlaxcala (649.9), Yucatán (623.1), Durango (613.9), Quintana Roo (610.8) y Querétaro (583.6).

En la semana epidemiológica 11, a nivel nacional se notificaron 466 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 8.4%, con respecto a la semana 8.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 11, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana 11 de 2018 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2013 - 2018.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 11.6% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 11 en menores de un año es de 18,859 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 12,265

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 28 de Marzo de 2018.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2017 - 2018.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 11, México 2018.



Noticias relevantes

<https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/aumentan-casos-de-infecciones-respiratorias-en-zacatecas-1161375.html>

Aumentan casos de infecciones respiratorias en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Miguel Angel Martínez Flores, coordinador auxiliar de Salud Pública de la delegación Zacatecas del IMSS, exhortó a la población a que no baje la guardia durante esta temporada invernal, en la cual se ha incrementado el número de casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAS).

"Es importante que nos estemos cuidando y protegiendo desde antes de presentar padecimientos, la vitamina C al tomar una dosis importante antes de la temporada invernal ayuda a elevar las defensas", comentó.

También recomendó evitar exponerse a situaciones que comprometan la salud, como lugares cerrados y concurridos y exponerse a cambios bruscos de temperatura, ya que son factores que pueden desencadenar malestar en la salud.

Dentro de las IRAS se consideran varios padecimientos; de los cuales los más frecuentes son: rinitis, rinofaringitis, faringitis virales o bacterianas, neumonías e influenza. "Estos padecimientos –dijo- no deben durar más de 15 días, de lo contrario es necesario acudir al médico para que indique el tratamiento adecuado". El especialista destacó que "acudir de manera tardía a consulta es una de la situaciones que genera que los pacientes no reaccionen adecuadamente a los tratamientos y una infección aunque sea viral si no está bien cuidada, puede durar hasta un mes, si no se atienden pronto se tarda más la mejoría".

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 11 fueron: Zacatecas (860.4), Aguascalientes (848.1), Baja California Sur (833.8) y Tamaulipas (722.7). Seguidas por las entidades de: Nuevo León (710.9), Sinaloa (684), Colima (659.4), Tlaxcala (649.9), Yucatán (623.1), Durango (613.9), Quintana Roo (610.8) y Querétaro (583.6) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 8.4%, con respecto a la semana 8.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 11, con respecto a la anterior fueron: Oaxaca (7.6%), Colima (2.6%), Jalisco (1.8%) y Coahuila (0.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 11, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.