



AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A BRASIL POR FIEBRE AMARILLA


La SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, a través de la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA emite el siguiente aviso preventivo de viaje ante **casos confirmados de Fiebre Amarilla en Brasil**.

19 | Febrero | 2019

[UIES-AVISO-VIAJE-FIEBRE
AMARILLA-BRASIL-2019] →



⚠ Atención a los viajeros a Brasil ante casos confirmados de infección por el Virus de Fiebre Amarilla:



LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL RECOMIENDA: TOMAR PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA LOS VIAJES A BRASIL, DEBIDO A CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE AMARILLA.

La **Fiebre Amarilla** es una enfermedad viral aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El virus se puede transmitir de forma selvática y de forma urbana. El vector en la transmisión selvática es el *Haemagogus spp.* y *Sabethes spp.* En la transmisión urbana está involucrado el mosquito del género *Aedes aegypti*. Mismo vector que transmite los virus del Dengue, Chikungunya y Zika; estos virus pueden coexistir y transmitirse simultáneamente.

Se caracteriza por presentar un cuadro clínico que puede variar desde una enfermedad leve (5 a un 50% pueden cursar asintomáticos) hasta un cuadro grave con ictericia y hemorragias. Una vez que se restablece el paciente, deja inmunidad de por vida.

La enfermedad es sumamente transmisible en áreas de riesgo donde coexisten muchas personas susceptibles y abundantes mosquitos vectores. Afecta a humanos que acuden a regiones selváticas.

Después de un periodo de incubación de 3 a 6 días, la enfermedad se caracteriza por la presencia de fiebre, dolor de espalda, cabeza y músculos, escalofrío, náusea y vómito que desaparecen en 3 o 4 días. En aproximadamente 15% de los enfermos se presenta color amarillo en la piel acompañada de dolor abdominal y vómito. Puede presentarse sangrado de boca, nariz, ojos, vómito con sangre y en las heces; comprometiendo la función de los riñones. La tasa de letalidad de los casos graves es del 20 al 50%.

No hay tratamiento curativo para la Fiebre Amarilla; solo es sintomático y consiste en estabilizar los signos vitales del paciente. **Existe una vacuna contra la Fiebre Amarilla**, que con una sola dosis es suficiente para protección durante toda la vida y protege entre el 90% y 98% de las personas que se vacunan. La vacunación es necesaria para todas las personas





AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A BRASIL POR FIEBRE AMARILLA

que acudan a zonas de riesgo. **No se deben vacunar las embarazadas, niñas y niños menores de 6 meses, personas con enfermedad autoinmune, pacientes en tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia, personas inmunodeficientes o con VIH.**

Brasil se encuentra actualmente en el periodo reconocido históricamente como de mayor transmisión (periodo estacional) que se extiende en los meses de diciembre a mayo. En el periodo 2017-2018 se registraron 1,376 casos autóctonos de fiebre amarilla en varias regiones de Brasil con 483 defunciones.

En el presente periodo estacional (2018-2019), de diciembre de 2018 hasta enero de 2019; se han confirmado 36 casos en humanos de fiebre amarilla, incluidas ocho defunciones. En 11 municipios de dos estados de Brasil.

En la parte sur del estado de São Paulo, siete municipios: El dorado (16 casos), Jacupiranga (1 caso), Iporanga (7 casos), Cananeia (3 casos), Cajati (2), Pariquera-Açu (1), Sete Barras (1), Vargem (1) y Serra Negra (1) en la frontera con el estado de Minas Gerais.

En la parte oriental del estado de Paraná Además, se han confirmado dos casos, en los municipios de Antonina y Adrianópolis. Estos son los primeros casos confirmados de fiebre amarilla notificados desde 2015 en Paraná, un estado con una frontera internacional con Paraguay. El sitio probable de infección de uno de los casos confirmados se encuentra bajo investigación.

En México la Fiebre Amarilla representó un importante problema de salud pública desde la época prehispánica en que el virus era transmitido por vectores silvestres y que se exacerbó con la introducción del *Aedes aegypti* en el siglo XV, que causó epidemias importantes en gran parte del país. La *Campaña de Erradicación de la Fiebre Amarilla* logró contener y eliminar la circulación del virus registrándose el último caso en Pánuco, Veracruz el 7 de febrero de 1923.

El territorio de Brasil, forma parte de la Selva Amazónica, donde el reservorio natural del virus (primates no humanos) y la circulación del virus es habitual; la transmisión a humanos ocurre esporádicamente.

Es importante destacar que en próximas semanas se celebrará en el **Carnaval de Brasil (del 01 al 09 de marzo de 2019)**, esto puede implicar movilización secundaria fuera de los principales municipios donde están ocurriendo los casos, así como de viajeros internacionales; por lo que no se puede excluir la propagación del virus de manera internacional.

Por lo anterior, la DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA emite y reitera las siguientes recomendaciones a personas que viajen a Brasil o que regresen a México provenientes de ese país:

RECOMENDACIONES

Antes de su viaje: Aplicar la vacuna contra la Fiebre Amarilla.

- La vacuna contra la fiebre amarilla se debe administrar a todos los viajeros que se dirijan a zonas con riesgo diez (10) días antes de iniciar su viaje.
- Debe ir acompañada de un Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis.



AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A BRASIL POR FIEBRE AMARILLA

- La vacuna debe aplicarse a partir de los 9 meses de edad, a **excepción** de: niños menores de 6 meses de edad, embarazadas, personas alérgicas a las proteínas del huevo, personas inmunodeprimidas que recibieron trasplante de órgano o un tratamiento con radiación o con medicamentos (como esteroides o quimioterapia), VIH/SIDA, enfermedad de la glándula de timo o tiene problemas con la glándula timo (como miastenia grave, el síndrome de DiGeorge o timoma), enfermedad infecciosa aguda, encefalitis o cáncer.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que una sola dosis de vacuna **brinda protección permanente** y tiene aproximadamente el 100% de efectividad en la prevención de la Fiebre Amarilla.

Durante su viaje y a su retorno: Si usted presenta fiebre, dolor muscular, dolor de espalda intenso, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida de apetito, náuseas, vómito y/o coloración amarillenta de la piel y ojos. Durante su estancia, y hasta un periodo después de 7 días de su regreso a México:

- **No se auto-medique y busque atención médica de inmediato.**
- Tome abundantes líquidos y **vida suero oral** o electrolitos orales para prevenir la deshidratación.
- Comente con el personal médico que lo atienda el antecedente de viaje a estas regiones, así como de picaduras de mosquito.
- Si usted todavía está enfermo a su llegada a México, por favor, dígame al *asistente de vuelo* antes de aterrizar o el *Oficial de Sanidad Internacional* cuando salga del vuelo.
- Si usted tiene síntomas de fiebre amarilla procure no entrar en contacto con las personas de la familia, amigos o conocidos que estén embarazadas, niñas, o niños, personas enfermas o que sepa que cursan con alguna enfermedad.
- Dado que en México existe el Vector es importante evitar las picaduras de moscos ante el riesgo de que el mosquito se infecte y se convierta en un potencial transmisor de la enfermedad.
- Todos los contactos directos del caso de Fiebre Amarilla también deben ser vacunados.

Los viajeros pueden protegerse a sí mismos mediante la prevención de las picaduras de mosquitos:

- **Para evitar las picaduras de mosquitos:**
 - Cubra la piel expuesta con el uso de camisas de manga larga, pantalones largos y sombreros.
 - Use un repelente de insectos (de venta en farmacias).
 - Siempre siga las instrucciones del producto y volver a aplicar según las instrucciones, cuando se transpire o esté expuesto al agua.
 - Siga las instrucciones de uso, al aplicar repelente en la población infantil.
 - Si usted también está usando protección solar, aplicar el protector solar primero y después aplicar el repelente contra insectos.
 - Evite aplicar repelente en las manos, los ojos y la boca.
 - Dormir en habitaciones cerradas con filtrado o aire acondicionado.
 - Use un mosquitero o pabellón si el área donde usted está durmiendo está expuesta al exterior.
 - Tenga a la mano los teléfonos, dirección del consulado o embajada de los Estados Unidos Mexicanos más cercano, para contactarlo en caso necesario.

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 5337-1845 o al 01-800-00-44-800, donde será atendido por personal altamente capacitado.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGÍA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA
UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA

AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A BRASIL POR FIEBRE AMARILLA

Información adicional en:

SECRETARÍA DE SALUD

www.gob.mx/salud

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/dga-epidemiologia

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL > FIEBRE AMARILLA

www.imss.gob.mx/salud-en-linea/fiebre-amarilla

CLÍNICA DEL VIAJERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

www.clinicadelviajero.com.mx

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

www.gob.mx/sre

GUÍA DEL VIAJERO

guiadelviajero.sre.gob.mx/

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

www.who.int

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

www.paho.org

En caso de antecedente de viaje a **Brasil**, en los últimos **7 días** o **haber tenido contacto con personas que hayan viajado a este país**, y presentar **fiebre, dolor muscular, dolor de espalda intenso, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida de apetito, náuseas, vómito y/o coloración amarillenta de la piel y ojos** debe de **solicitar atención médica e informar del antecedente de viaje**.

Para que se lleve a cabo la **notificación inmediata** y con carácter de **urgente** a los respectivos niveles de salud y al mismo tiempo a la **Dirección General de Epidemiología** a través de los mecanismos establecidos, así como por medio de la **UIES** al teléfono **(55) 5337-1845** llamada local de la Ciudad de México o del resto del país, sin costo **01-800-00-44-800**.

