INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 20 fue:

  Zacatecas (654.7).

- Seguida por las entidades de: Nayarit (538.3), Sinaloa (494), Baja California Sur (490.6), Colima (477.3), Tlaxcala (464.8) y Durango (430) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 3.2%, con respecto a la semana 17.

- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 20, con respecto a la anterior fueron: Quintana Roo (30.2%), México (21.1%), Nayarit (20.7%), Baja California Sur (20%), Oaxaca (19.2%), Jalisco (18.2%), Sinaloa (17.7%) y Tlaxcala (17.3%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 20, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 20 del 2019

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 20, con respecto a la anterior fueron:

Quintana Roo	**(30.2**	**%)**
México	**(21.1**	**%)**
Nayarit	**(20.7**	**%)**
Baja California S	**(20.0**	**%)**
Oaxaca	**(19.2**	**%)**
Jalisco	**(18.2**	**%)**
Sinaloa	**(17.7**	**%)**
Tlaxcala	**(17.3**	**%)**

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 20 fue:

Zacatecas (654.7)

Seguida por las entidades de: Nayarit (538.3), Sinaloa (494), Baja California Sur (490.6), Colima (477.3), Tlaxcala (464.8) y Durango (430) .

En la semana epidemiológica 20, a nivel nacional se notificaron 326 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 3.2%, con respecto a la semana 17.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 20, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

***Incidencia semanal por 100,000 habitantes.**

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 16 hasta la semana 20 de 2019 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	16	17	18	19	20		16	17	18	19	20
Aguascalientes	424.5	532.8	363.0	370.3	422.5	Morelos	362.1	358.3	277.6	324.0	345.6
Baja California	279.0	286.6	230.3	239.2	265.5	Nayarit	492.1	487.1	434.7	445.9	538.3
Baja California Sur	453.0	486.3	402.8	409.0	490.6	Nuevo León	490.1	483.4	389.1	389.0	423.7
Campeche	372.0	418.2	341.3	368.7	389.2	Oaxaca	246.9	249.1	210.9	217.4	259.2
Coahuila	342.2	363.4	260.3	275.3	313.8	Puebla	318.6	334.3	292.9	285.3	299.7
Colima	454.0	478.7	427.2	458.3	477.3	Querétaro	397.0	413.8	341.5	366.0	418.7
Chiapas	171.2	208.3	165.6	164.8	191.3	Quintana Roo	357.4	408.7	398.2	303.6	395.5
Chihuahua	286.9	296.2	236.3	252.1	284.6	San Luis Potosí	352.8	397.0	293.3	298.3	332.6
Distrito Federal	278.4	319.0	251.3	280.6	328.5	Sinaloa	459.0	489.6	414.2	419.6	494.0
Durango	414.6	492.8	393.1	385.0	430.0	Sonora	327.9	327.2	286.5	279.6	318.6
Guanajuato	311.5	336.4	284.7	310.9	323.6	Tabasco	282.7	339.3	280.8	269.4	309.5
Guerrero	229.9	224.4	234.4	271.7	300.9	Tamaulipas	488.1	484.7	396.8	384.6	408.2
Hidalgo	355.4	382.8	301.3	318.7	360.8	Tlaxcala	525.1	477.6	387.1	396.2	464.8
Jalisco	242.5	276.4	244.4	266.9	315.3	Veracruz	252.4	283.0	231.6	232.9	249.6
México	235.8	251.2	207.8	226.8	274.7	Yucatán	379.4	409.3	345.4	327.0	380.9
Michoacán	296.4	351.4	277.0	282.8	294.9	Zacatecas	616.9	677.6	558.6	598.9	654.7
						Nacional	313.2	337.0	278.0	288.5	326.1

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 20 de 2019 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2014 - 2019.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 6.8% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 20 en menores de un año es de 30,980 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 19,813

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43615.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2018 - 2019.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 20, México 2019.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	1230.2	776	485.6	301.1	189.6	190.9	139.6	216.1	172.3	264	200.9
Femenino	1 195.7	782.2	502.8	311.5	242.9	265.6	217.9	321.8	293.7	363.7	243.7

Noticias relevantes

https://www.novedadescampeche.com.mx/estado/campeche/aumentan-enfermedades-por-calor/

Aumentan enfermedades por calor

Ante el intenso calor continúan en aumento las enfermedades diarreicas y respiratorias, con mil 25 y tres mil 20 casos, respectivamente, durante la Semana Epidemiológica número 19.
Sin embargo, según dio a conocer el Sector Salud, las cifras son menores en comparación del año pasado.
Durante la temporada de calor proliferan algunas enfermedades típicas, en las que el aumento de temperatura y rachas de viento coadyuvan a la propagación de enfermedades, ya que el polvo contribuye a los males respiratorios y contamina los alimentos, mientras que el calor los descompone más rápido.
En la Semana Epidemiológica se tiene registro de mil 25 casos nuevos de infecciones intestinales, que se suman al total de 16mil 796 casos en lo que va del año, afectando con mayor frecuencia a las mujeres, mientras que las enfermedades respiratorias agudas aumentaron esta semana con tres mil 20 casos nuevos.
Cabe señalar que pese al incremento de casos de estas enfermedades, el Sector Salud asegura que no representa un riesgo para la población, ya que incluso en comparación con el año pasado los acumulados se encuentran muy por debajo de las cifras del 2018.
Sin embargo, no se debe bajar la guardia, por lo que recomiendan mantener cuidado especial a la población vulnerable como niños y adultos mayores; evitando el consumo de comida en la vía pública, mantener los alimentos frescos y refrigerados, ya que su exposición prolongada al aire libre puede descomponerlos y ocasionar infecciones gastrointestinales en caso de ser consumidos.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 20 fue:

  Zacatecas (654.7).

  Seguida por las entidades de: Nayarit (538.3), Sinaloa (494), Baja California Sur (490.6), Colima (477.3), Tlaxcala (464.8) y Durango (430) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 3.2%, con respecto a la semana 17.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 20, con respecto a la anterior fueron: Quintana Roo (30.2%), México (21.1%), Nayarit (20.7%), Baja California Sur (20%), Oaxaca (19.2%), Jalisco (18.2%), Sinaloa (17.7%) y Tlaxcala (17.3%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 20, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.