# INFORMACIÓN RELEVANTE: ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Las entidades federativas con mayor incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 37 son: Zacatecas(4.2) y Sinaloa(3.8).
- Precedidas por Nayarit (3.2) y Baja California Sur (2.9).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 37, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 10 de las 32 entidades federativas (31.3%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 5 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 37, 10 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Baja California Sur (26.1%), Campeche (23.8%), Sonora (17.6%), Aguascalientes (10%), Oaxaca (9.1%), Sinaloa (8.6%), Zacatecas (7.7%) y Nuevo León (6.7%).





## INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

**EDA** 

# Información hasta la semana epidemiológica 37 del 2019

	Información	relevante
Tabla	1:	

En la semana epidemiológica 37, 10 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Baja California Sur	(	26.1 %)
Campeche	(	23.8 %)
Sonora	(	17.6 %)
Aguascalientes	(	10.0 %)
Oaxaca	(	9.1 %)
Sinaloa	(	8.6 %)
Zacatecas	(	7.7 %)
Nuevo León	(	6.7 %)

Figura 1:

Las entidades federativas con mayor incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 37 son:

<b>Lacatecas</b>	(	4.2)
Sinaloa	(	3.8)

Precedidas por Nayarit (3.2) y Baja California Sur (2.9).

En 10 de las 32 entidades federativas (31.3%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior; y 5 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

### Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 37, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

'Incidencia semanal por mil menores de 5 años.


Tabla 1. Comparativo de incidencia\* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 33 hasta la semana 37, por entidad federativa, México 2019.

Entidad	Ser	Semana Epidemiológica				Entidad	Ser	Semana Epidemiológica				
Entidad	33	34	35	36	37	Entidad	33	34	35	36	37	
Aguascalientes	2.3	2.4	2.0	2.0	2.2	Morelos	1.8	1.4	1.4	1.4	1.3	
Baja California	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	Nayarit	4.1	4.5	4.2	3.5	3.2	
Baja California Sur	2.0	2.0	2.2	2.3	2.9	Nuevo León	1.7	1.8	1.8	1.5	1.6	
Campeche	2.9	2.2	2.4	2.1	2.6	Oaxaca	2.7	2.9	2.5	2.2	2.4	
Coahuila	1.9	1.8	1.7	1.7	1.5	Puebla	2.0	1.7	1.5	1.6	1.2	
Colima	2.8	2.3	2.7	2.5	2.4	Querétaro	1.9	1.7	1.9	1.9	2.0	
Chiapas	2.3	1.9	1.7	1.8	1.5	Quintana Roo	2.6	2.5	2.3	3.0	2.4	
Chihuahua	2.3	2.4	2.4	2.2	1.9	San Luis Potosí	2.2	2.2	1.9	2.0	1.9	
Cd de México	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	Sinaloa	3.1	3.3	3.8	3.5	3.8	
Durango	2.9	2.5	2.4	2.2	1.9	Sonora	2.0	2.0	1.8	1.7	2.0	
Guanajuato	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	Tabasco	1.4	1.5	1.4	1.6	1.5	
Guerrero	2.0	2.2	1.9	2.0	1.6	Tamaulipas	2.9	2.6	2.4	2.5	2.1	
Hidalgo	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	Tlaxcala	1.8	1.8	1.9	2.0	1.7	
Jalisco	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	Veracruz	1.9	1.8	1.8	1.6	1.7	
México	1.3	1.2	1.4	1.4	1.4	Yucatán	2.9	3.0	2.8	2.6	2.4	
Michoacán	1.7	1.8	1.6	1.5	1.4	Zacatecas	4.4	4.2	4.1	3.9	4.2	
						Nacional	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	

Figura 1. Incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 37, México, 2019.




Gráfica 1. Casos notificados de EDA. México 2014 - 2019.



Página 1

# Gráfica 2. Comparativo de incidencia\* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2018 - 2019.



#### Gráfica 2:

Hasta la semana 37 del 2019 se registraron 811,187 casos, lo que representa un incremento del 4% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

#### Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 37 se notifico 2 caso nuevo de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

Acciones realizadas y datos proporcionados por el CENAPRECE, 2019.

32,310 Casas censadas

Numero de muestras
con hisopo rectal
procesadas en el
laboratorio

3,979,472 (Sobres de vida suero oral) Utilizados

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 22%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.01%.


De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (94.2%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (3.5%).

Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifioidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.


\*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43734.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



#### Noticias relevantes

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Descarta-Salud-casos-de-colera-en-la-Huasteca-20190919-0057.html

### Descarta Salud casos de cólera en la Huasteca

El secretario de Salud en Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, descartó la presencia de cólera en la Huasteca y desmintió los rumores de algunos casos en el municipio San Felipe Orizatlán.

Durante entrevista telefónica, Escamilla Acosta precisó que en Orizatlán han detectado algunos cuadros de enfermedades diarreicas agudas que fueron atendidos en su momento sin que hubiera algún incidente positivo por cólera.

En ese sentido, alertó que el calor excesivo en esta región hidalguense es propicio para la generación de bacterias, por lo que invitó a la población a fortalecer acciones como lavado de manos y tener cuidado al consumir alimentos y agua.

Además, anunció que dan seguimiento a cada uno de los casos de diarrea aguda en Orizatlán e informó sobre la distribución de plata coloidal para que vecinos de la zona desinfecten el agua que consumen.

Por último, el secretario de Salud dijo que la Comisión para la Atención de Riesgos Sanitarios en Hidalgo (Copriseh) verifica que el agua embotellada que se vende en la zona cumpla con la norma sanitaria.

### Elementos de comunicación a la comunidad

- Las entidades federativas con mayor incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 37 son: Zacatecas(4.2) y Sinaloa(3.8).
- Precedidas por Nayarit (3.2) y Baja California Sur (2.9).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 37, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 10 de las 32 entidades federativas (31.3%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 5 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 37, 10 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Baja California Sur (26.1%), Campeche (23.8%), Sonora (17.6%), Aguascalientes (10%), Oaxaca (9.1%), Sinaloa (8.6%), Zacatecas (7.7%) y Nuevo León (6.7%).