

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 15 fueron:
Zacatecas (665.1), Aguascalientes (642.6), Baja California Sur (614.8) y Tlaxcala (572.3).

Seguidas por las entidades de: Colima (488.9), Yucatán (478.3), Nayarit (472.5), Tamaulipas (472.2) y Durango (429.2) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 30.5%, con respecto a la semana 12.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 15, con respecto a la anterior fueron: Yucatán (1.2%), Quintana Roo (6.4%), Querétaro (11.9%), Tamaulipas (14.6%), Baja California (16.2%), Aguascalientes (16.9%), Guanajuato (17.8%) y Colima (19%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 15, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica 15 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 11 hasta la semana 15 de 2017 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	11	12	13	14	15		11	12	13	14	15
Aguascalientes	1006.6	901.0	933.3	763.5	642.6	Morelos	599.4	555.3	559.7	538.7	390.1
Baja California	532.1	463.8	474.5	465.6	395.5	Nayarit	673.2	594.2	637.6	629.7	472.5
Baja California Sur	963.4	829.6	861.7	813.6	614.8	Nuevo León	609.3	556.8	546.1	469.6	363.6
Campeche	533.2	537.3	595.6	511.8	380.5	Oaxaca	408.9	362.4	336.1	310.5	227.3
Coahuila	469.9	386.1	362.6	370.2	241.1	Puebla	615.2	591.1	548.7	476.2	354.8
Colima	749.8	650.4	628.4	593.6	488.9	Querétaro	666.2	583.7	599.2	466.4	416.9
Chiapas	238.6	236.2	222.9	200.1	155.2	Quintana Roo	538.2	604.2	589.0	456.5	439.0
Chihuahua	538.0	477.7	441.5	405.4	293.6	San Luis Potosí	557.7	488.1	521.8	495.1	362.8
Distrito Federal	590.2	556.5	552.5	528.2	382.2	Sinaloa	675.4	583.3	613.3	539.2	405.1
Durango	714.3	598.7	593.4	528.1	429.2	Sonora	572.7	502.2	507.2	461.0	356.0
Guanajuato	465.9	420.9	417.0	389.1	322.2	Tabasco	441.2	457.1	468.9	440.6	332.3
Guerrero	390.5	375.3	364.5	327.7	266.5	Tamaulipas	666.5	574.8	606.4	547.2	472.2
Hidalgo	684.6	635.9	625.1	586.7	404.3	Tlaxcala	1024.0	918.5	884.7	749.3	572.3
Jalisco	427.7	413.6	435.9	426.1	341.2	Veracruz	370.8	369.3	374.5	345.9	279.3
México	511.1	451.8	459.7	442.8	292.4	Yucatán	488.7	547.5	607.6	478.3	478.3
Michoacán	451.8	393.3	409.8	370.3	264.6	Zacatecas	1071.8	947.0	953.7	891.3	665.1
						Nacional	533.4	488.9	490.8	450.8	343.2

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 15, con respecto a la anterior fueron:

Yucatán	(1.2 %)
Quintana Roo	(6.4 %)
Querétaro	(11.9 %)
Tamaulipas	(14.6 %)
Baja California	(16.2 %)
Aguascalientes	(16.9 %)
Guanajuato	(17.8 %)
Colima	(19.0 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 15 fueron:

Zacatecas	(665.1)
Aguascalientes	(642.6)
Baja California	(614.8)
Tlaxcala	(572.3)

Seguidas por las entidades de: Colima (488.9), Yucatán (478.3), Nayarit (472.5), Tamaulipas (472.2) y Durango (429.2) .


En la semana epidemiológica 15, a nivel nacional se notificaron 343 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 30.5%, con respecto a la semana 12.


Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 15, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 15 de 2017 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2012 - 2017.



*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 2.1% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 15 en menores de un año es de 26,300 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 17,696

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 27 de Abril de 2017.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2016 - 2017.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 15, México 2017.



Noticias relevantes

http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=134868

Exhortan a prevenir enfermedades respiratorias por frente frío en SLP

Posible descenso de temperatura, por frente frío 41 en nuestro estado, puede ocasionar resfriados e infecciones respiratorias y se pueden prevenir

Ante la llegada de un nuevo frente frío, es probable que se viva un refrescamiento en temperaturas para todo el estado, por lo que la Secretaría de Salud hace un llamado a la población, ya que las enfermedades en vías respiratorias pueden presentarse por estos descensos de temperatura y cambios repentinos de clima.

Los virus y microorganismos que provocan las IRAS, suelen encontrar condiciones idóneas con el frío y afectar a la población vulnerable; especialmente en menores de 5 años de edad, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades concomitantes, así lo indicó el doctor Juan Pablo Castillo Palencia, Subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Es importante adoptar una cultura de prevención, para evitar enfermarse de vías respiratorias, si no se toman las medidas adecuadas ante este nuevo frente frío; por lo que se exhorta a la población a evitar el surgimiento de más casos, sobre todo graves en grupos vulnerables.

La prevención comienza desde casa, debemos estar atentos y observar los síntomas como, dolor de cabeza, de articulaciones; fiebre; congestión nasal; decaimiento, tos y ante estos signos, acudir al médico para ser diagnosticados adecuadamente, permanecer en reposo, no acudir a lugares muy concurridos de personas, para evitar contagios; incrementar la ingesta de alimentos con vitamina C, consumir muchos líquidos, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y abrigarse.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 15 fueron:

Zacatecas (665.1), Aguascalientes (642.6), Baja California Sur (614.8) y Tlaxcala (572.3).

Seguidas por las entidades de: Colima (488.9), Yucatán (478.3), Nayarit (472.5), Tamaulipas (472.2) y Durango (429.2) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 30.5%, con respecto a la semana 12.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 15, con respecto a la anterior fueron: Yucatán (1.2%), Quintana Roo (6.4%), Querétaro (11.9%), Tamaulipas (14.6%), Baja California (16.2%), Aguascalientes (16.9%), Guanajuato (17.8%) y Colima (19%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 15, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.