

INFORMACIÓN RELEVANTE DE INFLUENZA

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE).

INFORME SEMANAL DE INFLUENZA 2017/Semana 29

Durante la temporada 2016-2017 (semana 40 a la 20) se registraron 5691 casos y 489 defunciones por influenza en el país. *

TEMPORADA INTERESTACIONAL

El periodo comprendido de la semana epidemiológica 21 a la 39 se considera “Temporada interestacional”, en la cual se continua la vigilancia de influenza y otros virus respiratorios. En este periodo se han confirmado 192 casos positivos a influenza: 144 de A(H3N2), 37 de B, 7 de A(H1N1) y 4 de influenza A. Se han notificado 5 defunciones por influenza: 3 de A(H3N2) y 2 de A(H1N1).

- Al comparar el comportamiento de los casos notificados al Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE) durante la temporada interestacional se observa:
 - Incremento del 13.6% en casos de IRA.
 - Decremento del 25.8% en casos de Neumonía y Bronconeumonía.
- En la temporada interestacional 2017 los grupos etarios con mayor número de casos con influenza son: el de 60 y más, seguido del de 30 a 39 y 20 a 29 años.
- Las entidades con mayor número de casos confirmados a influenza durante la temporada interestacional son: Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Sonora y Tamaulipas; que en conjunto suman el 60.9% del total de casos confirmados.
- Los estados con defunciones por influenza en la temporada interestacional son: Veracruz, Sonora, Jalisco y Tabasco que en conjunto suman el 100% de las defunciones.
- Hasta el momento el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos, que impacten en la virulencia o patogenicidad del virus de influenza; no se han identificado resistencias virales al Oseltamivir.
- El InDRE forma parte del grupo de trabajo del laboratorio de Global Health Security Action Group (GHSAG) y del Laboratory Response Network (LRN) y reporta a FLuNET (Red Mundial de Vigilancia de Influenza, OMS).
- El InDRE notifica periódicamente a FLuNET.

* Cierre preliminar de información

INFORME SEMANAL DE INFLUENZA 2017 TEMPORADA INTERESTACIONAL

Tabla 1. Casos y defunciones con resultado positivo a influenza.

México, 2010 - 2017

Evento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Casos influenza	139	18	52	252	177	77	82	192
Defunciones influenza	7	1	2	3	7	2	5	5

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 20/7/2017.

Descripción: Desde la **semana epidemiológica 21 del año 2017**, se han confirmado 192 casos positivos a influenza y se han presentado 5 defunciones por ésta causa.

Nota: Cada periodo presenta información de la semana epidemiológica 21 a la semana 29.

Tabla 2. Casos por Infección Respiratoria Aguda (IRA) y Neumonía/Bronconeumonía.

México,

	2016	2017	% de cambio
Información Semanal			
• Casos de IRA	2,536,592	2,881,901	13.6
• Casos de Neumonía/Bronconeumonía	15,722	11,665	-25.8

Nota: El Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos presenta información de la semana 21 a la 27.

2.Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos, acceso al 20/7/2017

Descripción: Al comparar el comportamiento de los casos notificados al Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos a la misma fecha de corte de 2016 se observa:

*Incremento del 13.6% en casos de IRA.

*Decremento del 25.8% en casos de Neumonía y Bronconeumonía.

INFORME SEMANAL DE INFLUENZA 2017

Tabla 3. Casos y defunciones por influenza según subtipo viral.
México, 2017

Subtipo viral	2017
Influenza AH3N2	
Casos	144
Defunciones	3
Influenza B	
Casos	37
Defunciones	0
Influenza AH1N1	
Casos	7
Defunciones	2
Influenza A*	
Casos	4
Defunciones	0
Total general	
Casos	192
Defunciones	5


Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 20/7/2017.

*Influenza A : incluye influenza A, AH1 y A no subtipificada.

Descripción: Desde la semana epidemiológica 21 del año 2017, se han confirmado 192 casos positivos a influenza: 144 de A(H3N2), 37 de B, 7 de A(H1N1) y 4 de Influenza A. Se han notificado 5 defunciones por influenza: 3 de A(H3N2) y 2 de A(H1N1).

INFORME SEMANAL DE INFLUENZA 2017

Gráfica 1. Casos por influenza según grupo de edad y tipo de virus identificado. México, 2017




*Influenza A : incluye influenza A, AH1 y A no subtipificada.

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 20/7/2017.

Descripción: En la temporada interestacional 2017 los grupos etarios con mayor número de casos con influenza son: el de 60 y más, seguido del de 30 a 39 y 20 a 29.

Gráfica 2. Circulación de virus respiratorios. México, 2017




Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 20/7/2017.

Descripción: Durante la temporada interestacional 2017 se observa circulación de influenza A(H3N2) (75%), influenza B (19%), A(H1N1) (4%) e Influenza A (2%).

INFORME SEMANAL DE INFLUENZA 2017

Gráficas 3 y 4. Casos y defunciones por Influenza según entidad de residencia. México, 2017




Casos (%) de influenza por entidad de residencia

ENTIDAD	%	% Acum.
Quintana Roo	16.1	16.1
Tabasco	14.6	30.7
Veracruz	13.5	44.3
Sonora	10.4	54.7
Tamaulipas	6.3	60.9
RESTO	39.1	100.0

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 20/7/2017.

Descripción: Las entidades con mayor número de casos confirmados a influenza durante la temporada interestacional son: Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Sonora y Tamaulipas; que en conjunto suman el 60.9% del total de casos confirmados.



Defunciones (%) por influenza por entidad de residencia

ENTIDAD	%	% Acum.
Veracruz	40.0	40.0
Tabasco	20.0	60.0
Sonora	20.0	80.0
Jalisco	20.0	100.0
-	0.0	100.0
RESTO	0.0	100.0

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 20/7/2017.

Descripción: Los estados con defunciones por influenza en la temporada interestacional son: Veracruz, Sonora, Jalisco y Tabasco que en conjunto suman el 100% de las defunciones.

INFORME SEMANAL DE INFLUENZA 2017

Tabla 4. Proporción de casos positivos y defunciones por influenza según entidad federativa. México, 2017

Entidad Federativa	Casos ETI/IRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza	Entidad Federativa	Casos ETI/IRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza
AGUASCALIENTES	108	3	2.8	0	MORELOS	96	1	1.0	0
BAJA CALIFORNIA	29	1	3.4	0	NAYARIT	33	1	3.0	0
BAJA CALIFORNIA SUR	61	1	1.6	0	NUEVO LEÓN	71	6	8.5	0
CAMPECHE	94	3	3.2	0	OAXACA	121	1	0.8	0
COAHUILA	47	0	0.0	0	PUEBLA	104	5	4.8	0
COLIMA	82	3	3.7	0	QUERÉTARO	87	0	0.0	0
CHIAPAS	225	9	4.0	0	QUINTANA ROO	230	31	13.5	0
CHIHUAHUA	91	0	0.0	0	SAN LUIS POTOSÍ	72	8	11.1	0
CIUDAD DE MÉXICO	235	1	0.4	0	SINALOA	32	0	0.0	0
DURANGO	26	0	0.0	0	SONORA	79	20	25.3	1
GUANAJUATO	35	0	0.0	0	TABASCO	166	28	16.9	1
GUERRERO	153	6	3.9	0	TAMAULIPAS	52	12	23.1	0
HIDALGO	49	2	4.1	0	TLAXCALA	117	0	0.0	0
JALISCO	122	2	1.6	1	VERACRUZ	439	26	5.9	2
ESTADO DE MÉXICO	225	3	1.3	0	YUCATÁN	203	10	4.9	0
MICHOACÁN	118	6	5.1	0	ZACATECAS	153	3	2.0	0
					Total general	3,755	192	5.1	5

*% de casos positivos a influenza respecto a los casos ETI/IRAG

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 20/7/2017.

Descripción: Desde la semana 21 del 2017 se han notificado 3755 casos de ETI/IRAG. Las 5 entidades federativas con mayor proporción de casos positivos de influenza en relación a los casos sospechosos detectados son: Sonora (25.3%), Tamaulipas (23.1%), Tabasco (16.9%), Quintana Roo (13.5%) y San Luis Potosí (11.1%).

INFORME SEMANAL DE INFLUENZA 2017

Tabla 5. Casos y defunciones confirmados a influenza distribuidos por semana epidemiológica. México, 2017

Semana 2017	Semanas	Casos confirmados	Defunciones por influenza
21	Semana del 21 al 27 de mayo	23	3
22	Semana del 28 de mayo al 3 de junio	23	2
23	Semana del 4 al 10 de junio	21	0
24	Semana del 11 al 17 de junio	22	0
25	Semana del 18 al 24 de junio	37	0
26	Semana del 25 de junio al 1 de julio	31	0
27	Semana del 2 al 8 de julio	27	0
28	Semana del 9 al 15 de julio	8	0
29	Semana del 16 al 20 de julio	0	0
TOTAL		192	5


Fuente: SINAVE/DGE/SISVEFLU/semanas 21-29/2017

Nota: La semana actual de ésta tabla se construyó de acuerdo a los cortes que realiza el sistema cada jueves para generar y publicar información.

Se han notificado por fecha de inicio de síntomas 192 casos y 5 defunciones por influenza en las semanas 21-29 de la temporada interestacional 2017.

INFORME SEMANAL DE INFLUENZA 2017

Gráfica 5. Casos de Influenza confirmados por semana epidemiológica, 2009-2017



Descripción: El predominio de los subtipos A(H1N1) y A(H3N2) se ha presentado desde 2009, con una distribución bienal, sin embargo, en la pasada temporada 2016-2017 subtipo predominante fue A(H1N1) rompiendo la bienalidad.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Hasta el momento el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos, ni cambios en la virulencia o patogenicidad del virus de influenza. No se han identificado resistencias virales a oseltamivir.
- La vigilancia de la Influenza se realiza bajo las estrategias de tipo centinela y sindromática avalada por la OMS, con información proveniente de 566 Unidades de Salud Monitoras de Influenza (USMI), mediante los criterios de ETI/IRAG, y confirmación por laboratorio para conocer la positividad de casos y su subtipificación.
- La temporada de Influenza 2016-2017 inició en la semana 40 del 2016 y terminó en la semana 20 del 2017.
- Los virus presentados como Influenza A, corresponden a cepas que fueron identificadas como A por PCR tiempo real, que son negativas a virus A(H1N1) y no han llegado a los centros de subtipificación o llegaron con muestra insuficiente.

Fuente:

- 1) SINAVE/DGE/SSA/Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos, corte al 20 de julio de 2017.
- 2) SINAVE/DGE/SSA/Sistema de Vigilancia epidemiológica de Influenza, acceso a plataforma el 20 de julio de 2017.