

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 40 fueron:
Zacatecas (773.9), Baja California Sur (752), Aguascalientes (749.3) y Sinaloa (648.4).

Seguidas por las entidades de: Colima (624.7), Nayarit (594.4), Tlaxcala (573.2), Querétaro (568), Tamaulipas (553.5) y Durango (516.9) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 12.6%, con respecto a la semana 37.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 40, con respecto a la anterior fueron: Coahuila (17.6%), Querétaro (14.2%), Michoacán (5.2%), Oaxaca (1.2%) y Guanajuato (0.7%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 40, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica 40 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 36 hasta la semana 40 de 2017 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	36	37	38	39	40		36	37	38	39	40
Aguascalientes	821.1	880.7	940.0	834.4	749.3	Morelos	540.0	385.4	311.2	373.8	340.4
Baja California	290.1	305.5	368.7	377.7	374.1	Nayarit	557.8	552.0	597.6	590.7	594.4
Baja California Sur	552.9	669.7	757.3	757.5	752.0	Nuevo León	481.9	595.9	527.4	487.1	480.2
Campeche	626.4	570.9	612.5	522.3	430.2	Oaxaca	315.7	358.8	343.1	283.1	288.3
Coahuila	471.9	460.2	454.7	390.6	464.5	Puebla	386.5	438.8	415.8	386.3	358.9
Colima	607.1	635.0	734.7	642.5	624.7	Querétaro	553.5	636.2	628.8	490.2	568.0
Chiapas	249.4	227.2	242.4	251.9	252.9	Quintana Roo	587.7	562.1	581.0	495.6	393.2
Chihuahua	520.5	451.5	418.0	343.8	320.1	San Luis Potosí	477.4	569.4	568.0	494.5	484.4
Distrito Federal	445.5	437.9	426.3	410.6	368.2	Sinaloa	619.3	698.6	732.9	682.3	648.4
Durango	531.7	547.5	551.9	518.3	516.9	Sonora	412.2	400.5	418.4	467.6	426.3
Guanajuato	367.6	436.5	439.4	407.7	413.8	Tabasco	431.4	439.8	437.8	421.8	420.0
Guerrero	421.4	433.2	431.4	366.2	281.0	Tamaulipas	594.9	647.9	624.0	557.0	553.5
Hidalgo	502.9	548.9	566.9	443.6	441.2	Tlaxcala	585.8	704.0	655.0	633.8	573.2
Jalisco	331.5	363.4	389.5	362.7	359.4	Veracruz	294.5	327.9	340.1	330.9	328.9
México	357.1	402.8	392.3	357.3	328.1	Yucatán	690.1	739.0	715.0	525.8	439.6
Michoacán	336.2	316.0	374.4	360.3	381.4	Zacatecas	740.2	879.8	881.4	824.7	773.9
						Nacional	424.9	454.2	454.9	417.7	400.9

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 40, con respecto a la anterior fueron:

Coahuila	(17.6 %)
Querétaro	(14.2 %)
Michoacán	(5.2 %)
Oaxaca	(1.2 %)
Guanajuato	(0.7 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 40 fueron:

Zacatecas	(773.9)
Baja California	(752.0)
Aguascalientes	(749.3)
Sinaloa	(648.4)

Seguidas por las entidades de: Colima (624.7), Nayarit (594.4), Tlaxcala (573.2), Querétaro (568), Tamaulipas (553.5) y Durango (516.9).


En la semana epidemiológica 40, a nivel nacional se notificaron 401 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 12.6%, con respecto a la semana 37.


Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 40, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 40 de 2017 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2012 - 2017.



*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 9.6% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 40 en menores de un año es de 60,458 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 39,547

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 19 de octubre de 2017.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2016 - 2017.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 40, México 2017.



Noticias relevantes

<http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?article=318003>

Casi se duplican las infecciones respiratorias; ya van más de 700 mil enfermos

Cd. Victoria, Tamaulipas.-En lo que va del año casi se han duplicado en Tamaulipas las personas afectadas por infecciones respiratorias agudas, ya que en nueve meses del presente año se han registrado 759 mil 966 casos que han sido atendidos en las diferentes instituciones de salud; la cifra es casi duplicada en comparación con los registrados en el 2016 que fueron 413 mil 144.

De la población afectada las mujeres se enferman más ya que 413 mil 144 acudieron a recibir atención clínica por esta causa, así como 346 mil 822 hombres.

Lo anterior es el reporte federal que hace la Secretaría de Salud de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, que tiene un apartado de los casos de neumonías y bronconeumonías, de los que se contabilizan tres mil 247 expedientes clínicos; mil 601 hombres y mil 696 mujeres.

En este tenor el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que a partir del próximo lunes 16 de octubre se reforzarán las acciones de vigilancia epidemiológica, así como la distribución de medicamentos e insumos a todas las unidades de primer y segundo niveles de atención.

En total, se contempla la aplicación de 520 mil dosis antiinfluenza a los grupos de población en riesgo que son los niños de seis meses a 5 años de edad, mayores de 60 y pacientes con algunos de los siguientes componentes: embarazadas, VIH e inmunocomprometidos, personal de salud, diabéticos no controlados, enfermedades cardíacas, obesidad, enfermedades renales, cáncer, y otras.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 40 fueron: Zacatecas (773.9), Baja California Sur (752), Aguascalientes (749.3) y Sinaloa (648.4). Seguidas por las entidades de: Colima (624.7), Nayarit (594.4), Tlaxcala (573.2), Querétaro (568), Tamaulipas (553.5) y Durango (516.9).
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 12.6%, con respecto a la semana 37.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 40, con respecto a la anterior fueron: Coahuila (17.6%), Querétaro (14.2%), Michoacán (5.2%), Oaxaca (1.2%) y Guanajuato (0.7%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 40, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.