¡¡¡ LEER ATENTAMENTE !!!

INDICACIONES PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE RESULTADOS Y LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS VIALES.

Nota: El vial de eritrocitos "**NO CONTIENE SANGRE TOTAL"**, contiene eritrocitos lavados con solución aditiva, se debe usar para realizar las siguientes pruebas (Grupo Sanguíneo directo, Rh, Variante "D" débil (si la prueba lo requiere), lectinas A1 y A2 (si lo requiere la prueba), Fenotipo Rh, Fenotipo Kell y Coombs directo). El segundo vial contiene suero, se debe usar para realizar las siguientes pruebas (Grupo inverso, Escrutinio de Anticuerpos Irregulares (Rastreo) e Identificación de anticuerpos irregulares).

1. GRUPO SANGUINEO ABO: A partir del vial de eritrocitos, realice la prueba directa para grupo sanguíneo, reporte la imagen en cruces dependiendo el grado de aglutinación (g=graniento, 1+, 2+, 3+, 4+); si la reacción es Negativa anotar las siglas Neg. en los cuadros correspondientes. Para realizar la **PRUEBA INVERSA** utilizar suero del segundo vial, reporte la imagen en cruces dependiendo el grado de aglutinación (g=graniento, 1+, 2+, 3+, 4+); si la reacción es Negativa anotar las siglas Neg. en los cuadros correspondientes.

Si el grupo sanguíneo corresponde al grupo "A", realice la prueba de lectinas para identificar el subgrupo A1 o A2, reporte la imagen en cruces dependiendo el grado de aglutinación (g=graniento, 1+, 2+, 3+, 4+); si la reacción es Negativa anotar las siglas Neg. en los cuadros correspondientes para cada uno de los subgrupos. Si no realiza la prueba coloque una "**X**" en el cuadro "No se realiza" o una "**X**" en el cuadro "No Aplica".

En caso de que el **Rh (D)** fuese negativo, realizar la variante "D" débil y anotar el resultado en el cuadro correspondiente; de lo contrario anotar una "**X**" en el cuadro "No Aplica".

Anotar el resultado final en el cuadro "INTERPRETACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO".

2. FENOTIPO Rh Y FENOTIPO KELL: A partir del vial de eritrocitos, identifique el fenotipo del sistema Rh y fenotipo Kell e interprete sus resultados en cruces dependiendo el grado de aglutinación (g=graniento, 1+, 2+, 3+, 4+); si la reacción es Negativa anotar las siglas Neg. en los cuadros correspondientes. Si no realiza la prueba coloque una "**X**" en el cuadro "No se realiza".

3. ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES (RASTREO): A partir del vial de suero, realice el escrutinio de anticuerpos irregulares (rastreo). Coloque una "**X**" en el cuadro que corresponda ya sea positivo o negativo. Si no realiza la prueba coloque una "**X**" en el cuadro "No se realiza".

4. IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES: A partir del vial de suero, realice la identificación de anticuerpos irregulares e interprete sus resultados. Coloque una "**X**" en el cuadro del o los anticuerpos irregulares identificados. Si no realiza la prueba coloque una "**X**" en el cuadro "No se realiza".

5. COOMBS DIRECTO: A partir del vial de eritrocitos, realice la prueba de Coombs directo e interprete su resultado en cruces dependiendo el grado de aglutinación (g=graniento, 1+, 2+, 3+, 4+); si la reacción es Negativa anotar una "X" en el cuadro correspondiente; si no realiza la prueba coloque una "**X**" en el cuadro "No se realiza".

MÉTODO UTILIZADO: Para cada prueba coloque una "**X**" en el cuadro que corresponda al método utilizado.

ES IMPORTANTE LLENAR LOS CUADROS DE **NO SE REALIZA,** EN CASO DE QUE EL BANCO DE SANGRE O EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN NO REALICE LA PRUEBA.**TODO CUADRO QUE NO ESTE BIEN IDENTIFICADO CON SU RESPUESTA SE TOMARA COMO INCORRECTO.**