

INFORMACIÓN RELEVANTE: ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 48 es: Yucatán(5.1).
- Precedida por Tamaulipas (3.3).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 48, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 11 de las 32 entidades federativas (34.4%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 8 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 48 , 11 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Morelos (33.3%), Nayarit (30.8%), Chihuahua (23.1%), Distrito Federal (16.7%), Querétaro (13.3%), Veracruz (13.3%), Campeche (13%) y Baja California Sur (8%).

Información hasta la semana epidemiológica 48 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 44 hasta la semana 48, por entidad federativa, México 2017.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	44	45	46	47	48		44	45	46	47	48
Aguascalientes	2.3	3.1	3.1	2.7	2.2	Morelos	1.0	1.4	1.6	1.2	1.6
Baja California	1.9	2.0	1.9	1.7	1.8	Nayarit	1.7	1.7	1.8	1.3	1.7
Baja California Sur	4.3	3.6	3.9	2.5	2.7	Nuevo León	2.7	2.6	2.7	2.5	2.4
Campeche	1.7	2.8	2.5	2.3	2.6	Oaxaca	1.2	1.6	1.5	1.3	1.4
Coahuila	2.6	2.6	2.7	2.0	1.8	Puebla	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3
Colima	2.1	2.3	2.5	2.2	1.8	Querétaro	1.4	1.7	1.6	1.5	1.7
Chiapas	1.6	1.8	1.6	1.7	1.6	Quintana Roo	2.2	2.7	2.3	2.9	2.6
Chihuahua	1.4	1.7	1.8	1.3	1.6	San Luis Potosí	2.1	2.2	2.0	1.9	1.7
Distrito Federal	1.3	1.7	1.7	1.8	2.1	Sinaloa	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8
Durango	1.7	1.8	1.8	1.6	1.6	Sonora	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9
Guanajuato	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	Tabasco	1.9	2.9	2.3	2.5	2.3
Guerrero	1.0	1.5	1.3	1.2	1.0	Tamaulipas	3.1	3.2	3.8	3.6	3.3
Hidalgo	1.1	1.6	1.3	1.4	1.3	Tlaxcala	1.5	2.2	2.3	2.3	2.2
Jalisco	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	Veracruz	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7
México	1.1	1.4	1.4	1.4	1.5	Yucatán	3.3	4.6	4.2	5.3	5.1
Michoacán	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	Zacatecas	2.9	3.3	3.0	2.9	2.5
						Nacional	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 48, 11 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Morelos	(33.3 %)
Nayarit	(30.8 %)
Chihuahua	(23.1 %)
Distrito Federal	(16.7 %)
Querétaro	(13.3 %)
Veracruz	(13.3 %)
Campeche	(13.0 %)
Baja California Sur	(8.0 %)

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 48 es:

Yucatán	(5.1)
---------	---------

Precedida por Tamaulipas (3.3).


En 11 de las 32 entidades federativas (34.4%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior; y 8 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 48, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 48, México, 2017.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2012 - 2017.



Información relevante

Gráfica 2:

Hasta la semana 48 del 2017 se registraron 1,139,232 casos, lo que representa un decremento del 21% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 48 se notificó 2 caso nuevo de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

Acciones realizadas y datos proporcionados por el CENAPRECE, 2017.

97,559 visitas casa a casa.

37,682 casos de diarrea estudiados.

647,199 sobres de VSO entregados.

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 23%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (93.8%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (3.9%).


Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 14 de Diciembre de 2017.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2016 - 2017.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

<http://www.20minutos.com.mx/noticia/307395/0/salud-en-qroo-exhorta-a-prevenir-enfermedades-comunes-en-diciembre/>

Salud en Q.Roo exhorta a prevenir enfermedades comunes en diciembre

La Secretaría Estatal de Salud (SESA) emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades comunes en la temporada decembrina, como son los padecimientos gastrointestinales. En entrevista, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2 Homero León Pérez, pidió extremar las medidas de higiene en la preparación de los alimentos, verificar su adecuada cocción y refrigeración para su conservación, consumir más frutas y verduras en la alimentación y tomar agua simple potable o purificada.

Recomendó a la población la desinfección, manejo y conservación del agua; cocer los alimentos, sobre todo pescados y mariscos; lavar con agua potable y jabón frutas y verduras y lavarse las manos antes de la preparación e ingesta de alimentos, después de ir al baño, cambiar pañales o manejo de basura.

También aconsejó almacenar adecuadamente las materias primas que se utilizan para preparar los alimentos cuidando las condiciones de temperatura, iluminación, ventilación y humedad.

Así como mantener limpias las superficies donde se preparan los alimentos, lavar los utensilios, la cocina debe estar libre de restos de comida y grasa, no debe haber agua estancada y no se deben colocar los alimentos en el suelo ni en cajas de cartón.

Elementos de comunicación a la comunidad

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 48 es: Yucatán(5.1).
- Precedida por Tamaulipas (3.3).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 48, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 11 de las 32 entidades federativas (34.4%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 8 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 48, 11 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Morelos (33.3%), Nayarit (30.8%), Chihuahua (23.1%), Distrito Federal (16.7%), Querétaro (13.3%), Veracruz (13.3%), Campeche (13%) y Baja California Sur (8%).