INFORMACIÓN RELEVANTE:
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 12 es: Aguascalientes(4.1).
- Precedida por Tamaulipas (3).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 12, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 14 de las 32 entidades federativas (43.8%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 14 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 12 , 14 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Aguascalientes (32.3%), Coahuila (26.3%), Distrito Federal (21.4%), Durango (16.7%), Querétaro (14.3%), Jalisco (12.5%), Zacatecas (6.5%) y Nuevo León (5.9%).

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EDA

Información hasta la semana epidemiológica 12 del 2018

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 12 , 14 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Aguascalientes	**(32.3 %)**
Coahuila	**(26.3 %)**
Distrito Federal	**(21.4 %)**
Durango	**(16.7 %)**
Querétaro	**(14.3 %)**
Jalisco	**(12.5 %)**
Zacatecas	**(6.5 %)**
Nuevo León	**(5.9 %)**

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 12 es:

Aguascalientes (4.1)

Precedida por Tamaulipas (3).

En 14 de las 32 entidades federativas (43.8%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 14 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 12, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 8 hasta la semana 12, por entidad federativa, México 2018.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	8	9	10	11	12		8	9	10	11	12
Aguascalientes	2.2	2.1	2.9	3.1	4.1	Morelos	2.1	2.3	2.1	2.0	1.9
Baja California	1.3	1.3	1.4	1.7	1.4	Nayarit	2.1	2.1	2.3	2.3	1.9
Baja California Sur	2.8	2.3	2.1	2.3	2.0	Nuevo León	1.7	1.5	1.7	1.7	1.8
Campeche	2.8	2.7	3.0	2.5	2.4	Oaxaca	1.1	1.0	1.2	1.4	1.4
Coahuila	1.7	1.6	1.7	1.9	2.4	Puebla	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2
Colima	2.6	2.5	2.5	2.3	2.4	Querétaro	1.3	1.5	1.5	1.4	1.6
Chiapas	2.3	2.1	2.3	2.2	1.9	Quintana Roo	3.2	2.2	2.8	2.2	2.3
Chihuahua	1.0	1.3	1.6	1.7	1.7	San Luis Potosí	1.5	1.8	1.9	2.0	2.1
Distrito Federal	1.3	1.2	1.6	1.4	1.7	Sinaloa	2.1	2.1	2.1	2.2	1.7
Durango	1.5	1.6	1.9	1.8	2.1	Sonora	1.6	1.3	1.6	1.8	1.9
Guanajuato	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	Tabasco	2.7	2.5	2.8	2.3	1.9
Guerrero	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	Tamaulipas	2.5	2.9	3.0	3.0	3.0
Hidalgo	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	Tlaxcala	2.1	1.6	2.0	1.9	2.0
Jalisco	1.4	1.5	1.4	1.6	1.8	Veracruz	2.0	1.8	1.8	1.6	1.6
México	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	Yucatán	2.4	2.3	2.7	2.6	2.7
Michoacán	1.3	1.2	1.5	1.4	1.3	Zacatecas	2.5	2.8	3.0	3.1	3.3
						Nacional	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 12, México, 2018.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2013 - 2018.



Información relevante

Gráfica 2:

Hasta la semana 12 del 2018 se registraron 204,836 casos, lo que representa un decremento del 27% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 12 se notifico 2 caso nuevo de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

Acciones realizadas y datos proporcionados por el CENAPRECE, 2018.

10,125	visitas casa a casa.
3,207	casos de diarrea estudiados.
75,010	sobres de VSO entregados.

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 22%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (93.4%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (4.1%).

Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 05 de Abril de 2018.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2017 - 2018.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/a-la-baja-tasa-de-enfermedades-diarreicas-salud/

A la baja tasa de enfermedades diarreicas: Salud

Pachuca.- Hasta el momento no ha aumentado la tasa de infecciones diarreicas agudas en menores de cinco años, indicador que se presenta durante la temporada de calor, la cual ya inició en la entidad; las autoridades llaman a no bajar la guardia.
De acuerdo con registros epidemiológicos, la tasa de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en la entidad es una de las más bajas, apenas tiene un 1.2 por cada mil menores de cinco años, refirió la Secretaría de Salud federal, dos décimas menos que al corte del arranque del año.

Comparte ese bajo índice con Jalisco, Michoacán y Guerrero, la tasa se refiere a la mortalidad por EDA en menores de cinco años cuya causa básica de muerte fue una enfermedad infecciosa.
La diarrea es un padecimiento que afecta al intestino, se caracteriza por un aumento en el número habitual de evacuaciones (excremento), las cuales suelen ser muy aguadas o líquidas, puede haber moco o sangre y las niñas y niños pueden tener calentura o vómito.
Generalmente se autolimitan, es decir, no requiere de medicamentos para curarla, sin embargo, si no se trata a tiempo, los menores pueden deshidratarse.

La diarrea es una enfermedad infecciosa producida por virus, bacterias, hongos o parásitos, que afecta principalmente a niños menores de cinco años. Mundialmente causa 4.6 millones de muertes infantiles anuales, de las cuales 70 por ciento ocurre por deshidratación, complicación más frecuente y grave de la enfermedad. Los cuadros diarreicos suelen presentarse frecuentemente en la temporada de verano.

Elementos de comunicación a la comunidad

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 12 es: Aguascalientes(4.1).
- Precedida por Tamaulipas (3).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 12, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 14 de las 32 entidades federativas (43.8%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 14 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 12 , 14 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Aguascalientes (32.3%), Coahuila (26.3%), Distrito Federal (21.4%), Durango (16.7%), Querétaro (14.3%), Jalisco (12.5%), Zacatecas (6.5%) y Nuevo León (5.9%).