

INFORMACIÓN RELEVANTE: ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 15 es: Zacatecas(4.8).
- Precedida por Tamaulipas (3.3).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 15, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 21 de las 32 entidades federativas (65.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 26 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 15 , 21 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Tlaxcala (26.3%), Campeche (23.8%), Querétaro (22.2%), Guerrero (16.7%), Coahuila (14.3%), Yucatán (13.6%), México (13.3%) y Zacatecas (11.6%).

Información hasta la semana epidemiológica 15 del 2018

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 11 hasta la semana 15, por entidad federativa, México 2018.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	11	12	13	14	15		11	12	13	14	15
Aguascalientes	3.1	4.1	3.4	4.5	4.2	Morelos	2.0	2.0	2.2	1.9	2.1
Baja California	1.7	1.4	1.2	1.6	1.5	Nayarit	2.3	1.9	1.9	2.6	2.8
Baja California Sur	2.3	2.1	2.2	2.8	2.7	Nuevo León	1.7	1.9	2.3	2.6	2.9
Campeche	2.5	2.4	2.0	2.1	2.6	Oaxaca	1.6	1.6	1.4	1.6	1.7
Coahuila	1.9	2.5	2.1	2.8	3.2	Puebla	1.4	1.3	1.2	1.7	1.6
Colima	2.2	2.3	2.0	3.0	3.0	Querétaro	1.4	1.6	1.5	1.8	2.2
Chiapas	2.3	1.9	1.6	2.0	2.2	Quintana Roo	2.2	2.3	2.4	2.9	2.7
Chihuahua	1.8	1.8	1.7	2.6	2.8	San Luis Potosí	2.0	2.1	2.0	2.8	2.8
Distrito Federal	1.4	1.7	1.5	1.8	1.9	Sinaloa	2.2	1.8	1.9	2.3	2.3
Durango	1.8	2.1	1.7	2.8	3.1	Sonora	1.8	1.9	1.8	2.6	2.7
Guanajuato	1.3	1.3	1.5	1.8	2.0	Tabasco	2.3	2.0	1.8	2.2	2.0
Guerrero	1.3	1.3	1.1	1.2	1.4	Tamaulipas	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3
Hidalgo	1.2	1.2	1.1	1.7	1.8	Tlaxcala	1.9	2.0	1.8	1.9	2.4
Jalisco	1.6	1.8	2.0	2.4	2.5	Veracruz	1.6	1.6	1.5	1.7	1.8
México	1.3	1.2	1.1	1.5	1.7	Yucatán	2.6	2.7	2.6	2.2	2.5
Michoacán	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	Zacatecas	3.1	3.3	3.6	4.3	4.8
						Nacional	1.7	1.8	1.7	2.1	2.2

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 15, 21 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Tlaxcala	(26.3 %)
Campeche	(23.8 %)
Querétaro	(22.2 %)
Guerrero	(16.7 %)
Coahuila	(14.3 %)
Yucatán	(13.6 %)
México	(13.3 %)
Zacatecas	(11.6 %)

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 15 es:

Zacatecas	(4.8)
-----------	---------

Precedida por Tamaulipas (3.3).


En 21 de las 32 entidades federativas (65.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior; y 26 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 15, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 15, México, 2018.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2013 - 2018.



Información relevante

Gráfica 2:

Hasta la semana 15 del 2018 se registraron 272,361 casos, lo que representa un decremento del 23.4% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 15 se notificaron 2 casos nuevos de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

Acciones realizadas y datos proporcionados por el CENAPRECE, 2018.

11,173	visitas casa a casa.
5,833	casos de diarrea estudiados.
135,577	sobres de VSO entregados.

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 23%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (93.7%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (3.9%).


Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 25 de Abril de 2018.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2017 - 2018.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

<https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/por-calor-aumentan-los-males-diarreicos-1635935.html>

Por calor, aumentan los males diarreicos

Por calor, aumentan los males diarreicos

Los cambios bruscos de temperatura en Guerrero han provocado que en lo que va del año se tengan registradas poco más de 28 mil enfermedades diarreicas y 155 mil 530 respiratorias agudas, las cuales se complican más en personas que padecen otros males como diabetes o hipertensión arterial.

El secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, dijo también que hasta la fecha las principales causas de muerte en la entidad, son los infartos y la diabetes, donde existen pacientes de 30 años que a pesar que se les detecta a tiempo, no se cuidan y es donde vienen las complicaciones.

"Hay una reducción en enfermedades diarreicas en poco más del 35 por ciento, mientras que en las respiratorias un 12 por ciento menos, esto ocurre debido a los cambios bruscos de temperatura y a la falta de prevención por parte de la población en general", expresó.

De la Peña Pintos recomendó a la población extremar las medidas de higiene como el correcto lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, además beber agua hervida o embotellada para evitar enfermedades gastrointestinales, como la diarrea, mientras que el frío provoca males respiratorios.

"La primera causa de muerte siguen siendo la diabetes y los infartos, pero estas se unen a otras enfermedades que dificultan como la hipertensión, por eso no deben aumentar de peso y hacer ejercicio todos los días, por lo menos 30 minutos de movimiento, como caminar", explicó.

Elementos de comunicación a la comunidad

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 15 es: Zacatecas(4.8).
- Precedida por Tamaulipas (3.3).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 15, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 21 de las 32 entidades federativas (65.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 26 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 15, 21 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Tlaxcala (26.3%), Campeche (23.8%), Querétaro (22.2%), Guerrero (16.7%), Coahuila (14.3%), Yucatán (13.6%), México (13.3%) y Zacatecas (11.6%).