

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 16 fue:

Zacatecas (752.8).
- Seguida por las entidades de: Aguascalientes (619.7), Baja California Sur (586.8), Colima (575.7), Tlaxcala (548.4), Tamaulipas (546.6), Nayarit (528.1), Yucatán (523.8) y Sinaloa (489.2) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 5.6%, con respecto a la semana 13.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 16, con respecto a la anterior fueron: Michoacán (30%), Veracruz (12.6%), Hidalgo (11.6%), Quintana Roo (10.6%), Oaxaca (9.1%), Tabasco (8.1%), Yucatán (7.9%) y Baja California (7.5%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 16, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.

Información hasta la semana epidemiológica 16 del 2018

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 12 hasta la semana 16 de 2018 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	12	13	14	15	16		12	13	14	15	16
Aguascalientes	827.6	732.8	807.8	723.7	619.7	Morelos	413.1	371.3	405.7	395.4	407.7
Baja California	316.8	288.2	311.2	268.6	292.8	Nayarit	525.6	455.2	544.3	532.4	528.1
Baja California Sur	733.1	599.3	672.2	572.0	586.8	Nuevo León	601.2	504.8	500.9	476.1	470.7
Campeche	520.2	430.3	476.5	462.9	475.4	Oaxaca	246.2	213.4	241.2	236.3	259.4
Coahuila	451.2	347.7	380.1	354.4	374.6	Puebla	378.2	319.6	350.3	317.8	337.6
Colima	587.7	533.3	583.0	604.8	575.7	Querétaro	520.3	429.2	473.1	388.5	382.3
Chiapas	216.4	165.5	215.2	211.2	222.9	Quintana Roo	537.1	423.4	358.3	444.6	505.1
Chihuahua	457.5	359.6	379.0	322.6	307.6	San Luis Potosí	488.8	413.0	457.3	432.2	460.9
Distrito Federal	412.3	354.3	397.0	368.3	362.0	Sinaloa	605.6	484.0	540.3	488.8	489.2
Durango	560.9	465.3	536.0	504.7	487.6	Sonora	468.4	372.1	389.8	349.5	328.5
Guanajuato	403.5	347.0	386.7	375.1	384.5	Tabasco	348.4	300.2	332.4	334.9	365.5
Guerrero	302.3	214.9	261.3	276.2	281.3	Tamaulipas	583.8	547.4	538.4	525.4	546.6
Hidalgo	548.0	404.0	471.9	420.8	475.0	Tlaxcala	652.3	572.6	533.8	508.6	548.4
Jalisco	345.2	292.0	345.1	325.2	318.1	Veracruz	335.0	285.8	316.4	306.7	347.6
México	332.1	265.1	318.4	290.1	285.6	Yucatán	557.8	527.1	557.4	479.6	523.8
Michoacán	287.2	241.9	230.5	225.3	294.6	Zacatecas	783.3	651.4	784.4	780.7	752.8
						Nacional	414.5	346.3	382.7	359.2	369.4

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 16, con respecto a la anterior fueron:

Michoacán	(30.0 %)
Veracruz	(12.6 %)
Hidalgo	(11.6 %)
Quintana Roo	(10.6 %)
Oaxaca	(9.1 %)
Tabasco	(8.1 %)
Yucatán	(7.9 %)
Baja California	(7.5 %)

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 16 fue:

Zacatecas (752.8)

Seguida por las entidades de: Aguascalientes (619.7), Baja California Sur (586.8), Colima (575.7), Tlaxcala (548.4), Tamaulipas (546.6), Nayarit (528.1), Yucatán (523.8) y Sinaloa (489.2).

En la semana epidemiológica 16, a nivel nacional se notificaron 369 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 5.6%, con respecto a la semana 13.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 16, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 16 de 2018 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2013 - 2018.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 5.5% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 16 en menores de un año es de 26,245 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 16,778

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 03 de Mayo de 2018.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2017 - 2018.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 16, México 2018.



Noticias relevantes

<https://www.quadratin.com.mx/sucesos/disminuyen-en-michoacan-casos-de-infecciones-respiratorias-agudas/>

Disminuyen en Michoacán casos de infecciones respiratorias agudas

MORELIA, Mich.- El número de casos de infecciones respiratorias agudas en el estado han disminuido, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud (SSa).

En su informe semanal de vigilancia epidemiológica, la dependencia federal señala que en la última semana de febrero se presentaron 327.1 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en la última semana de marzo la incidencia fue de 226.8 casos. El pico ocurrió durante la segunda y tercera semana de marzo, ya que en este periodo se registraron 340.9 y 340.5 casos, respectivamente. Para la cuarta semana, la incidencia fue 274 casos.

Cabe señalar que Michoacán es el cuarto estado del país menos afectado respecto a las infecciones respiratorias agudas, ya que entidades como Aguascalientes, Zacatecas y Colima, presentan incidencias de 732.8, 651.4, 594.6 casos, respectivamente, por cada 100 mil habitantes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social señala que las enfermedades respiratorias son padecimientos que se caracterizan por tos, escurrimiento nasal, flemas de color verde o amarillo, fiebre, ronquera, dolor de oído y garganta.

Sin embargo, en ocasiones pueden convertirse en neumonía. Los signos de alarma son: fiebre de 38 grados centígrados que no cede, dificultad para respirar, palidez extrema, los labios y uñas de los pies se ven amoratados, la piel se hunde entre las costillas y se escucha un leve silbido al respirar, por lo que ante cualquiera de estos síntomas se recomienda acudir a urgencias.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 16 fue: Zacatecas (752.8). Seguida por las entidades de: Aguascalientes (619.7), Baja California Sur (586.8), Colima (575.7), Tlaxcala (548.4), Tamaulipas (546.6), Nayarit (528.1), Yucatán (523.8) y Sinaloa (489.2) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 5.6%, con respecto a la semana 13.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 16, con respecto a la anterior fueron: Michoacán (30%), Veracruz (12.6%), Hidalgo (11.6%), Quintana Roo (10.6%), Oaxaca (9.1%), Tabasco (8.1%), Yucatán (7.9%) y Baja California (7.5%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 16, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.