

INFORMACIÓN RELEVANTE: ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 28 es: Zacatecas(4).
- Precedida por Aguascalientes (3.2), Baja California Sur (3.1), Nayarit
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 28, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 12 de las 32 entidades federativas (37.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 6 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 28 , 12 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: San Luis Potosí (44.4%), Durango (38.1%), Baja California Sur (29.2%), Colima (20.8%), Guerrero (16.7%), Zacatecas (11.1%), Nayarit (10.7%) y Michoacán (7.1%).

Información hasta la semana epidemiológica 28 del 2018

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 24 hasta la semana 28, por entidad federativa, México 2018.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	24	25	26	27	28		24	25	26	27	28
Aguascalientes	3.3	3.2	3.1	3.9	3.2	Morelos	2.9	2.9	2.5	2.5	2.4
Baja California	1.6	1.4	1.7	1.5	1.3	Nayarit	2.2	2.6	2.3	2.8	3.1
Baja California Sur	2.5	2.9	2.8	2.4	3.1	Nuevo León	2.4	2.2	2.4	2.1	1.8
Campeche	2.5	2.3	2.6	2.4	2.4	Oaxaca	2.4	2.2	2.2	2.4	2.3
Coahuila	2.3	2.1	2.0	2.1	1.8	Puebla	2.0	1.9	1.5	1.6	1.6
Colima	1.9	2.4	2.9	2.4	2.9	Querétaro	2.1	1.9	1.8	2.1	2.0
Chiapas	2.4	2.5	2.2	2.2	2.1	Quintana Roo	3.0	3.1	3.5	3.0	2.6
Chihuahua	2.4	2.4	1.9	1.9	1.8	San Luis Potosí	2.4	2.3	1.9	1.8	2.6
Distrito Federal	2.1	1.8	1.7	1.7	1.4	Sinaloa	2.5	2.6	2.7	2.8	2.7
Durango	2.4	2.8	2.1	2.1	2.9	Sonora	2.9	2.6	2.1	2.1	2.2
Guanajuato	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	Tabasco	2.0	1.8	1.8	1.6	1.2
Guerrero	2.0	2.3	2.2	2.4	2.8	Tamaulipas	3.2	2.9	3.2	2.8	2.9
Hidalgo	1.7	1.3	1.4	1.5	1.3	Tlaxcala	2.9	2.3	2.4	2.2	1.7
Jalisco	1.6	1.8	1.6	1.8	1.8	Veracruz	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7
México	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	Yucatán	3.2	3.2	3.3	3.8	3.3
Michoacán	1.5	1.7	1.4	1.4	1.5	Zacatecas	4.7	4.4	3.6	3.6	4.0
						Nacional	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 28, 12 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

San Luis Potosí	(44.4 %)
Durango	(38.1 %)
Baja California Sur	(29.2 %)
Colima	(20.8 %)
Guerrero	(16.7 %)
Zacatecas	(11.1 %)
Nayarit	(10.7 %)
Michoacán	(7.1 %)


Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 28 es:


Zacatecas	(4.0)
-----------	---------

Precedida por Aguascalientes (3.2), Baja California Sur (3.1), Nayarit (3.1), Colima (2.9), Durango (2.9), Tamaulipas (2.9) y Guerrero (2.8).

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 28, México, 2018.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2013 - 2018.




En 12 de las 32 entidades federativas (37.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior; y 6 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 28, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2017 - 2018.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

<https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/ya-se-han-presentado-problemas-por-la-canicula-ses-1866745.html>

Ya se han presentado problemas por la Canícula: SES

Se deben tomar medidas ante el intenso calor que provoca la canícula, por tratarse de la época más caliente del año. Seis casos relacionados con el intenso calor, dos de ellos deshidrataciones moderadas, dos golpes de calor y dos agotamientos, se han presentado principalmente en la zona huasteca a consecuencia del alza de la temperatura, informó Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de los Servicios Estatales de Salud.

Aunque no especificó el lapso de la ocurrencia de estos casos, sí llamó a tomar medidas ante el intenso calor que provoca la canícula, por tratarse de la época más caliente del año.

Dijo que la deshidratación es la alteración o falta de agua y electrolitos en el cuerpo humano, que puede ser originada por diversas causas, principalmente por enfermedades diarreicas agudas, vómitos frecuentes o exposición a altas temperaturas ambientales, ejercicio intenso.

Estos seis hechos, se han presentados en edades de los extremos, es decir, adultos mayores y menores de edad, quienes son las poblaciones más susceptibles a la deshidratación "es muy importante recordar que existen tres grados de deshidratación: leve, moderada y grave, esta última, si no se trata a tiempo, puede llegar a causar la muerte".

Elementos de comunicación a la comunidad

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 28 es: Zacatecas(4).
- Precedida por Aguascalientes (3.2), Baja California Sur (3.1), Nayarit (3.1), Colima (2.9), Durango (2.9), Tamaulipas (2.9) y Guerrero (2.8).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 28, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 12 de las 32 entidades federativas (37.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior; y 6 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 28, 12 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: San Luis Potosí (44.4%), Durango (38.1%), Baja California Sur (29.2%), Colima (20.8%), Guerrero (16.7%), Zacatecas (11.1%), Nayarit (10.7%) y Michoacán (7.1%).

Información relevante

Gráfica 2:
Hasta la semana 28 del 2018 se registraron 586,467 casos, lo que representa un decremento del 16.1% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:
A nivel nacional, en la semana 28 se notifico 2 caso nuevo de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

Acciones realizadas y datos proporcionados por el CENAPRECE, 2018.

3,453 Casas visitadas
15,598 Muestras de humanos (Hisopo rectal) Procesadas

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 23%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (94%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (3.7%).

Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.