DIVERSIDAD DE AGUACATE EN MÉXICO VOL.



# P. americana var. drymifolia (Schelechtandal & Chamisso, 1831)

Raza Mexicana: Es el aguacate mexicano más antigu Longitud de fruto de 4 a 12 cm.



# P. americana var. guatemalensis (L. O. Williams, 1977)





# P. americana var. americana

Raza Antillana: De acuerdo a evidencias arqueológicas señalan la existencia de esta raza en Perú desde hace 3,000 a 4,000 años a. C. El uso de esta raza en la agricultura es como porta injerto tolerante a la salinidad, suelos pesados, calcáreos y a la enfermedad de la tristeza del aguacatero (Phytopthora cinnomomi Rands).



ente llamado «Aguacate cimarrón», esta especie a entre altitudes de 2,000 y 2,800 msnm. Se distribu











Variedad «HASS»



# Variedad «FUERTE»



## Variedad «ENCINOS»

Número del título de obtentor: 0064 Fecha de expedición: 27 de abril de 2004 Catalogado como árbol de porte intermedio con un período de floración del mes de septiembre a octubre. El peso de cada fruto



Variedad «BACÓN»

## Variedad «ARIES»

Número del título de obtentor: 0062 Fecha de expedición: 27 de abril de 2004 Considerado un árbol de porte intermedio con un rendimiento promedio de 40 kg por árbol. El peso de cada fruto oscila entre los 300 y 470 g.

SAGARPA

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIÓN

## Variedad «FUNDACIÓN II»

Número del título de obtentor: 0066 Fecha de expedición: 27 de abril de 2004 Solicitante: Fundación Sánchez Colin CICTAME Conocido como arboil de porte bajo con un periodo de floración del mes de febrero a marzo, cada árbol puede producir hasta 40 kg. El peso de cada fruto oscila entre los 250 y 300 g. Longitud de fruto promedio de 10.4 cm.



## Variedad «ARIETE»

Clasificado como árbol de porte intermedio con un perio



## Variedad «COLINMEX»

Número del título de obtentor: 0063 Fecha de expedición: 27 de abril de 2004 Registrado como un árbol de porte intermedio con un p



# Variedad «AGUILAR»



FOTOGRAFÍA

FORMA DE CITAR

El género Persea incluye al menos 150 especies distribuidas principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. México es considerado centro de origen, existen al menos 20 especies emparentadas con el aguacate común (Persea americana Mill) y crecen desde nivel del mar hasta los 2500 msnm. La palabra «Aguacate» deriva del Náhuatl «Ahuacatl» que significa «testículos del árbol».

Debido a la amplia diversidad intraespecífica Persea americana se agrupa en tres razas: mexicana, antillana y guatemalteca. La evidencia más antigua del consumo de esta fruta data de 7,000 a 8,000 años a. C. y fue encontrada en una cueva de Coxcatlán, Puebla. Actualmente, México es el primer productor mundial. En el póster se muestran las principales especies, variedades de uso común y con derecho de obtentor.

CORDENADAS GEOGRAFICAS DATI IM WGS-84



















@SNICS\_SAGARPA







