# PPD AVIAR

Registro: B-0653-034.

**Derivado Proteico Purificado para el diagnóstico de tuberculosis bovina. *Mycobacterium avium* cepa *D4*.**

***-Prueba Cervical Comparativa***

**FORMA FARMACÉUTICA:** Solución líquida.
**ESPECIES:** Bovinos.

**NOMBRE GENÉRICO:**
Derivado proteico purificado preparado a partir de filtrados de cultivos de *Mycobacterium avium* cepa *D4*.

**COMPOSICIÓN CUALI-CUANTITATIVA.**

| COMPUESTO: | CANTIDAD: |
|---|---|
| Concentración de proteínas | 0.45 – 0.55 mg/ml |
| Excipiente | c.b.p. |

**PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS.**
Para la estimulación de linfocitos T sensibilizados para crear una respuesta de hipersensibilidad celular retardada que se presenta como una zona de infiltración y eritema localizado.

**INDICACIONES DE USO.**
Para el diagnóstico de tuberculosis bovina en ganado productor de carne y leche mediante la prueba cervical comparativa.

**PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES.**
No realizar la prueba en hembras gestantes próximas al parto o en periodo de post-parto. No realizar la prueba en animales que hayan sido sometidos a tratamientos con corticosteroides o con depresores del sistema inmune, así como en animales anérgicos. En especies diferentes al bovino como animales de espectáculo, exhibición y fauna silvestre, la SADER, determinará el antígeno diagnóstico, sitio de aplicación, y criterio de interpretación de resultados de acuerdo a las investigaciones científicas a nivel internacional.

**EFECTOS INDESEABLES.**
No se han reportado efectos indeseables al aplicar este producto.

**PRECAUCIONES DE USO.**
Durante su aplicación, implementar medidas asépticas y mantener en refrigeración el producto durante el mayor tiempo posible.

**INTERACCIÓN CON OTRAS VACUNAS Y MEDICAMENTOS.**
No se deberá realizar la prueba en animales que hayan sido sometidos a tratamientos que afecten el nivel del sistema inmune ya que esto originará la aparición de falsos negativos.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN.**
Aplicar 0.1 ml por vía intradérmica por animal.

**SOBREDOSIFICACIÓN.**
Si el volumen de la dosis recomendada se excede se presentarán casos exacerbados de la reacción lo que podrá considerarse como una reacción positiva.

**PRECAUCIONES AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN.**
Utilizar medidas asépticas, determinar el grosor de la piel antes de la aplicación y llevar un registro por cada animal en el que se aplique el producto.

**PERIODO DE RESGUARDO.**
Si los resultados de la prueba determinan un animal sospechoso de estar infectado con tuberculosis, la prueba deberá de repetirse 60 días naturales después de la lectura de resultados. De obtenerse resultados negativos, los animales podrán ser destinados para consumo después de la interpretación de los resultados.

**ADVERTENCIAS.**
El manejo y aplicación de este producto debe ser realizado por un Médico Veterinario.

**PRINCIPALES INCOMPATIBILIDADES.**
No diluir, mezclar o coadministrar con ningún otro producto farmacéutico.

**PERIODO DE VIGENCIA (CADUCIDAD).**
24 meses.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.**
Conservar el producto en refrigeración entre 4° y 8°C. Evitar la congelación del antígeno. No exponer directamente el producto a la luz solar. No utilizar el producto si las condiciones de almacenamiento no han sido las indicadas.

**PRESENTACIÓN.**
Caja colectiva: 10 frascos de 10 pruebas (10 Pba/ 1 ml) presentación individual; 50 pruebas (50Pba/5ml).

**PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO.**
La eliminación del envase y el contenido no utilizado deberá realizarse por medio de incineración.

**VENTA BAJO RECETA DEL MÉDICO VETERINARIO**
**USO EXCLUSIVO VETERINARIO**

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS