

SECUENCIA DE RETIRO DE EPP EN EL LABORATORIO SARS-COV-2 (COVID-19) Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS



RECUERDEN RETIRAR EPP
DE LO **MÁS** CONTAMINADO A
LO **MENOS** CONTAMINADO

1



Después de la toma de muestra o antes de salir del GSB Seguir la técnica "Beaking Method"

RETIRAR EL SEGUNDO
PAR DE GUANTES

2



Con el primer par de guantes puestos, desatar los dos cordones traseros que se encuentran a la altura de la cintura



Posteriormente desatar el cordón trasero o la cinta velcro que se encuentra a la altura del cuello

3

Con la pestaña contemplada en la colocación de EPP, posteriormente sacar manga del guante con cuidado



RETIRO DE CINTA MICROPORÉ

4



Evitar que las manos con el primer par de guantes, tengan contacto con el exterior de la bata desechable y pasar por encima del cuello y de los hombros. Retirar la bata volteándola al revés

RETIRO DE BATA QUIRÚRGICA

5



Tomar el gorro quirúrgico o cubre cabello de la parte trasera y se jala hacia adelante para retirarlo

RETIRO DEL GORRO QUIRÚRGICO
O CUBRE CABELLO

6


Evite tocar la parte exterior



RETIRO DE
ZAPATONES

7

Evite tocar su piel con el guante



RETIRO DEL PRIMER
PAR DE GUANTES

8

Retirar los lentes o careta por la parte de la banda de la cabeza o de las orejas sin tocar la parte delantera. Si las manos se contaminan lavar inmediatamente



RETIRO DE LENTES DE SEGURIDAD,
GOGGLES O CARETA

9



Sin tocar la parte delantera
Si sus manos se contaminan durante la remoción de la máscara / respirador, lavarlas inmediatamente

RETIRAR MASCARILLA
QUIRÚRGICA O RESPIRADOR N95

10

Recomendado en el protocolo de bioseguridad y biocustodia para el manejo de pacientes durante la toma de muestra y procesamiento de muestras



LAVADO
DE MANOS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INDRE

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS