



Boletín Climatológico

005_septiembre_2020

Condiciones presentadas en agosto de 2020



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



CONADESUCA
COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Teléfono: 55-3871-1900, extensión 57011, www.gob.mx/conadesuca
Facebook: [Conadesuca](#) Twitter: [@CONADESUCAAmx](#) Instagram: [CONADESUCA](#)





El Boletín Climatológico es elaborado en apoyo al sector de la agroindustria de la caña de azúcar, en éste se reportan los principales eventos meteorológicos y climatológicos ocurridos en el mes inmediato anterior y que tuvieron incidencia en el campo cañero; se da seguimiento a las temporadas de frentes fríos y ciclones tropicales; a las condiciones que presentaron algunas oscilaciones climáticas; el estado actual del monitor de sequía en México, y; el comportamiento de las variables precipitación y temperatura en el campo cañero para dicho mes.

Este producto va de la mano de la “Perspectiva Climatológica a seis meses” que se elabora los primeros días de cada mes, en esta perspectiva se toman en cuenta los resultados arrojados por el modelo de predicción numérica “Seasonal Climate Forecasts V2. (CFSv2)” del Centro de Predicciones Climáticas de los EUA (CPC-NOAA) y se estiman las variables de precipitación y temperatura. En el boletín climatológico se busca validar lo pronosticado para estas variables.

Lo invitamos a consultar estos dos productos, así como los pronósticos de precipitación y temperatura a diez días en la página del CONADESUCA, en la sección principal de Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero <https://www.gob.mx/conadesuca/> o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-canero>



Boletín climatológico

- Calendario de fenómenos meteorológicos para el sector azucarero
 - Calendario agroindustrial del sector azucarero
- Principales eventos meteorológicos con incidencia en el campo cañero
 - Seguimiento a Ciclones Tropicales – Temporada 2020
 - Monitor de Sequía en México para los municipios cañeros
 - Oscilaciones climáticas
 - Comportamiento de la precipitación y temperatura en AGOSTO
- Validación de la perspectiva de precipitación y temperatura de AGOSTO

Condiciones presentadas en agosto de 2020

El Boletín Climatológico es elaborado en apoyo al sector de la agroindustria de la caña de azúcar y se actualizará cada mes.


Este boletín es un complemento al producto “Perspectiva Climatológica” que se publica los primeros días de cada mes, ambos productos se pueden consultar en la página del CONADESUCA en la sección principal de Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero <https://www.gob.mx/conadesuca/> o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-canero>



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Calendario de fenómenos meteorológicos para el sector azucarero

- Este calendario debe considerarse como una herramienta para prevenir riesgos ante eventos meteorológicos.
- No se debe descartar que estos eventos se presenten previo o posterior a las fechas señaladas.



Notas:

- La temporada de Frentes Fríos inicia oficialmente el 15 de septiembre y concluye el 15 de mayo del siguiente año.
- Las suradas pueden ocurrir desde el 15 de diciembre hasta el 15 de abril y se caracterizan por presentarse antes de un evento de Norte.
- La temporada de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental inicia oficialmente el 15 de mayo y en el Océano Atlántico el 1 de junio, en ambas regiones finaliza el 30 de noviembre.
- El periodo de lluvias varía de acuerdo a la región geográfica del país, a nivel nacional ocurre de junio a noviembre.
- El inicio y duración de la canícula varía, esta puede iniciar en junio y extenderse hasta septiembre.
- El inicio y duración del monzón es variable, a partir de la segunda quincena de junio comienza la vigilancia para los estados del norte del país debido a un cambio en el patrón de los vientos, lo que favorece el desarrollo de lluvias.
- En agroclimatología a este periodo se le conoce como sequía preestival o sequía relativa y varía de acuerdo a la región geográfica del país, a nivel nacional en las zonas cañeras inicia en diciembre y se prolonga a abril del siguiente año.



Calendario agroindustrial del sector azucarero

	2020											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ciclo cañero	... Ciclo cañero 2019/20						Ciclo cañero 2020/21 ...					
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2019/20						Ciclo azucarero 2020/21 ...					
Zafra	... Zafra 2019/20						Zafra 2020/21 ...					

Condiciones meteorológicas ideales durante la etapa de rápido crecimiento



Durante el periodo de lluvias la mayoría del cultivo de caña se encuentra en rápido crecimiento, en esta etapa se da la formación y elongación de la caña con rapidez, se presenta una gran acumulación de materia seca y alcanza su máxima área foliar debido a que las condiciones climáticas lo favorecen, pues se necesitan días de larga duración con alta luminosidad, temperaturas cercanas a los 30°C y buenas condiciones de humedad.



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Principales eventos meteorológicos con incidencia en el campo cañero

Agosto se encuentra dentro del periodo climatológico cálido-húmedo (mayo a octubre) y los principales eventos meteorológicos que incidieron en el campo cañero fueron:

No.	Sistemas meteorológicos ¹	AGOSTO																															Regiones cañeras ²																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	NW	Pac	Cen	NE	P-G	C-G	SE												
1	AMT																																	X	X	X	X	X	X	X											
2	CBP																																	X	X	X															
3	LV																																				X	X	X	X											
4	SAP																																				X		X												
5	OT No. 23																																							X											
6	OT No. 24																																						X	X	X	X	X	X							
7	OT No. 25																																						X	X	X	X	X	X							
8	OT No. 26																																					X	X	X	X	X	X								
9	OT No. 27																																					X	X	X	X	X	X								
10	OT No. 28																																					X	X	X	X	X	X								
11	OT No. 29																																					X	X	X	X	X	X								
12	H. Genevieve Cat. 4																																					X	X												
13	TT Hernan																																					X	X												
14	H. Marco Cat. 1																																												X						
15	OT No. 30																																											X	X	X	X	X	X		
16	OT No. 31																																						X	X	X	X	X	X							
17	OT No. 32																																						X	X	X	X	X	X							
18	OT No. 33																																						X	X	X	X	X	X							
19	Temporal de lluvias																																						X	X	X	X	X	X							
20	ZI - Pacífico																																						X						X						
21	VM																																											X			X				

Notas:

1) Sistemas meteorológicos: AMT, Aire Marítimo Tropical; CBP, Canal de Baja Presión; LV, Línea de Vaguada; TT, Tormenta Tropical; H, Huracán; VM, Vaguada Monzónica; SAP, Sistema de Alta Presión en altura; OT, Onda Tropical; y ZI, Zona de Inestabilidad.

2) Regiones Cañeras: NW, Noroeste; Pac, Pacífico; Cen, Centro; NE, Noreste; P-G, Papaloapan-Golfo; C-G, Córdoba-Golfo, y; SE, Sureste.

Fuente: Elaboración propia con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA (WPC-NOAA, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC-NOAAA, por sus siglas en inglés).



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Seguimiento a Ciclones Tropicales – Pacífico Nororiental - Temporada 2020

Ciclones Tropicales (CT) que se desarrollaron al mes de agosto en el Pacífico Nororiental y que tuvieron incidencia directa o indirecta en el campo cañero





Imagen de referencia: Trayectoria de Ciclones Tropicales 2020.

Fuente: Tropical Globe. <http://tropicaleastpacific.com/>.

CT en la temporada 2020													
No.	Mes	Registro a) CT / b) CICC ²	Máx. categoría alcanzada ³								Total de sistemas ciclónicos		
			DT	TT	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5				
1	Abril	CT	1	-	-	-	-	-	-	1	0		
		CICC	-	-	-	-	-	-	-	0			
2	Mayo	CT	-	1	-	-	-	-	-	1	1		
		CICC	-	1	-	-	-	-	-	1			
3	Junio	CT	1	1	-	-	-	-	-	2	0		
		CICC	-	-	-	-	-	-	-	0			
4	Julio	CT	2	1	-	-	-	1	-	4	1		
		CICC	-	1	-	-	-	-	-	1			
5	Agosto	CT	1	3	-	1	-	1	-	6	2		
		CICC	-	1	-	-	-	1	-	2			
6	Septiembre	CT									8		
		CICC											
7	Octubre	CT									4		
		CICC											
8	Noviembre	CT									6		
		CICC											
Totales			CT	5	6	-	1	-	2	-	14	2	
			CICC	-	3	-	-	-	1	-	4		

Notas: 1. Registro de sistemas: a) CT, No. de Ciclones Tropicales y b) CICC, No. de Ciclones con Incidencia en el Campo Cañero (ya sea de forma directa o indirecta).
 2. Incidencia directa se define como la trayectoria del sistema que pasa sobre la superficie cañera; mientras que, en la indirecta el sistema pasa cercano a la superficie cañera.
 3. Máxima categoría alcanzada: DT, Depresión Tropical; TT, Tormenta Tropical; H-1, Huracán categoría 1; H-2, Huracán categoría 2; H-3, Huracán categoría 3; H-4, Huracán categoría 4; H-5, Huracán categoría 5.



Efectos de un Ciclón Tropical en el campo cañero



Lluvias significativas.



Inundaciones.



Acame de la caña por vientos fuertes.



Deslizamientos de ladera en zonas de montaña.

Seguimiento de Ciclones Tropicales con incidencia en el campo cañero en agosto

No.	Ciclón Tropical	Máxima cat. alcanzada ¹	Período de duración		Vientos máx. (km/h)	Presión mín. central (hPa)	Tocó tierra		Tipo de Incidencia (directa o indirecta)	Máxima cat. alcanzada ¹	Región cañera	Lluvia registradas ²	Fecha
			Fecha inicio	Fecha fin			si/no	Lugar (aprox.)					
1	Genevieve	H. Cat. 4	16	21	213	950	NO	-----	indirecta	H. Cat. 4	1) Sureste 2) Pacífico 3) Noroeste	F a MF M a MF M a MF	del 16 al 17 del 17 al 20 del 18 al 21
2	Hernan	TT	26	28	74	1001	NO	-----	indirecta	TT	1) Pacífico 2) Noroeste	M a T M a F	del 26 al 28 del 26 al 28

Notas: 1. Máxima categoría alcanzada: ZI, Zona de Inestabilidad; CT, Ciclón Tropical, DT, Depresión Tropical; TT, Tormenta Tropical; H-1, Huracán categoría 1; H-2, Huracán categoría 2; H-3, Huracán categoría 3; H-4, Huracán categoría 4; H-5, Huracán categoría 5.
 2. Lluvias registradas: L = ligeras < 5 mm; M = Moderadas de 5 a 25 mm; F = Fuertes de 25 a 50 mm; MF = Muy Fuertes de 50 a 75 mm; I = Intensas de 75 a 150 mm; T = Torrenciales > 150 mm

Tablas y Grafico: Seguimiento de Ciclones Tropicales con incidencia en el campo cañero.
 Elaboró: CONADESUCA, Fuente: Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América (CNH-NOAA) <https://www.nhc.noaa.gov/>.

La temporada de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental inició oficialmente el 15 de mayo y en el Océano Atlántico el 1 de junio, en ambas regiones finalizará el 30 de noviembre.

Pronóstico oficial para México dirigido al sector cañero: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico_especial_CT_2020_01_may_2020_.pdf



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Seguimiento a Ciclones Tropicales - Atlántico Norte - Temporada 2020

Ciclones Tropicales (CT) que se desarrollaron al mes de agosto en el Atlántico Norte (Golfo de México y Mar Caribe) y que tuvieron incidencia directa o indirecta en el campo cañero




Imagen de referencia: Trayectoria de Ciclones Tropicales 2020.

Fuente: Tropical Globe. <http://tropicalatlantic.com/>

CT en la temporada 2020

- 1 Tormenta Tropical Arthur / del 16 al 19 de mayo
- 2 Tormenta Tropical Bertha / 27 de mayo
- 3 Tormenta Tropical Cristóbal / de 1 al 8 de junio
- 4 Tormenta Tropical Dolly / del 22 al 24 de junio
- 5 Tormenta Tropical Edouard / del 4 al 6 de julio
- 6 Tormenta Tropical Fay / del 9 al 11 de julio
- 7 Tormenta Tropical Gonzalo / del 21 al 25 de julio
- 8 Huracán Hanna Cat. 1 / del 22 al 26 de julio
- 9 Huracán Isaias Cat. 1 / del 28 de jul. al 5 de agosto
- 10 Depresión Tropical 10 / del 31 de jul. al 1 de agosto
- 11 Tormenta Tropical Josephine / del 11 al 16 de ago.
- 12 Tormenta Tropical Kyle / del 14 al 16 de agosto
- 13 Huracán Laura Cat. 4 / del 19 al 27 de agosto
- 14 Huracán Marco Cat. 1 / del 20 al 25 de agosto



Efectos de un Ciclón Tropical en el campo cañero



Lluvias significativas.



Inundaciones.



Acame de la caña por vientos fuertes.




Deslizamientos de ladera en zonas de montaña.

No.	Mes	Registro a) CT / b) CICC ²	Máx. categoría alcanzada ³							Total de sistemas ciclónicos		
			DT	TT	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5			
1	Mayo	CT	-	2	-	-	-	-	-	2		
		CICC	-	-	-	-	-	-	-	0		
2	Junio	CT		2	-	-	-	-	-	2		
		CICC	-	1	-	-	-	-	-	1		
3	Julio	CT	1	3	2	-	-	-	-	6		
		CICC	-	-	1	-	-	-	-	1		
4	Agosto	CT	-	2	1	-	-	1	-	4		
		CICC	-	-	1	-	-	-	-	1		
5	Septiembre	CT										
		CICC										
6	Octubre	CT										
		CICC										
7	Noviembre	CT										
		CICC										
		Totales	CT	1	9	3	-	-	1	-	14	
			CICC	-	1	2	-	-	-	-	3	

Notas: 1. Registro de sistemas: a) CT, No. de Ciclones Tropicales y b) CICC, No. de Ciclones con Incidencia en el Campo Cañero (ya sea de forma directa o indirecta).

2. Incidencia directa se define como la trayectoria del sistema que pasa sobre la superficie cañera; mientras que, en la indirecta el sistema pasa cercano a la superficie cañera.

3. Máxima categoría alcanzada: DT, Depresión Tropical; TT, Tormenta Tropical; H-1, Huracán categoría 1; H-2, Huracán categoría 2; H-3, Huracán categoría 3; H-4, Huracán categoría 4; H-5, Huracán categoría 5.



Seguimiento de Ciclones Tropicales con incidencia en el campo cañero en agosto

No.	Ciclón Tropical	Máxima cat. alcanzada ¹	Información general del Ciclón Tropical				Tocó tierra				Tipo de Incidencia (directa o indirecta)	Máxima cat. alcanzada ¹	Región cañera	Lluvia registradas ²	Fecha						
			Período de duración		Vientos máx. (km/h)	Presión mín. central (hPa)	Tocó tierra														
			Fecha inicio	Fecha fin			si/no	Lugar (aprox.)													
1	Marco	H. Cat 1	20	25	1120	991	NO	-----	-----	-----	-----	indirecta	TT	1) Sureste	L a M	del 21 al 23					

Notas: 1. Máxima categoría alcanzada: ZI, Zona de Inestabilidad; CT, Ciclón Tropical, DT, Depresión Tropical; TT, Tormenta Tropical; H-1, Huracán categoría 1; H-2, Huracán categoría 2; H-3, Huracán categoría 3; H-4, Huracán categoría 4; H-5, Huracán categoría 5.

2. Lluvias registradas: L = ligeras < 5 mm; M = Moderadas de 5 a 25 mm; F = Fuertes de 25 a 50 mm; MF = Muy Fuertes de 50 a 75 mm; I = Intensas de 75 a 150 mm; T = Torrenciales > 150 mm


Tablas y Grafico: Seguimiento de Ciclones Tropicales con incidencia en el campo cañero.
Elaboró: CONADESUCA, Fuente: Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América (CNH-NOAA) <https://www.nhc.noaa.gov/>.

La temporada de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental inició oficialmente el 15 de mayo y en el Océano Atlántico el 1 de junio, en ambas regiones finalizará el 30 de noviembre.

Pronóstico oficial para México dirigido al sector cañero: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico_especial_CT_2020_01_may_2020_.pdf

Condiciones presentadas en agosto de 2020

Monitor de Sequía en México para los municipios cañeros



Para definir la situación de sequía en nuestro país se emplea el Monitor de Sequía en México (MSM), el cual permite determinar su presencia en una área geográfica, así como su intensidad. Este producto es emitido y actualizado quincenalmente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Condiciones para el campo cañero al 15 de agosto de 2020

De acuerdo al Monitor de sequía, de los 267 municipios cañeros, 58 se encontraron dentro de una categoría de sequía (D1 - D2 - D3 - D4), 110 como anormalmente secos (D0) y 99 sin presencia de sequía, ver la siguiente tabla:

No.	Región cañera	Entidad cañera	Número de municipios cañeros según la intensidad de sequía					Municipios sin presencia de sequía	Municipios anormalmente secos - (D0)	Municipios con sequía (D1 - D4)	Total
			D0	D1	D2	D3	D4				
1	Noroeste	Sinaloa	2	2	0	0	0	0	2	2	4
		Nayarit	5	2	0	0	0	4	5	2	11
		Jalisco	23	15	0	0	0	1	23	15	39
2	Pacífico	Michoacán	9	3	5	0	0	0	9	8	17
		Colima	4	0	0	0	0	4	4	0	8
		Tamaulipas	0	0	0	0	0	8	0	0	8
3	Noreste	Veracruz	2	0	0	0	0	4	2	0	6
		San Luis Potosí	4	5	0	0	0	2	4	5	11
		Morelos	17	1	0	0	0	2	17	1	20
4	Centro	Edo. de Méx.	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		Puebla	13	0	0	0	0	7	13	0	20
		Veracruz	0	0	0	0	0	14	0	0	14
5	Papaloapan-Golfo	Veracruz	17	23	0	0	0	14	17	23	54
		Oaxaca	1	1	0	0	0	0	1	1	2
6	Córdoba-Golfo	Veracruz	5	1	0	0	0	12	5	1	18
		Oaxaca	1	0	0	0	0	10	1	0	11
		Tabasco	0	0	0	0	0	6	0	0	6
7	Sureste	Campeche	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		Quintana Roo	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Chiapas	5	0	0	0	0	8	5	0	13
		Total:	110	53	5	0	0	99	110	58	267


Tabla: Municipios cañeros que presentan afectación por sequía al 15 de agosto de 2020. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: SMN. Monitor de sequía de México <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico>

Nota: Se debe de tomar con reserva el resultado de este proceso, ya que el análisis del MSM parte de información a escala nacional; por lo que se toma en cuenta el dato más extremo en la clasificación de sequía (D1, D2, D3, D4) para asignarla a la superficie cañera. Es decir, el que un municipio caiga dentro de una categoría de sequía asignada por el MSM, significa que no necesariamente el 100% de su superficie tiene ese grado de afectación. Sin embargo, este monitor ayuda a determinar la presencia de sequía en cierta área geográfica, así como su intensidad.



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Monitor de Sequía en México para los municipios cañeros



Los rangos de intensidad de sequía de acuerdo al sistema de monitoreo son:

- 1) **Anormalmente Seco (D0):** Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía; al inicio, debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios; mientras que, al final del periodo puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.
- 2) **Sequía Moderada (D1):** Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.
- 3) **Sequía Severa (D2):** Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del recurso hídrico.
- 4) **Sequía Extrema (D3):** Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.
- 5) **Excepcional (D4):** Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua.

Para definir la situación de sequía en nuestro país se emplea el Monitor de Sequía en México (MSM), el cual permite determinar su presencia en una área geográfica, así como su intensidad. Este producto es emitido y actualizado quincenalmente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Condiciones para el campo cañero al 31 de agosto de 2020

De acuerdo al Monitor de sequía, de los 267 municipios cañeros, 68 se encontraron dentro de una categoría de sequía (D1 - D2 - D3 - D4), 114 como anormalmente secos (D0) y 85 sin presencia de sequía, ver la siguiente tabla:

No.	Región cañera	Entidad cañera	Número de municipios cañeros según la intensidad de sequía					Municipios sin presencia de sequía	Municipios anormalmente secos - (D0)	Municipios con sequía (D1 - D4)	Total
			D0	D1	D2	D3	D4				
1	Noroeste	Sinaloa	0	4	0	0	0	0	0	4	4
		Nayarit	3	2	0	0	0	6	3	2	11
		Jalisco	13	16	0	0	0	10	13	16	39
		Michoacán	8	4	5	0	0	0	8	9	17
2	Pacífico	Colima	3	0	0	0	0	5	3	0	8
		Tamaulipas	7	0	0	0	0	1	7	0	8
		Veracruz	6	0	0	0	0	0	6	0	6
		San Luis Potosí	4	7	0	0	0	0	4	7	11
3	Noreste	Morelos	13	3	0	0	0	4	13	3	20
		Edo. de Méx.	1	0	0	0	0	1	1	0	2
		Puebla	11	0	0	0	0	9	11	0	20
		Veracruz	2	0	0	0	0	12	2	0	14
4	Centro	Veracruz	17	25	0	0	0	12	17	25	54
		Oaxaca	1	1	0	0	0	0	1	1	2
		Veracruz	15	1	0	0	0	2	15	1	18
		Oaxaca	1	0	0	0	0	10	1	0	11
5	Papaloapan-Golfo	Tabasco	4	0	0	0	0	2	4	0	6
		Campeche	1	0	0	0	0	1	1	0	2
		Quintana Roo	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		Chiapas	3	0	0	0	0	10	3	0	13
Totales:			114	63	5	0	0	85	114	68	267

Tabla: Municipios cañeros que presentan afectación por sequía al 31 de agosto de 2020. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: SMN. Monitor de sequía de México. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico>.

Nota: Se debe de tomar con reserva el resultado de este proceso, ya que el análisis del MSM parte de información a escala nacional; por lo que se toma en cuenta el dato más extremo en la clasificación de sequía (D1, D2, D3, D4) para asignarla a la superficie cañera. Es decir, el que un municipio caiga dentro de una categoría de sequía asignada por el MSM, significa que no necesariamente el 100% de su superficie tiene ese grado de afectación. Sin embargo, este monitor ayuda a determinar la presencia de sequía en cierta área geográfica, así como su intensidad.



Oscilaciones climáticas

Algunas oscilaciones climáticas¹ que ayudan a entender la variabilidad climática y el comportamiento de las variables lluvia y temperatura durante el mes son:

El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

Estado actual

Neutro

**Alerta:
Vigilancia de fase La Niña**

La mayoría de los modelos de predicción muestran condiciones para mantener el ENOS en fase Neutra durante el verano y con una probabilidad de 50-55% de desarrollo de La Niña durante el otoño y que continúe hasta el invierno de 2020-21 con una probabilidad del 50%

Condiciones neutrales de ENOS no generan un patrón atmosférico que ayude a crear una perspectiva climática. Es necesario monitorear otras oscilaciones como la MJO, NAO, etc.

Oscilación “Madden-Julian” (MJO)

Estado actual

Fase 2-3-4

La MJO es una oscilación de corto periodo, tiene un ciclo de 30 a 60 días. Es importante darle seguimiento cuando pasa por nuestra región, ya que modula patrones de precipitación de corto periodo, actividades de Ciclones Tropicales (CT) y el Monzón de Norteamérica. Tiene mayor intensidad en episodios de ENOS Neutral y Niña débil.

En nuestro país se observa que:

Fases 3, 4, 5 y 6: se presentan lluvias por debajo del promedio.

Fases 1, 2, 7 y 8: se presentan lluvias por arriba del promedio.

En agosto la MJO transitó en las fases 4-5-6-7-8- 1-2-3, dio un giro completo por el planeta; durante la segunda mitad del mes pasó por las fases 7-8-1-2 de manera muy activa por nuestra región, lo que ocasionó un temporal de lluvias en nuestro país, así como el desarrollo de varios sistemas ciclónicos en las cuencas del Pacífico Nororiental y del Atlántico.

Para más información sobre el pronóstico de las oscilaciones climáticas ver la “Perspectiva Climatológica a 6 meses”



Comportamiento diario y mensual por ingenio azucarero y región cañera de las variables:

- **Precipitación acumulada**
- **Temperatura máxima**
- **Temperatura media**
- **Temperatura mínima**

Condiciones presentadas en agosto de 2020



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Precipitación acumulada mensual por ingenio azucarero y región cañera






Imagen de referencia: Lluvia acumulada mensual. Lluvia registrada por EMA's a nivel nacional.

Fuente: SMN-CONAGUA. Datos preliminares del SIH.

Los 10 ingenios con máxima lluvia acumulada mensual

No.	Ingenio Azucarero	Región Cañera	Entidad Cañera	Lluvia en mm
1	José María Morelos	Pacífico	Jalisco	602.7
2	Huixtla	Sureste	Chiapas	565.8
3	Azsuremex	Sureste	Tabasco	559.8
4	Adolfo López Mateos	Papaloapan - Golfo	Oaxaca	552.2
5	Tres Valles	Papaloapan - Golfo	Veracruz	427.5
6	Puga	Noroeste	Nayarit	411.2
7	Central Motzorongo	Córdoba - Golfo	Veracruz	390.6
8	El Molino	Noroeste	Nayarit	380.9
9	Calipam	Centro	Puebla	372.7
10	El Carmen	Centro	Veracruz	365.9

Graficas y tabla: Lluvia acumulada mensual vs la climatología. Lluvia registrada por EMA's a nivel nacional.

Elaboró: CONADESUCA. Fuente: Resúmenes Mensuales de Temperaturas y Lluvia. SMN-CONAGUA. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias>

AGOSTO

La precipitación acumulada a nivel nacional en las zonas cañeras fue de:

260.5 mm

21.3 mm por arriba de la climatología que es de 239.2 mm





Condiciones presentadas en agosto de 2020

Precipitación acumulada diaria por ingenio azucarero

No.	Región Cañera	Entidad Cañera	Nombre del Ingenio	AGOSTO - 2020																																						Lluvia acumulada mensual	Máx. lluvia mensual	Prom. lluvia mensual	Días con lluvia	Días sin lluvia
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
1	Noroeste	Sinaloa	Eldorado	8.8																																40.7	10.3	1.3	6	25						
2		El Molino	17.0	9.1	72.7	7.0	8.2	4.6	5.6	2.2	14.8	51.5		1.4	21.4			4.9	6.0	22.6	2.3	11.2	11.1	37.7	42.3	24.3	4.4	1.7	6.2	30.4	14.2	24.5	459.9	72.7	14.8	27	4									
3		Puga	19.7	15.6	45.0	18.4	45.4	2.7	12.6	17.5	8.7	34.3		1.3	23.4	5.9		10.1	5.7	34.8	1.6	6.1	6.0	28.3	31.1	20.6	10.8	6.3	8.0	1.8	19.0	9.9	33.2	483.5	45.4	15.6	29	2								
4	Noreste	Tamaulipas	Aarón Sáenz Garza	54.8	6.2	1.8		8.8	3.3		7.3	7.3		1.1						3.0	2.6		6.3	9.0	7.2	9.7	6.3									138.7	54.8	4.5	15	16						
5		El Mante	2.6	47.2	3.8	3.4		1.9	4.0		7.6	10.1	1.2								1.4	1.8	1.8		3.0	7.5	3.8	10.6	6.8									120.4	47.2	3.9	17	14				
6		El Higo						1.8	7.2	48.1	26.3		3.8	23.2	22.1					8.0																	255.7	63.6	8.2	12	19					
7		Pánuco																																					143.8	58.1	4.6	7	24			
8		Alianza Popular	5.4	56.3																																			140.4	56.3	4.5	12	19			
9		Plan de Ayala	11.5	50.4																																			191.5	50.4	6.2	11	20			
10		Plan de San Luis	5.0	34.2																																			128.4	34.2	4.1	15	16			
11		San Miguel del Naranjo	6.8																																				70.6	27.8	2.3	8	23			
12	Pacífico	Jalisco	Bellavista	14.3	1.5	23.8	47.7	2.4	2.2	7.2	6.1	7.4	24.0		15.9																					213.7	47.7	6.9	19	12						
13		José María Morelos	5.3	5.1	4.7	10.1	13.7	32.2	2.3		9.9	7.4			17.9	5.6	7.5	9.9			2.9															428.8	163.6	13.8	23	8						
14		Melchor Ocampo	5.6	7.3	3.2	9.3	12.4	17.5	1.6		10.7	9.6		1.2	26.9					7.0	3.2		1.7	7.6	10.3	3.3	12.1	34.3	59.1	25.7	5.9	11.5	289.5	59.1	9.3	23	8									
15		San Francisco Ameca	6.2	33.8	7.8	14.6	9.7	2.9	2.2		2.7	11.6			30.0																					193.8	33.8	6.3	15	16						
16		Tala	18.1	6.4	14.6	12.2	2.6	1.1	4.9	4.3	8.4	12.2	1.5		15.0					2.9	5.4	3.6		1.4	3.0	12.5	6.8									165.4	18.1	5.3	24	7						
17		Tamazula	4.8	2.0	1.7	3.2	5.2	1.9	11.4	21.2	2.9	32.4	4.6	3.0	10.6					3.1	2.1		2.8	12.6	3.0		20.6	35.0	23.3	13.3	7.6	4.0				235.0	35.0	7.6	24	7						
18		Quesería	6.1	1.9	1.7		10.7	6.1	25.8	48.6		53.3	3.2		23.0					6.6		4.8		14.3	6.1	2.4	21.1	43.0	64.1	3.4	5.6	6.0					359.2	64.1	11.6	21	10					
19		Lázaro Cárdenas	6.6	12.6	8.5	2.1		4.3	12.6	2.7	2.8	9.0	10.9		5.4	8.3	1.9	4.8	9.5	4.7	3.1			2.6	13.8	19.1	43.7	13.3	7.1	3.9				216.4	43.7	7.0	24	7								
20		Pedernales	7.1	2.3	7.9	4.2	3.2	2.7	3.0	13.1	1.4	4.9	13.3	6.2	1.0	5.4	12.7	2.0	8.6	6.3	4.9	2.3	1.7			1.7		7.1	9.6	25.0	16.1	3.7			179.7	25.0	5.8	27	4							
21		Santa Clara	8.1	2.5	9.0	4.9	1.1		6.3	5.0	1.4	13.0	3.3	16.4	6.7	2.6	5.0	5.4	12.1	8.3	2.0															189.2	20.8	6.1	24	7						
22	Centro	Morelos	Central Casasano	3.3	28.8		15.7	11.2	2.2	21.1	3.9	4.3	2.2			1.6						1.8	1.2		8.6	1.2		6.8	21.3	19.4	10.1						173.0	28.8	5.6	19	12					
23		Emiliano Zapata		19.5		13.5	2.1	2.5	2.8	4.8	4.1	2.0	1.5							2.5		1.3		9.4			13.7	5.1	1.6	2.9	20.9	84.9	26.3			222.3	84.9	7.2	19	12						
24		Atencingo	10.1	4.8		10.1		5.5		4.5	9.4	2.9			1.1						16.4	30.9		2.0	2.9	2.0	12.2	10.4	10.0	34.7			171.4	34.7	5.5	17	14									
25		Puebla	7.7	16.5		6.3	7.0	11.0	4.3	16.0	22.8	4.0	46.4	4.8	1.3	13.2	12.0	33.7	6.7	3.0	21.0	10.1	11.8	5.7	10.5	6.4	16.1	22.5	3.8	18.1	1.3	3.9		348.9	46.4	11.3	29	2								
26		Veracruz	El Carmen	4.2	2.7	18.3		1.6	2.7	3.5	5.2	12.3	12.5	12.3	29.8	6.4	12.4	6.3	14.9	5.8	7.9	9.6	19.1	18.7	36.0	31.8	37.8	5.1	1.7	24.0	42.6	25.2	16.8		428.7	42.6	13.8	29	2							
27	Papaloapan - Golfo	Oaxaca	Adolfo López Mateos	2.8		3.1		13.1	32.4	6.3	15.1	82.1	19.6	101.5	6.5		4.3	9.2	6.6	12.6	1.6	16.1	22.8	4.3	11.3	25.5	23.3	41.0	1.2								509.1	101.5	16.4	25	6					
28		CIASA (Cuatotlapam)				6.8	3.2	6.5	3.7	1.7	49.6	31.6	5.7	50.0		9.9	20.5	12.8	4.2	7.1	1.2										9.6	9.3	1.4			208.7	49.6	6.7	21	10						
29		El Modelo	14.3								29.8	6.2	52.4	21.3	16.6																				216.3	52.4	7.0	11	20							
30		La Gloria	12.5								19.8	2.1	27.1	15.7	10.8	1.3																		156.7	27.1	5.1	11	20								
31		Mahuixtlán	5.1	3.1	9.7	8.8	9.5	1.3	12.6	6.4	9.5	10.6	4.6	25.9		9.2	11.6	1.0	5.9				22.5	28.5	14.8	14.0	10.8	3.4	2.0	4.3	16.4	2.5	13.7		268.3	28.5	8.7	27	4							
32		San Cristóbal				5.0	3.2	2.2	18.6		14.1	19.1	18.2	19.1		9.0	5.6	8.1	1.3	1.0	1.5	2.1	2.0	2.7									3.6	9.6	14.4	2.3		166.2	19.1	5.4	22	9				
33		San Pedro									1.2	7.0	1.1	15.3	7.4	34.9	14.0		9.0	17.4	4.1										14.6	39.3	10.5	5.5		262.9	74.6	8.5	16	15						
34		Tres valles	5.3		5.9	1.3	1.3	12.7	26.4	5.3	26.3	48.4	16.9	96.9	3.2		11.5	6.3	9.3	12.3	3.9	18.8	9.3	32.8	4.7	11.9	21.2	21.0	28.8	1.3	1.0				445.1	96.9	14.4	27	4							
35		Oaxaca	El Refugio	2.7	9.7	11.8		2.2	2.0	4.1</																																				



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Temperatura máxima promedio mensual por ingenio azucarero y región cañera






Imagen de referencia: Temperatura máxima promedio mensual. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional.
Fuente: SMN-CONAGUA. Datos preliminares del SIH.

Los 10 principales ingenios con temperatura máxima promedio mensual registrada

No.	Ingenio Azucarero	Región Cañera	Entidad Cañera	Temperatura en °C
1	Eldorado	Noroeste	Sinaloa	36.4
2	El Mante	Noreste	Tamaulipas	35.7
3	Plan de Ayala	Noreste	San Luis Potosí	35.7
4	Alianza Popular	Noreste	San Luis Potosí	34.8
5	Aarón Sáenz Garza	Noreste	Tamaulipas	34.6
6	La Joya	Sureste	Campeche	34.6
7	Huitzila	Sureste	Chiapas	34.4
8	El Higo	Noreste	Veracruz	34.2
9	San Rafael de Pucté	Sureste	Quintana Roo	34.0
10	Plan de San Luis	Noreste	San Luis Potosí	33.8

Temperatura máxima promedio mensual (°C) - Climatología vs Observada - Agosto 2020



AGOSTO

La temperatura máxima promedio mensual a nivel nacional en las zonas cañeras fue de:

31.5 °C

0.1 °C por arriba de la climatología que es de **31.4 °C**



Condiciones presentadas en agosto de 2020



Temperatura máxima diaria por ingenio azucarero

No.	Región Cañera	Entidad Cañera	Nombre del Ingenio	AGOSTO - 2020																																										Prom. temp. mensual	Máx. temp. mensual	Mín. temp. mensual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
1	Noroeste	Sinaloa	Eldorado	37.1	36.5	36.8	38.0	37.5	38.0	35.4	37.6	36.3	38.0	36.8	36.5	37.0	35.8	36.3	36.6	37.5	35.6	35.2	33.2	36.1	35.8	36.8	38.0	37.0	37.5	38.0	34.5	34.5	36.5	24.0	36.1	38.0	24.0											
2			El Molino	32.4	32.8	31.6	32.2	32.2	30.8	30.9	32.3	31.7	31.3	32.5	31.6	30.8	31.7	32.4	32.0	32.9	28.6	36.0	29.2	30.2	30.7	32.0	30.8	32.8	33.0	32.2	27.8	30.7	29.7	28.4	31.5	36.0	27.8											
3		Nayarit	Puga	32.8	33.5	32.5	32.9	33.0	32.1	32.0	33.4	32.6	32.2	33.4	32.7	31.6	32.5	33.1	32.5	33.6	29.7	35.2	30.3	31.1	31.6	32.8	31.8	33.4	33.6	33.5	28.7	31.4	30.6	31.7	32.3	35.2	28.7											
4	Noreste	Tamaulipas	Aarón Sáenz Garza	35.3	33.7	34.5	35.5	35.7	34.9	34.5	33.6	28.1	28.2	33.7	34.5	34.2	35.0	34.5	34.7	34.9	34.9	35.0	36.2	36.1	33.5	34.2	34.3	33.4	34.8	35.4	35.6	36.0	34.3	34.3	36.2	28.1												
5			El Mante	36.5	35.0	36.0	36.7	36.6	35.8	35.4	35.8	35.3	36.1	35.7	36.1	36.6	36.8	36.5	37.7	37.2	37.7	35.5	35.6	34.5	36.4	33.2	31.0	30.0	32.2	33.7	33.5	34.3	34.6	35.0	35.7	37.7	28.7											
6			El Higo	34.4	34.5	35.5	35.1	36.6	33.4	31.4	30.9	30.5	31.3	32.5	32.8	32.3	33.1	32.5	32.9	35.0	34.2	35.0	36.1	34.0	31.7	39.7	42.6	34.1	36.5	33.8	33.8	36.0	34.1	42.6	30.3													
7		Veracruz	Pánuco	34.3	34.0	33.4	34.4	35.0	33.5	33.7	31.7	25.0	26.7	32.0	31.9	32.6	33.2	32.0	31.7	32.8	33.2	33.7	35.0	35.2	36.4	33.2	31.0	30.0	32.2	33.7	33.5	34.3	34.6	35.0	32.9	36.4	35.6	25.0										
8			Alianza Popular	36.2	36.4	36.3	36.7	36.9	36.8	36.0	32.2	28.8	32.7	34.4	35.1	35.1	34.5	34.7	35.8	35.8	36.9	37.3	37.9	36.3	34.7	31.7	34.1	35.8	35.6	36.0	37.7	28.2	34.7	37.9	28.2													
9	San Luis Potosí	Plan de Ayala	36.7	36.9	36.6	36.6	37.4	37.7	33.6	32.7	29.1	30.5	34.1	34.8	35.9	36.2	35.1	35.2	35.8	36.5	36.4	37.4	37.3	38.8	36.8	34.8	32.3	35.0	36.5	36.1	36.2	36.7	28.0	35.3	38.8	28.0												
10		Plan de San Luis	35.0	33.9	34.4	35.2	35.3	35.7	32.8	31.6	27.3	29.0	32.2	33.3	33.3	34.2	33.2	33.6	33.8	34.7	34.1	34.9	35.6	36.3	34.3	33.8	32.9	34.2	34.2	34.4	34.6	37.1	33.6	36.7	37.3	27.3												
11		San Miguel del Naranjo	34.8	32.8	33.2	34.3	34.6	34.9	32.2	31.3	27.0	30.9	32.5	33.2	33.2	33.8	31.3	34.8	33.6	33.9	35.2	35.2	36.1	36.1	33.6	31.8	34.1	34.6	33.4	34.3	32.0	33.4	36.1	32.7														
12	Pacífico	Jalisco	Bellavista	29.1	30.0	29.1	29.8	29.3	29.5	29.5	26.4	29.2	28.0	28.9	26.7	28.1	29.7	28.4	28.6	25.6	25.6	28.6	28.9	29.9	29.2	28.6	28.2	28.2	29.6	28.5	32.2	28.7	32.2	25.6														
13			José María Morelos	34.5	34.9	34.3	35.1	34.9	34.4	34.5	32.7	31.4	34.9	35.9	31.3	33.3	34.1	34.5	32.5	25.8	31.7	33.5	32.2	34.5	24.5	28.4	32.4	29.9	34.6	32.8	36.1	24.5																
14			Melchor Ocampo	32.4	33.6	32.3	34.5	34.4	33.6	32.4	31.9	34.0	34.5	35.2	33.1	33.9	31.7	33.0	32.1	33.3	25.1	34.1	31.9	30.9	31.7	34.4	34.3	34.2	32.2	24.2	32.1	35.2	24.2															
15		San Francisco Ameca	28.5	31.0	31.5	31.5	32.5	31.0	32.0	33.0	28.0	31.0	33.0	33.1	32.5	31.5	26.0	27.5	31.0	30.5	33.0	30.0	31.0	30.5	33.0	26.0	27.5	28.5	31.5	29.0	30.4	33.0	26.0															
16		Tala	29.7	30.6	30.5	30.2	29.9	30.4	31.5	30.8	27.6	30.7	30.4	30.1	28.4	28.6	30.7	29.5	29.7	26.7	26.5	29.3	29.5	30.8	30.8	29.7	27.9	27.3	28.9	29.3	28.7	29.5	31.5	26.5														
17		Tamazula	28.0	28.6	26.6	29.0	28.2	28.6	29.7	28.7	23.2	29.0	28.5	26.7	25.2	28.4	30.0	27.8	27.1	27.7	27.0	29.6	28.2	28.9	28.2	28.6	28.6	28.4	27.0	23.2	25.3	27.9	25.7	29.9	27.7													
18		Colima	Quesería	33.4	32.9	31.7	31.0	32.7	31.4	31.4	30.8	27.2	32.1	32.9	27.3	28.7	30.9	31.2	33.0	30.4	29.6	30.2	31.0	32.1	27.7	27.5	27.7	24.7	29.2	28.8	33.9	30.5	33.9	24.7														
19		Michoacán	Lázaro Cárdenas	27.3	29.7	26.8	29.8	29.1	29.8	28.9	26.5	27.8	28.0	28.5	26.7	27.0	28.7	28.6	28.8	27.8	28.4	27.9	28.7	28.7	28.8	28.3	23.3	26.4	26.2	33.6	23.3	33.6	23.3															
20			Pedernales	26.7	31.1	25.8	29.3	29.1	31.5	30.2	27.2	27.5	29.1	29.5	27.5	28.8	30.0	29.7	29.0	26.4	29.1	31.3	30.2	29.8	30.6	28.0	29.4	28.6	25.6	33.3	25.6	33.3	25.6															
21	Centro	Santa Clara	29.2	29.6	29.8	31.8	29.6	29.6	31.2	29.3	29.3	28.6	28.8	28.1	27.9	28.8	30.6	27.9	27.7	26.6	28.1	29.1	29.5	30.1	29.9	28.5	26.1	27.0	28.1	23.4	34.7	26.1	34.7	26.1														
22		Morelos	Central Casasano	36.1	27.8	27.6	27.6	27.5	28.0	27.8	29.8	28.9	28.8	28.1	28.4	28.0	29.0	28.9	28.9	27.4	27.4	36.0	29.8	29.6	28.6	26.2	27.3	29.8	25.3	35.3	29.1	36.1	26.2															
23			Emiliano Zapata	33.2	33.5	33.1	33.8	33.2	33.5	32.5	32.4	32.8	31.8	32.9	32.1	32.6	34.3	35.2	32.9	35.7	34.8	34.7	33.7	32.3	33.6	34.6	30.7	31.5	31.8	32.7	35.0	33.2	35.7															
24		Puebla	Atencingo	36.3	34.6	34.6	36.4	34.3	37.4	30.8	34.6	31.8	33.6	33.6	32.8	32.8	36.3	36.3	34.7	32.9	32.7	35.6	34.5	34.7	33.7	32.7	36.3	35.7	33.5	36.4	28.4	32.4	35.7															
25		Veracruz	Calipam	28.2	30.2	30.3	25.4	26.3	27.5	27.3	21.7	24.1	22.2	22.2	21.3	26.8	27.2	28.0	25.1	24.5	28.1	28.1	28.0	26.3	28.7	21.3	20.8	25.3	28.7	28.7	28.7	25.2	28.4	32.6	24.2	34.2	20.8											
26		Oaxaca	El Carmen	27.5	26.9	27.3	27.3	28.0	25.9	25.4	24.9	26.1	24.3	24.3	23.9	26.3	25.9	25.2	26.1	27.3	27.3	28.6	27.3	26.5	24.3	27.0	27.7	27.7	26.8	27.5	28.1	30.8	26.4	30.8	22.4													
27	Papaloapan - Golfo	Veracruz	Adolfo López Mateos	34.9	33.6	34.2	34.3	35.3	34.5	28.7	28.1	30.7	29.4	29.3	29.3	30.8	31.3	30.5	31.0	31.9	31.8	34.1	34.2	34.4	32.4	29.4	29.6	30.2	30.9	32.4	33.3	34.6	35.4	33.1	35.4	35.4												
28			CIASA (Cuatulopam)	33.2	33.9	31.8	32.1	32.5	31.9	29.1	29.7	30.8	31.0	30.4	31.5	31.4	30.4	33.3	33.2	33.5	32.9	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0										
29			El Modelo	34.9	33.8	33.4	34.9	33.9	33.5	31.9	30.1	28.9	29.2	28.3	31.1	30.2	33.5	32.7	33.3	32.5	34.9	35.9	37.7	34.9	34.4	28.9	28.3	33.0	33.0	3																		



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Temperatura media mensual por ingenio azucarero y región cañera





Imagen de referencia: Temperatura media mensual. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional.


Fuente: SMN-CONAGUA. Datos preliminares del SIH.



Los 10 principales ingenios con temperatura media mensual registrada

No.	Ingenio Azucarero	Región Cañera	Entidad Cañera	Temperatura en °C
1	Eldorado	Noroeste	Sinaloa	30.9
2	El Mante	Noreste	Tamaulipas	29.9
3	Plan de Ayala	Noreste	San Luis Potosí	29.8
4	San Rafael de Pucté	Sureste	Quintana Roo	29.2
5	La Joya	Sureste	Campeche	29.1
6	El Higo	Noreste	Veracruz	29.1
7	Presidente Benito Juárez	Sureste	Tabasco	28.7
8	Alianza Popular	Noreste	San Luis Potosí	28.7
9	Aarón Sáenz Garza	Noreste	Tamaulipas	28.7
10	Huixtla	Sureste	Chiapas	28.6

Graficas y tabla: Temperatura media mensual vs la climatología. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional.

Elaboró: CONADESUCA. Fuente: Resúmenes Mensuales de Temperaturas y Lluvia. SMN-CONAGUA. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias>

AGOSTO

La temperatura media mensual a nivel nacional en las zonas cañeras fue de:

25.9 °C

0.4 °C por arriba de la climatología que es de 25.6 °C



Condiciones presentadas en agosto de 2020



Temperatura media diaria por ingenio azucarero

No.	Región Cañera	Entidad Cañera	Nombre del Ingenio	AGOSTO - 2020																																	Prom. temp. mensual	Máx. temp. mensual	Mín. temp. mensual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	Noroeste	Sinaloa	Eldorado	30.8	30.1	30.4	32.0	30.8	31.3	30.2	31.7	31.6	32.0	30.9	30.7	31.0	30.2	30.8	31.4	30.3	29.7	29.5	30.2	30.2	31.4	32.2	31.0	31.7	32.7	30.2	30.2	28.8	31.0	24.0	30.7	32.7	24.0		
2		Nayarit	El Molino	26.2	26.7	25.6	26.7	26.4	26.3	26.4	27.2	27.0	26.1	26.9	25.9	24.9	26.4	27.0	26.0	26.0	24.1	28.4	26.1	26.0	25.2	25.7	25.5	26.7	27.2	27.0	24.4	25.0	24.7	24.2	26.0	28.4	24.1		
3		Tamaulipas	Puga	26.7	27.4	26.5	27.3	27.1	27.1	27.2	28.0	25.7	26.9	27.7	25.5	27.0	27.6	26.7	28.5	28.7	29.2	29.0	28.4	28.5	28.5	29.6	29.5	28.6	27.5	27.2	27.7	25.5	25.2	26.8	25.0				
4		Veracruz	Aarón Sáenz Garza	29.3	27.9	28.4	29.2	28.9	28.8	28.9	28.4	25.2	25.0	27.6	28.5	28.7	29.2	29.0	28.4	28.5	28.5	29.4	29.5	28.6	27.6	27.5	27.1	28.4	29.0	29.3	29.9	30.2	28.5	30.2	30.0				
5		San Luis Potosí	El Mante	30.5	29.0	29.6	30.8	30.6	31.0	29.7	28.6	25.6	25.9	29.1	30.1	29.9	30.2	30.1	30.1	29.7	29.9	30.2	30.3	30.8	30.8	30.8	30.7	31.0	31.2	31.5	29.9	31.5	25.6	31.5	25.6				
6		Veracruz	El Higo	29.7	29.3	29.5	30.1	28.8	28.4	27.3	26.8	27.0	27.0	27.9	28.2	28.4	28.0	28.7	27.4	28.6	29.4	29.0	29.3	30.0	29.0	27.2	31.3	33.1	29.9	30.2	30.9	29.3	30.8	29.0	33.1	26.8			
7		San Luis Potosí	Pánuco	28.8	28.3	27.9	28.3	29.1	28.6	28.5	27.1	23.6	23.8	26.6	27.1	26.8	27.2	27.0	27.1	27.3	27.6	27.9	28.7	28.9	29.5	28.2	26.3	25.8	26.9	27.8	28.4	29.3	29.4	27.6	29.5	23.6			
8		San Luis Potosí	Alianza Popular	29.6	29.6	29.2	29.5	30.1	29.9	28.6	27.4	24.9	25.1	27.5	28.8	29.1	28.6	28.4	28.5	28.3	28.9	28.9	29.6	29.7	30.0	28.4	26.7	28.4	29.4	29.9	29.7	30.6	25.9	28.7	30.6	24.9			
9		San Luis Potosí	Plan de Ayala	30.0	30.3	29.6	30.3	30.7	30.9	28.9	28.0	25.6	26.7	28.3	29.2	29.0	29.7	29.1	29.4	29.0	30.0	30.5	30.3	30.9	27.6	29.4	29.5	30.5	30.3	30.2	30.7	26.4	29.4	31.3	25.6				
10		San Luis Potosí	Plan de San Luis	29.1	28.4	28.5	29.0	29.2	29.4	28.4	27.5	24.5	25.5	27.4	28.1	28.5	28.0	28.2	28.1	28.6	28.4	28.9	29.1	29.7	29.2	28.3	26.7	27.9	28.9	29.1	29.3	30.3	27.8	28.3	30.3	24.5			
11		San Luis Potosí	San Miguel del Naranco	27.6	26.7	26.8	27.5	28.1	28.2	27.3	26.5	24.2	26.2	28.0	27.2	26.9	27.1	26.3	27.1	28.0	27.9	29.0	28.5	27.8	25.5	27.2	27.9	27.6	27.6	28.4	26.6	27.3	29.0	24.2					
12	Pacífico	Jalisco	Bellavista	22.9	23.3	23.2	23.6	23.5	23.2	24.0	23.5	22.4	23.2	22.8	22.9	21.6	22.6	22.9	21.4	22.6	21.3	21.0	22.5	23.0	24.0	22.0	22.2	22.7	23.7	22.4	22.2	22.3	23.1	24.2	22.8	24.2	21.0		
13		Jalisco	José María Morelos	28.3	28.4	27.9	28.7	28.6	28.3	28.1	27.4	27.5	28.4	28.9	26.9	26.7	27.8	28.8	25.7	26.4	23.6	26.3	27.2	26.7	28.4	28.0	27.9	27.8	26.6	28.5	28.3	27.3	28.9	23.1	27.3	23.1			
14		Jalisco	Melchor Ocampo	24.6	25.3	25.7	25.9	27.2	26.8	25.8	24.9	25.8	26.8	26.6	26.2	27.0	25.5	25.4	24.2	24.8	22.0	26.7	24.7	24.3	24.6	25.8	26.8	27.2	26.2	22.1	22.8	22.6	24.5	23.9	25.3	27.2	22.0		
15		Jalisco	San Francisco Ameca	23.3	23.8	24.3	24.5	25.2	24.5	24.3	25.0	23.5	24.5	25.0	25.0	24.2	22.5	24.5	24.7	23.0	23.7	21.5	22.2	24.0	24.5	24.5	25.5	25.5	23.7	23.9	25.5	21.5	23.9	21.5					
16		Jalisco	Tala	23.2	23.6	23.8	23.5	23.7	23.5	24.2	23.9	23.0	23.8	23.4	23.4	22.3	22.7	23.6	23.2	21.8	23.1	21.3	22.9	23.5	24.6	24.0	22.7	23.7	23.3	24.4	23.1	23.2	23.3	22.1	23.2	21.3			
17		Colima	Tamazula	22.2	22.4	21.1	22.6	22.2	22.0	22.7	22.6	19.8	21.9	22.8	21.6	20.6	22.1	22.3	20.9	21.3	21.9	22.2	22.5	23.0	22.3	22.3	22.8	22.2	22.6	22.4	23.9	21.6	23.6	19.6					
18		Michoacán	Quesería	25.8	26.7	25.7	25.7	25.6	25.5	25.6	25.8	23.6	25.6	25.6	25.6	25.4	23.6	24.6	25.9	24.9	24.5	24.7	25.0	25.0	25.1	25.9	25.3	25.3	25.5	25.5	23.7	25.5	21.5	23.6	21.3				
19		Michoacán	Lázaro Cárdenas	22.1	22.5	22.1	22.2	22.9	23.0	22.6	21.9	21.1	21.4	22.6	21.7	21.9	22.6	21.7	21.9	21.1	21.7	21.9	21.6	22.3	23.0	23.8	22.2	22.8	22.5	24.5	23.7	22.1	24.7	20.5					
20		Michoacán	Pedernales	21.8	23.6	21.8	22.2	22.7	23.5	23.3	22.0	21.7	22.7	23.6	22.4	22.6	23.3	21.8	21.0	22.9	22.2	22.6	23.2	23.1	21.6	22.8	21.6	20.0	24.7	22.6	24.7	21.0	24.7	20.5					
21		Michoacán	Santa Clara	20.9	20.8	21.2	21.8	21.3	20.0	19.9	20.0	20.2	20.1	20.3	20.9	21.0	21.4	20.2	19.2	20.5	21.5	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	20.9	23.7	19.2				
22	Centro	Morelos	Central Casasano	26.1	21.9	22.3	21.8	21.6	21.8	21.7	23.1	23.3	22.0	22.2	22.4	22.0	22.2	22.5	22.5	22.5	22.9	21.7	22.1	26.0	22.5	23.3	23.3	22.4	22.8	21.8	20.7	21.2	22.9	26.1	20.7				
23		Morelos	Emiliano Zapata	25.6	26.1	26.5	26.8	26.2	26.2	25.6	25.6	25.0	26.0	25.6	25.6	25.8	26.0	25.6	25.7	27.4	26.7	27.4	26.0	26.7	25.5	27.4	25.0	25.5	25.5	26.0	27.5	25.5	25.5	25.0					
24		Puebla	Atencingo	27.1	26.3	25.8	26.7	26.7	26.4	25.3	24.9	25.8	25.4	25.3	25.3	25.8	25.4	25.3	25.7	26.4	26.6	24.7	26.7	26.2	23.9	25.3	25.5	25.5	25.3	25.7	22.6	22.6	22.6	22.6					
25		Puebla	Calipam	20.7	21.8	21.4	19.2	20.0	20.0	18.6	17.7	18.7	18.0	17.8	17.2	19.6	19.8	20.1	19.4	18.8	20.1	20.9	21.4	20.0	21.7	17.5	20.0	21.9	21.3	20.1	24.6	19.9	24.6	17.2					
26		Puebla	El Carmen	21.6	22.1	21.5	22.2	23.0	21.3	21.5	19.7	20.7	21.4	20.4	20.3	20.7	21.3	21.2	21.9	20.6	21.8	20.0	21.6	22.1	22.1	21.5	22.4	23.4	22.5	24.5	21.6	24.5	19.5						
27	Papaloapan - Golfo	Oaxaca	Adolfo López Mateos	28.8	28.8	28.5	29.0	29.1	28.7	27.5	25.0	26.3	25.5	24.2	24.9	25.9	26.3	25.6	26.6	26.8	27.7	27.9	28.2	28.7	27.3	25.3	24.0	26.3	27.4	28.1	28.5	28.3	27.1	29.1	24.0				
28		Oaxaca	CIASA (Cuatotlapam)	27.5	28.6	27.0	27.2	27.3	25.8	25.3	26.1	26.3	25.7	25.8	25.2	26.1	26.2	28.3	25.0	28.0	28.2	28.8	29.4	30.8	29.0	28.7	26.7	27.6	28.2	27.0	28.6	25.3	28.6	25.3					
29		Oaxaca	El Modelo	28.5	28.4	28.6	28.7	29.4	28.5	27.9	26.0	25.7	25.6	25.2	26.1	26.2	28.3	25.0	28.0	28.2	28.8	28.8	29.4	30.8	29.0	28.7	26.7	27.6	28.7	28.8	29.3	27.9	30.8	25.0					
30		Oaxaca	La Gloria	28.3	27.9	28.0	28.3	29.0	28.3	2																													



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Temperatura mínima promedio mensual por ingenio azucarero y región cañera






Imagen de referencia: Temperatura mínima promedio mensual. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional.
Fuente: SMN-CONAGUA. Datos preliminares del SIH.



No.	Ingenio Azucarero	Región Cañera	Entidad Cañera	Temperatura en °C
1	Calipam	Centro	Puebla	13.1
2	Santa Clara	Pacífico	Michoacán	13.1
3	Mahuixtán	Papaloapan - Golfo	Veracruz	15.4
4	Central Casasano	Centro	Morelos	15.8
5	Tamazula	Pacífico	Jalisco	16.3
6	El Carmen	Centro	Veracruz	16.7
7	Lázaro Cárdenas	Pacífico	Michoacán	16.9
8	Tala	Pacífico	Jalisco	16.9
9	Bellavista	Pacífico	Jalisco	17.0
10	San Francisco Ameca	Pacífico	Jalisco	17.4

Graficas y tabla: Temperatura mínima promedio mensual vs la climatología. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional.

Elaboró: CONADESUCA. Fuente: Resúmenes Mensuales de Temperaturas y Lluvia. SMN-CONAGUA. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias>



AGOSTO
La temperatura mínima promedio mensual a nivel nacional en las zonas cañeras fue de:
20.4 °C
0.7 °C por arriba de la climatología que es de **19.7 °C**



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Temperatura mínima diaria por ingenio azucarero

No.	Región Cañera	Entidad Cañera	Nombre del Ingenio	AGOSTO - 2020																																	Prom. temp. mensual	Máx. temp. mensual	Mín. temp. mensual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	Noroeste	Sinaloa	Eldorado	24.5	23.8	24.0	26.1	24.1	24.5	25.0	25.9	27.0	26.1	25.0	24.9	25.0	24.5	25.4	26.2	25.4	25.0	24.1	25.7	24.4	24.5	26.0	26.4	25.0	26.0	27.4	26.0	23.0	25.5	24.0	25.2	27.4	23.0		
2			El Molino	19.9	20.6	19.6	21.2	20.5	21.7	21.9	22.0	22.2	20.9	21.3	20.0	19.0	21.0	21.5	19.9	19.1	19.5	20.8	23.0	21.8	19.6	19.3	20.2	20.5	21.4	20.7	21.0	19.3	19.6	20.0	20.6	23.0	19.0		
3			Puga	20.6	21.3	20.6	21.7	21.2	22.2	22.4	22.7	22.8	21.6	22.0	21.9	19.7	21.5	22.1	20.8	20.1	20.2	21.3	23.2	22.3	20.9	20.2	20.9	21.1	21.9	21.5	21.8	20.3	20.5	20.7	21.3	23.2	19.7		
4	Noreste	Tamaulipas	Aarón Sáenz Garza	23.2	22.1	22.4	22.8	22.2	22.6	23.3	23.3	22.2	21.9	21.5	22.6	23.2	23.3	23.5	22.0	22.1	22.3	22.5	23.0	23.8	21.1	20.8	21.0	21.9	22.7	23.8	24.3	24.2	24.4	22.6	24.4	20.8			
5			El Mante	24.5	23.1	23.2	24.9	24.6	25.1	23.9	23.9	22.5	22.4	23.6	23.6	24.4	24.5	24.3	24.5	23.2	23.2	23.7	24.2	24.0	25.2	25.3	23.0	22.3	22.3	22.9	23.6	25.8	24.0	28.0	24.7	25.7	23.9	22.2	
6		Veracruz	El Higo	24.9	24.0	23.0	23.8	23.6	24.1	23.2	23.2	22.8	23.2	23.6	24.5	23.8	23.9	23.6	24.2	22.2	24.2	23.8	23.7	23.5	23.9	24.0	24.0	22.7	22.7	22.9	23.6	25.8	24.0	28.0	24.7	25.7	23.9	20.0	
7			Pánuco	23.3	22.5	22.4	22.2	23.3	23.6	23.3	22.4	22.0	20.0	21.3	22.3	20.9	21.3	22.0	22.5	21.8	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	21.6	21.6	21.7	22.0	23.2	23.5	23.9	23.9	23.9	23.9	20.0			
8		San Luis Potosí	Alianza Popular	23.0	22.7	22.1	22.3	23.3	23.1	23.9	23.4	21.5	21.4	22.3	23.3	23.1	22.1	22.3	22.3	22.1	22.0	22.1	22.3	21.9	21.6	21.7	22.0	23.2	23.5	23.9	23.9	23.9	23.9	20.0					
9			Plan de Ayala	23.3	23.6	22.6	24.0	23.9	24.2	24.1	23.4	22.2	22.9	23.5	22.7	22.2	23.1	23.6	22.1	23.5	23.4	23.9	25.0	22.9	23.6	23.4	23.8	24.5	24.5	24.2	24.7	24.8	23.5	25.0	22.1				
10			Plan de San Luis	23.3	22.9	22.5	22.8	23.0	23.1	24.1	23.4	21.7	22.0	22.5	23.4	22.9	22.8	22.9	22.7	22.4	22.4	22.8	22.9	22.6	23.1	24.1	22.7	22.4	22.9	23.6	24.0	23.0	23.9	23.8	24.0	23.0	24.1	21.7	
11			San Miguel del Naranco	20.5	20.5	20.4	20.8	21.5	21.4	22.4	21.6	21.4	21.5	23.6	21.1	20.7	20.5	21.3	19.3	22.3	18.9	20.3	22.9	19.7	21.8	23.8	22.0	22.0	19.1	20.2	21.2	21.8	22.4	21.2	21.2	23.8	18.9		
12	Pacífico	Jalisco	Bellavista	16.6	16.6	17.3	17.4	17.7	16.8	17.5	17.6	18.3	17.3	16.6	16.9	16.5	17.0	16.1	14.4	16.7	17.0	16.4	16.4	17.1	18.2	16.8	15.7	17.2	17.7	17.3	16.3	16.3	17.0	18.3	14.4				
13			José María Morelos	22.0	21.8	21.5	22.3	22.3	22.1	21.7	22.2	21.9	21.9	22.0	22.0	22.3	21.6	20.5	20.3	21.4	21.0	20.8	21.0	21.9	21.8	21.5	21.1	21.3	21.9	21.7	21.7	23.0	20.3						
14			Melchor Ocampo	16.9	17.0	19.2	17.3	20.1	19.9	19.3	17.9	17.7	19.2	19.0	20.1	19.3	17.8	16.2	16.4	16.8	16.9	19.3	17.6	17.6	17.5	17.2	19.3	19.3	20.2	18.4	20.2	16.2							
15		Colima	San Francisco Ameca	18.0	16.5	17.0	17.0	17.5	18.0	18.0	16.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.5	15.5	16.0	17.0	17.0	18.0	18.5	18.0	16.5	17.0	17.5	18.5	18.5	17.4	19.0	15.5					
16			Tala	16.8	16.7	17.2	16.8	16.2	16.6	17.0	17.1	18.4	16.9	16.3	16.3	16.8	16.5	14.2	16.7	17.0	16.1	16.4	17.1	18.4	17.3	16.5	16.0	17.5	17.9	17.6	17.4	15.4	16.9	18.4	14.2				
17			Tamazula	16.4	16.1	15.6	16.2	16.3	15.5	16.5	16.5	14.9	17.1	16.6	16.1	15.8	14.6	14.1	15.5	16.1	16.3	16.3	16.0	16.0	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	14.1				
18		Michoacán	Quesería	18.2	20.5	19.7	20.4	18.5	19.6	19.8	20.9	20.0	19.0	20.9	19.4	18.5	18.4	19.6	16.9	18.5	18.9	19.8	19.5	19.5	20.8	20.1	19.1	20.4	20.3	19.3	18.7	18.6	19.5	19.3	19.4	20.9	16.9		
19			Lázaro Cárdenas	16.9	15.3	17.5	14.5	16.7	16.1	16.2	17.0	16.6	14.8	16.7	16.7	16.5	14.8	14.1	15.4	15.6	15.5	15.5	17.6	17.2	17.5	15.4	17.3	17.3	17.8	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	14.1				
20			Pedernales	16.9	16.1	17.8	15.1	16.3	15.5	16.3	16.8	15.9	16.3	17.7	16.3	16.5	14.9	13.0	16.7	16.2	15.6	17.1	18.5	18.0	14.6	16.3	16.8	17.0	17.0	17.1	17.1	15.9	14.5	16.1	16.3	18.5	13.0		
21			Santa Clara	12.6	12.0	12.6	11.7	13.1	12.4	12.0	12.7	12.5	11.4	12.6	12.0	13.0	11.3	14.9	12.8	11.8	12.9	13.3	13.9	13.7	13.3	13.7	13.0	13.9	13.6	13.4	13.3	13.1	12.7	12.8	14.9	11.3			
22	Centro	Morelos	Central Casasano	16.1	16.0	16.0	16.4	15.8	16.4	16.5	16.9	15.1	17.0	15.1	16.0	16.0	16.0	16.0	16.9	15.9	15.1	16.9	16.0	15.9	15.1	16.0	16.8	15.2	15.1	16.0	16.9	16.1	17.0	15.1					
23			Emiliano Zapata	18.1	18.8	19.9	19.8	19.2	18.9	18.8	19.6	19.3	19.4	20.0	20.5	20.6	19.7	19.3	19.1	19.0	18.3	20.2	20.6	19.7	20.6	21.0	19.8	20.4	20.3	19.4	18.6	19.2	19.3	19.9	19.5	21.0	18.1		
24			Atencingo	17.9	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.9	18.0	17.9	17.8	18.0	17.9	18.0	17.9	17.9	16.9	17.9	16.7	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9		
25		Puebla	Calipam	13.2	13.4	12.5	12.9	13.7	12.6	13.6	14.3	13.4	13.7	13.5	13.0	12.5	12.5	12.3	13.7	13.1	12.1	11.9	12.7	13.8	13.4	13.3	14.1	14.6	15.0	13.8	15.0	13.7	15.0	13.4	15.0	11.9			
26			El Carmen	15.7	17.3	15.7	17.0	18.1	16.8	16.6	16.7	16.5	16.7	16.4	16.7	16.2	16.7	16.7	16.4	16.4	16.7	16.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	
27		Oaxaca	Adolfo López Mateos	22.7	23.8	22.7	23.7	22.9	23.1	22.6	21.9	21.9	21.6	20.4	21.1	20.7	21.4	21.9	21.3	21.6	22.0	21.9	22.0	21.9	22.0	22.2	22.2	21.3	21.8	21.7	22.3	23.0	22.5	22.8	23.4	22.1	23.8	20.4	
28			CIASA (Cuatotlapan)	21.8	23.2	22.3	22.3	22.9	22.6	21.0	21.5	21.2	21.6	21.8	21.7	21.3	21.2	21.9	22.0	21.9	22.1	23.0	22.7	22.6	23.0	22.5	22.2	21.7	21.7	22.5	23.0	21.9	22.8	23.5	22.1	23.5	21.0		
29			El Modelo	22.1	23.0	23.9	22.5																																



Validación de la perspectiva climatológica de AGOSTO para las variables:

- **Precipitación acumulada**
- **Temperatura máxima**
- **Temperatura media**
- **Temperatura mínima**

Esta sección es un complemento a la “Perspectiva Climatológica a seis meses” que se elabora los primeros días de cada mes, en dicho producto se toma en cuenta los resultados arrojados por el modelo de predicción numérica “Seasonal Climate Forecasts V2. (CFSv2)” del Centro de Predicciones Climáticas de los EUA (CPC-NOAA) y se estiman las variables precipitación y temperatura.

En el boletín climatológico se busca validar lo pronosticado para estas variables a partir de los datos observados en el mes.
Puede consultar la Perspectiva Climatológica de AGOSTO en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573714/05_Agosto_2020_PersClima_6m_CONADESUCA.pdf



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Para elaborar la perspectiva climatológica se emplea como herramienta el modelo de predicción "Seasonal Climate Forecasts V2. (CFSv2)" del Centro de Predicciones Climáticas (CPC-NOAA, por sus siglas en inglés), éste simula condiciones promedio que podrían presentarse en determinado tiempo (hasta 9 meses) en algún lugar o región; para ello, parte de una **normal climatológica**, definida como el comportamiento promedio de un rango de años de alguna variable como precipitación, temperatura, etc., e identifica anomalías mostrando qué tan por arriba o por debajo de la normal (o climatología) se va a encontrar la variable de estudio dentro del período de pronóstico.

En el mes de agosto se obtuvieron los siguientes resultados:

Precipitación



Se esperaba que agosto fuera un mes con lluvias por arriba de la climatología y eso ocurrió, a pesar de que podría mantenerse la canícula en algunas regiones cañeras, el pronóstico de otras oscilaciones como la Madden-Julian indicaba un incremento de lluvias en la segunda mitad del mes. No obstante, el modelo se quedó ligeramente por debajo de acuerdo a lo registrados nacionales para este mes.

Al comparar con el dato observado por región cañera (ver gráfico 1), el modelo quedó por arriba en la Pacífico, Centro, Córdoba-Golfo y Sureste; mientras que, en Noroeste, Noreste, y Papaloapan-Golfo quedó por debajo.

Ver gráfico 2. para consultar resultados por ingenio

Se debe tener en cuenta que la formación de sistemas meteorológicos extremos como los CT pueden modificar significativamente las condiciones medias esperadas en los pronósticos climatológicos

Validación de la perspectiva climatológica de JULIO



Graficas: Validación del pronóstico de lluvia en el mes de agosto de 2020. Modelo de pronóstico CFSv2 vs datos observados. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/> y <https://www.tropicaltidbits.com/>.



Condiciones presentadas en agosto de 2020

En el mes de agosto se obtuvieron los siguientes resultados:

Temperatura

En agosto se esperaba una tendencia donde las temperaturas (máxima, media y mínima) estuvieran por arriba de la normal climatológica.

Al comparar con el dato observado por región cañera (ver gráfico 1) y por variable los resultados fueron los siguientes:

Temperatura Máxima:

El modelo quedó por arriba en la Pacífico, Centro, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste; en la Noroeste y Noreste quedó por debajo. El mayor grado de error fue en la Noroeste con 1.3°C y el menor en la Noreste con 0.2°C.

Temperatura Media:

El modelo quedó por arriba en la Pacífico, Centro, Papaloapan-Golfo y Córdoba-Golfo, en la Noroeste, Noreste y Sureste, quedó por debajo. El mayor grado de error fue en la Centro con 0.9°C y el menor en la Noreste con 0.2°C.



Temperatura Mínima:

El modelo quedó por arriba en la Pacífico, Centro y Córdoba-Golfo; en la Noreste y Sureste quedó por debajo; y, en la Noroeste y Papaloapan-Golfo por igual a la normal. El mayor grado de error se presentó en la Sureste con 1.4°C y el menor en la Noroeste y Papaloapan-Golfo con 0.0°C.

Ver grafico 2. para consultar resultados por ingenio.

Se debe tener en cuenta que la formación de sistemas meteorológicos extremos como los CT pueden modificar significativamente las condiciones medias esperadas en los pronósticos climatológicos

Validación de la perspectiva climatológica de JULIO



Graficas: Validación del pronóstico de temperatura en el mes de agosto de 2020. Modelo de pronóstico CFSv2 vs datos observados. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/> y <https://www.tropicaltidbits.com/>



Comentarios finales



Agosto se encuentra dentro del periodo climatológico cálido-húmedo (mayo a octubre) y es parte de los meses de la temporada de lluvias.



Meteorológicamente los sistemas que dominaron fueron: el desarrollo de canales de baja presión y líneas de vaguada, el ingreso constante de aire húmedo de los litorales mexicanos hacia zonas cañeras, efectos indirectos del Huracán Genevieve Cat. 4, Tormenta Tropical Hernán y Huracán Marco Cat. 1, el paso de 11 ondas tropicales, un temporal de lluvias, el desplazamiento de la vaguada monzónica en el Pacífico Central y Sur mexicano y un sistema de alta presión en altura ([ver diapositiva 6](#)).



En las regiones cañeras Noroeste y Pacífico se mantienen lluvias asociadas al **Monzón de Norteamérica**.



La temporada ciclónica en el Pacífico Nororiental inició oficialmente el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio; sin embargo, este año se adelantó la temporada en ambos litorales y se espera que sea un año más activo debido a la ausencia del ENOS en fase “El Niño”. Al mes de agosto se han presentado 14 sistemas ciclónicos en el Pacífico Nororiental y 14 en el Atlántico Norte; de los cuales en este mes, el Huracán Genevieve Cat. 4 y la Tormenta Tropical Hernán incidieron de manera indirecta en las regiones cañeras Pacífico y Noroeste; mientras que, el Huracán Marco Cat. 1 también incidió de manera indirecta en la región cañera Sureste ([ver diapositiva 7 y 8](#)).



El **Monitor de sequía en México al 31 de agosto**, indica que 68 municipios se encontraron dentro de una categoría de sequía (D1 - D2 - D3 - D4), 114 como anormalmente secos (D0) y 85 sin presencia de sequía. En comparación con el reporte del 15 de agosto, incrementó ligeramente la cantidad de municipios con presencia de sequía en las regiones cañeras Noroeste, Noreste, Pacífico y Papaloapan-Golfo ([ver diapositiva 9 y 10](#)).



Las regiones cañeras Pacífico, Centro, Córdoba-Golfo y Sureste presentaron una **precipitación acumulada mensual** por arriba de la climatología; mientras que, la Noroeste, Noreste y Papaloapan-Golfo estuvo por debajo de la normal ([ver diapositiva 13 y 14](#)).



Las regiones cañeras que presentaron una **temperatura máxima promedio mensual** por arriba de la climatología fueron Noroeste, Noreste y Pacífico; en cambio, Centro, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste fue por debajo de la normal. En cuanto a la **temperatura media mensual y la temperatura mínima promedio mensual** todas las regiones cañeras estuvieron por arriba de la climatología, excepto la región Centro que estuvo por debajo en la temperatura media ([ver diapositiva de la 15 a la 20](#)).



La importancia de la lluvia en la caña de azúcar

La importancia de la lluvia en la caña de azúcar

- Uno de los requerimientos ambientales para el cultivo de la caña de azúcar es la disponibilidad de agua, el consumo de ésta varía en cada fase de crecimiento; sin embargo, los valores máximos se necesitan en la fase denominada “período de gran crecimiento”.
- Abundante lluvia puede afectar al cultivo causando inundaciones.

Posibles afectaciones de las inundaciones a la caña de azúcar

- En temporada de zafra afecta al corte, retrasando la producción en el ingenio.
- Las superficies afectadas pueden presentar menores rendimientos de campo.



Umbrales de temperatura para la caña de azúcar

Durante las fases fenológicas los requerimientos óptimos son los siguientes:

- Germinación y emergencia, 24 - 37 °C.
- Amacollamiento, 26 - 30 °C.
- Rápido crecimiento, menor a 30 °C.
- Maduración, 18 - 35 °C (noches frescas y días calurosos).

Umbrales por arriba o por debajo pueden afectar el crecimiento de la planta y/o en la producción de sacarosa.

La caña de azúcar puede soportar temperaturas máximas de 45°C y mínimas de 12°C; sin embargo, llegar a este umbral retrasa su crecimiento vegetativo.

El rango óptimo de la temperatura media anual oscila entre los 26 - 30 °C.

La presencia de heladas de acuerdo a su duración e intensidad puede afectar a la caña, dichas afectaciones pueden ir desde el amarillamiento del follaje hasta la reducción del rendimiento en fábrica.

Fuentes:

- Aguilar, N. (S.F.). Ficha Técnica del cultivo de Caña de Azúcar. SIVICAÑA. Consultado el 21 de mayo de 2018. Disponible en: web: http://nutriciondebovinos.com.ar/MD_upload/nutriciondebovinos_com_ar/Archivos/File/CA%C3%91A_DE_AZ%C3%9ACAR,_FICHA_T%C3%89CNICA.pdf
- CONAGUA (Sin fecha). Glosario Técnico. Servicio Meteorológico Nacional. Consultado el 30 de mayo de 2018. Disponible en: <https://smn.conagua.gob.mx/es/smn/glosario>
- CONAGUA-PRONACOSE (2014). Programa Nacional Contra la Sequía. Documento Rector. Consultado el 30 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documents/Po%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20Nacional%20para%20la%20Sequ%C3%A9ncia%20Documento%20Rector.pdf>
- Ochoa, M., Reyes M., Manríquez J., (2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México (FIRA). Consultado el 24 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abreArc=3681>
- Romero, E., Digonzelli, P., Scandalaris, J. (2009). Manual del cañero. Argentina: Las Talitas: Estación experimental agroindustrial Obispo Colombrés.



Condiciones presentadas en agosto de 2020

Información adicional para interpretar el pronóstico climatológico: GLOSARIO

Anomalía. Diferencia entre el valor pronosticado de una variable meteorológica (p. ej. precipitación) y el valor medio o climatología.

Ciclón Tropical (CT). Es un sistema de baja presión que se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una circulación, en superficie, organizada y definida en el sentido contrario a las manecillas del reloj en el Hemisferio Norte. Los CT se clasifican en: Depresiones Tropicales (DT), Tormentas Tropicales (TT) y Huracanes. Se les asignan nombres a partir de la categoría TT para identificarlos, ya que al mismo tiempo se pueden presentar varios CT. Los nombres son asignados por miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los pronósticos se elaboran con base en la climatología de los CT, las variaciones climáticas como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), la temperatura superficial del mar (TSM), etc.; y así obtienen años análogos (años de comportamiento similar).

Giro Centroamericano. Es un sistema de baja presión con circulación de tipo ciclónica en niveles bajos de la atmósfera, genera abundante humedad y puede producir lluvias localmente de fuertes a intensas.

Monzón de Norteamérica. También conocido como el monzón mexicano, es el cambio estacional de vientos cálidos y húmedos que generan lluvias significativas en el noroeste del territorio nacional, inicia anualmente entre los meses de junio- julio, y puede extenderse hasta septiembre.

Normal climatológica. Es el promedio de datos de alguna variable meteorológica en un cierto período de años, sirve para comparar las observaciones recientes o para fundamentar el conjuntos de datos basados en anomalías (p. ej. la precipitación), también se usa para predecir las condiciones que muy probablemente se presentarán en un lugar.

Pronóstico estacional. Pronóstico a largo plazo de las variables precipitación y temperatura. Se realizan de acuerdo con las condiciones existentes y las proyecciones de modelos numéricos de tipo estadísticos y dinámicos, este pronóstico es desarrollado por el SMN. Para la temporada de verano (mayo - octubre) se proporciona la perspectiva de precipitación y temperaturas máximas; mientras que, para la temporada de invierno (noviembre - abril) se proporciona la perspectiva esperada de precipitación y temperaturas mínimas.

Sequía. Es la insuficiencia de volumen usual en las fuentes de abastecimiento, derivado de una menor cantidad de lluvia, su retraso o a una combinación de ambas causas naturales. Tiene la característica de ser impredecible en el tiempo en el que inicia, en su duración, en la intensidad o severidad y en la extensión territorial sobre la que ocurre. Debe distinguirse y separarse claramente de una insuficiencia debida a causas de manejo humano, la cual se origina cuando la demanda supera a la oferta de las fuentes de abastecimiento, provocando en éstas disminución de su volumen.

Sistemas frontal o Frente Frío (FF). Es el límite entre dos masas de aire con diferente temperatura y/o contenido de vapor de agua. Durante este evento se puede presentar descenso de temperatura, con posible desarrollo de heladas, vientos intensos, fuerte oleaje, y de presentarse la suficiente humedad en la atmósfera genera nubosidad y la posibilidad de desarrollo de lloviznas a tormentas eléctricas.



Publicaciones de productos meteorológicos y climatológicos

Producto	L	M	M	J	V
Pronóstico de lluvias a 10 días	✓		✓		✓
Pronóstico de temperaturas a 10 días		✓		✓	
Perspectiva climatológica a 6 meses	Primeros días de cada mes				
Boletín climatológico mensual					

Estos productos se pueden consultar en la página del CONADESUCA en la sección principal de Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero <https://www.gob.mx/conadesuca/> o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-canero>



Geoportal del CONADESUCA

https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/GEO_PORTAL_CONADESUCA/Informacion_Meteorologica.html

En el Geoportal puedes consultar estadísticas climáticas por ingenio de los índices e indicadores agroclimáticos como:

- Precipitación
- Temperatura (mínima, media y máxima)
- Índice de humedad
- Balance hídrico
- Diagrama bioclimático

Próximas publicaciones meteorológicas y climatológicas de interés

- Variabilidad climática y oscilaciones climáticas
- Glosario meteorológico - climatológico



SIE - CAÑA

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRÁTÉGICA
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

El CONADESUCA elabora productos como son pronósticos y boletines meteorológicos orientados al sector agroindustrial de la caña de azúcar para facilitar la toma de decisiones ante un evento meteorológico adverso; además, permite contar con una perspectiva de las condiciones que se puedan presentar a corto, mediano y largo plazo.

Por lo anterior, se consideran para su elaboración información meteorológica y climatológica de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a fin de mantener en vigilancia la evolución y trayectoria de fenómenos meteorológicos que puedan afectar las zonas cañeras debido a su avance. Además, se toma en cuenta información que genera el CONADESUCA a partir del Sistema de Información Estratégica de la Caña de Azúcar (**SIE-Caña**), el cual es una herramienta que permite visualizar, procesar y actualizar información geoespacial relacionada con la producción nacional de la caña de azúcar para obtener datos acerca del cultivo y con ello, generar información focalizada a los ingenios azucareros del país

Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Teléfono: 55-3871-1900, extensión 57011, www.gob.mx/conadesuca



Facebook: [@Conadesuca](#)



Twitter: [@CONADESUCAmx](#)



Instagram: [CONADESUCA](#)