

Virus rugoso del tomate


Definición:

Es un tobamovirus que ataca los cultivos hortícolas y ornamentales en todo el mundo. Es capaz de permanecer infectivo en las semillas, restos de plantas y suelo contaminado por años.



Diseminación

- Contacto directo de una planta con otra
- Prácticas comunes de cultivos
- Agua circulante (cultivos de hidroponía)
- Máquinas de trabajo (como el tractor en campo abierto), ropa, herramientas, estructura de invernadero



Síntomas:

- Moteado ligero a severo de las hojas
- Los frutos presentan síntomas marcados de rugosidad, coloración marrón y manchas de color amarillo.

Tratamiento:

No existe tratamiento

Medidas preventivas:

- Cuidar los procesos para evitar la contaminación directa
- Usar semillas certificadas libres de virus
- Uso de guantes de nitrilo o látex al realizar las labores de cultivo
- Desinfectar la herramienta de trabajo y las manos con una solución de cloro
- Contar con una estación de lavado y desinfección de manos y herramientas
- Mantener el área libre de malezas
- Eliminar residuos de podas



En caso de detectar una planta con los síntomas se sugiere:

- Arrancarla completamente
- Evitar el contacto con las otras plantas
- Depositarla en una bolsa de plástico
- Llevarla a un lugar destinado para la quema
- Restringir el ingreso de personal a áreas con detecciones positivas



Notifica

01 800 987 98 79

alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

Comité Estatal o Junta Local de Sanidad Vegetal del Estado

osiap.org.mx



GOBIERNO DE
MÉXICO

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



gob.mx/senasica