

# SALUD

Secretaría de Salud



## INFORME SEMANAL DE MORBILIDAD MATERNA SEVERA



DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

Semana Epidemiológica 3 de 2020



### Información Relevante Semana Epidemiológica 3

- La razón de morbilidad materna severa calculada es de 2.9 por cada 100 nacimientos estimados, con un total de 854 casos.
- Las principales afecciones de morbilidad materna severa son:
  - Enfermedad Hipertensiva con el 68.7%
  - Hemorragia Obstétrica con el 20.7%
- Las entidades con razones de morbilidad materna más altas son: Veracruz con 8.5, Quintana Roo con 6.7 y Yucatán con 5.5


# Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Severa, Semana Epidemiológica 3

El sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa es un sistema centinela que cuenta con 300 unidades en 32 entidades federativas.

**Tabla 1. Número de Unidades Centinelas SIVEMMS, por Entidad Federativa, 2020**

Entidad	Unidades Centinelas
AGUASCALIENTES	4
BAJA CALIFORNIA	2
BAJA CALIFORNIA SUR	1
CAMPECHE	5
CHIAPAS	15
CHIHUAHUA	16
CIUDAD DE MÉXICO	4
COAHUILA	7
COLIMA	1
DURANGO	4
GUANAJUATO	16
GUERRERO	19
HIDALGO	9
JALISCO	2
MEXICO	4
MICHOACAN	9
MORELOS	2
NAYARIT	2
NUEVO LEON	8
OAXACA	18
PUEBLA	20
QUERETARO	3
QUINTANA ROO	6
SAN LUIS POTOSI	7
SINALOA	32
SONORA	2
TABASCO	10
TAMAULIPAS	5
TLAXCALA	5
VERACRUZ	39
YUCATAN	6
ZACATECAS	7
Total	300

**Figura 1. Distribución de Unidades Centinelas SIVEMMS, por Entidad Federativa, 2020**



**Tabla 2. Distribución de Unidades Centinelas SIVEMMS por Institución, 2020.**

Institución	Unidades	Porcentaje
SSA	187	62.3
IMSS	13	4.3
IMSS Bienestar	77	25.7
ISSSTE	13	4.3
Total	300	100

La razón de Morbilidad Materna Severa (RMMS) se obtiene del cociente de los casos de Morbilidad Materna Severa entre los nacidos vivos en el mismo periodo de tiempo.

Cabe señalar que la MMS se define como una complicación severa durante el embarazo, parto o puerperio y que requiere una intervención médica urgente, encaminada a prevenir la muerte materna.

La Tabla 1 y Figura 1 nos muestra el número de unidades centinela por entidad federativa, mientras que la tabla 2 por la institución notificante.

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa (SIVEMMS), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

# Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Severa, Semana Epidemiológica 3

Tabla 3. Razón de Morbilidad Materna Severa, México, 2020

Indicador	Valor
Casos de MMS	854
Razón 1/(x100 nacidos vivos)	2.9
Defunciones	14
Letalidad	1.6

A la semana epidemiológica 3 del 2020, se registraron un total de 854 casos de morbilidad materna severa, lo que equivale a una razón de morbilidad materna de 2.9 por cada 100 recién nacidos vivos estimados en las unidades monitoras.

<sup>1</sup>/El denominador utilizado para el cálculo de la Razón de Morbilidad Materna Severa, tiene como fuente la estimación de la tendencia de nacimientos para 2019 obtenida a partir de los nacimientos registrados durante el periodo 2016-2018 por unidad hospitalaria registrados en SINAC.

Tabla 4. Casos de Morbilidad Materna Severa por causa México, 2020

Afecciones	Total	%
ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO	587	68.7%
HEMORRAGIA OBSTETRICA	177	20.7%
ABORTO	11	1.3%
SEPSIS Y OTRAS INFECCIONES	7	0.8%
OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE DEL EMB/PART	28	3.3%
CAUSA OBSTETRICA INDIRECTA INFECCIOSA	7	0.8%
CAUSA OBSTETRICA INDIRECTA NO INFECCIOSA	18	2.1%
DIABETES MELLITUS	7	0.8%
SIN CLASIFICAR	12	1.4%
TOTAL	854	100.0%

La razón de morbilidad materna severa (RMMS) calculada es de 2.9 casos por cada 100 nacidos vivos. Así mismo se ha registrado una letalidad del 1.6% entre las mujeres con morbilidad materna severa. (Tabla 3)

La Enfermedad Hipertensiva en el embarazo ocupa el primer lugar de causa de Morbilidad Materna Severa en el país con un total del 68.7% (Tabla 4)

Fuentes:


1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa (SIVEMMS), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

# Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Severa, Semana Epidemiológica 3


De los 854 casos registrados las entidades federativas con mayor RMMS son: Veracruz 8.5, Quintana Roo 6.7 y Yucatán 5.5 x 100Nv. (Gráfico 1)

**Gráfico 1. Razón de Morbilidad Materna Severa por Entidad de Residencia. México 2020**



De los 854 casos registrados el 1.6% fallecieron. Los estados que registraron mayor letalidad son Campeche 25.0%, Tlaxcala 9.1% y Nayarit 6.7% (Gráfico 2)

**Gráfico 2. Letalidad de Morbilidad Materna Severa por Entidad de Residencia. México 2020**




Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa (SIVEMMS), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

# Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Severa, Semana Epidemiológica 3


**Gráfico 3. Casos y Razón de Morbilidad Materna Severa por Grupo de Edad, México 2020**




El grupo de edad con mayor número de casos es el de 20 a 24 años con (218); no obstante la RMMS es mayor en las mujeres de 40 a 44 años (7.0) x 100 nacidos vivos. (Gráfico 3)

De las cuatro instituciones con unidades centinelas, el 84.0% de los casos ha sido reportado por la Secretaría de Salud. (Gráfico 4)

**Gráfico 4. Institución Notificante de casos de morbilidad materna severa, México 2020**



**Gráfico 5. Motivo de Ingreso Hospitalario por morbilidad materna severa México 2020**



Solo el 6.7% ingresa muy grave y el 27.8% graves. (Gráfico 5)


Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa (SIVEMMS), 2020


2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

# Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Severa, Semana Epidemiológica 3


**Gráfico 6. Criterios de Ingreso para Morbilidad Materna Severa, México 2020.**



**Gráfico 7. Motivo de Egreso em casos de Morbilidad Materna Severa, México 2020.**



**Gráfico 8. Recién Nacidos hijos de madres con Morbilidad Materna Severa, México 2020.**



Los criterios de ingreso de Morbilidad Materna Severa se tiene que el 84.4% fue por una enfermedad específica, el 26.3% por falla orgánica y el 76.7% por manejo específico (Gráfico 6)

El 83.7% de las mujeres ingresadas por morbilidad materna severa egresan por mejoría (Gráfico 7)

El 3.3% de los Recién nacidos de madres con morbilidad materna severa mueren (Gráfico 8)

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa (SIVEMMS), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

# Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Severa, Semana Epidemiológica 3

Tabla 5. Indicadores de Morbilidad Materna Severa por entidad federativa, México, 2020

Entidad	Casos	% Cesáreas	% Cirugía adicional	% Transfusión unidades $\geq 3$	% Control prenatal $>4$ consultas	Letalidad
AGS	18	61.1	16.7	11.1	55.6	0.0
BC	3	100.0	0.0	0.0	66.7	0
BCS	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
CAMP	4	50.0	25.0	200.0	75.0	25.0
CHIS	35	57.1	8.6	17.1	51.4	0.0
CHIH	70	60.0	4.3	7.1	57.1	2.9
COAH	6	50.0	16.7	16.7	66.7	0.0
COL	3	66.7	33.3	33.3	33.3	0.0
CDMX	4	100.0	0.0	0.0	75.0	0.0
DGO	4	25.0	0.0	0.0	50.0	0.0
GTO	85	84.7	11.8	82.4	75.3	2.4
GRO	65	64.6	18.5	15.4	58.5	1.5
HGO	34	70.6	20.6	26.5	67.6	0.0
JAL	12	58.3	8.3	0.0	75.0	0.0
MEX	19	57.9	21.1	10.5	57.9	0.0
MICH	11	72.7	27.3	90.9	81.8	0.0
MOR	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NAY	15	53.3	13.3	173.3	73.3	6.7
NL	34	61.8	0.0	0.0	64.7	0.0
OAX	61	65.6	18.0	155.7	49.2	3.3
PUE	29	62.1	0.0	0.0	48.3	0.0
QUER	39	64.1	10.3	56.4	61.5	2.6
QRRO	29	79.3	6.9	13.8	75.9	0.0
SLP	20	55.0	10.0	0.0	85.0	0.0
SIN	52	69.2	13.5	44.2	65.4	0.0
SON	6	83.3	0.0	0.0	50.0	0.0
TAB	30	53.3	3.3	13.3	33.3	0.0
TAMP	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TLAX	11	54.5	36.4	72.7	72.7	9.1
VER	94	69.1	21.3	39.4	63.8	3.2
YUC	32	46.9	0.0	3.1	65.6	0.0
ZAC	22	68.2	13.6	0.0	72.7	0.0
<b>NACIONAL</b>	<b>854</b>	<b>65.6</b>	<b>12.4</b>	<b>41.1</b>	<b>62.4</b>	<b>1.6</b>

De los 854 casos registrados a nivel nacional:

- El 65.6% de los casos de MMS se ha resuelto por cesárea.
- El 62.4% de los casos llevó control prenatal con más de 4 consultas.

(Tabla 5)

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa (SIVEMMS), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

# Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Severa, Semana Epidemiológica 3

**Los Estados con mejor índice de calidad en atención prenatal son:**

Baja California Sur, Tamaulipas, Baja California, Morelos y Michoacán,

**Con peor índice de atención prenatal son:** Tabasco, Yucatán,

Colima, Quintana Roo y Veracruz.  
(Figura 2)

**Los Estados con mejor índice de gravedad obstétrica son:** Baja California Sur, Morelos, Durango,

Yucatán y Nuevo León,

**Con peor índice de gravedad obstétrica son:** Guanajuato, Oaxaca,

Nayarit, Tlaxcala y Campeche.  
(Figura 3)

**Figura 2. Índice de calidad en atención prenatal**

Entidad	Índice	Entidad	Índice
BCS	0.00	TAB	4.46
TAMP	0.51	YUC	4.91
BC	0.64	COL	4.95
MOR	1.40	QRRO	5.15
MICH	1.63	VER	6.82

<sup>2</sup>El índice de **calidad en atención prenatal** se construye mediante promedios ponderados de la razón de MMS y el % de cumplimiento de al menos 4 consultas de control prenatal.

**Un índice menor refleja mejores resultados en la atención prenatal de las mujeres embarazadas.**

**Figura 3. Índice de gravedad obstétrica**

Entidad	Índice	Entidad	Índice
BCS	0.00	GTO	4.74
MOR	0.00	OAX	6.89
DGO	0.32	NAY	8.50
YUC	0.66	TLAX	9.25
NL	0.79	CAMP	19.13

<sup>2</sup>El índice de **gravedad obstétrica** se construye mediante promedios ponderados de los indicadores internacionales de para la atención de eventos obstétricos (% de cesáreas, % de mujeres con más de 3 transfusiones, % de mujeres que requieren una cirugía adicional) y la letalidad.

**Un índice menor refleja mejores resultados en la atención hospitalaria del evento de gravedad obstétrica.**

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa (SIVEMMS), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

Dirección General de Epidemiología  
Dr. Jose Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles  
(DVEENT)

Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Sub Director DVEENT

Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno

Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No  
Transmisibles

Dr. Dario Alaniz Cuevas

Responsables del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna  
Severa

Dra. Margarita Zarate Herreman

Dr. Manuel Camargo Castillo

Elaboró

Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No  
Transmisibles

Dr. Dario Alaniz Cuevas