

EQUIVON PLUS

Registro: B-0653-051.

Vacuna emulsionada elaborada con virus inactivado de Encefalitis del Oeste del Nilo cepa TM-171-03. Para la prevención de la Encefalitis del Virus del Oeste del Nilo.

FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión.

ESPECIES: Equinos (Caballos, burros y mulas).



NOMBRE GENÉRICO:

Vacuna de virus inactivado de Encefalitis del Oeste del Nilo cepa TM-171-03.

COMPOSICIÓN CUALI-CUANTITATIVA.

Cada dosis de 2 ml contiene:

COMPUESTO:	CANTIDAD:
Fracción liofilizada	
Fluido viral Equivon Plus.....	Mínimo 10 ^{5.0} DIIC 50%/Dosis
Cepa TM-171-03	
Excipiente.....	c.b.p.

PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS.

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la Encefalitis del Oeste del Nilo en equinos susceptibles.

INDICACIONES DE USO.

Para la prevención de la Encefalitis del Virus del Oeste del Nilo, en animales clínicamente sanos. Vacunar equinos mayores de 6 meses de edad, aplicando dos dosis con intervalo de 21 días antes de la época de lluvias. Se recomienda la revacunación anual o cada 6 meses de acuerdo al riesgo presente por zona geográfica o ante la presencia de un brote de la enfermedad.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES.

No vacunar en unidades de producción o zonas declaradas como libres por la SADER, debido a que puede ocasionar la aparición de falsos positivos.

EFFECTOS INDESEABLES.

No se han mostrado efectos indeseables en la aplicación de la vacuna, se desconocen los efectos secundarios en hembras gestantes.

PRECAUCIONES DE USO.

Agitar el producto antes de su aplicación. No vacunar animales enfermos, de pobre condición corporal o parasitados. Durante la aplicación, evite la exposición del producto a la luz solar y agite la vacuna antes de cada aplicación. Utilizar una jeringa estéril por cada animal vacunado. No utilizar jeringas ni agujas que hayan sido esterilizadas con alcohol, formalina u otros productos químicos con efectos similares.

INTERACCIÓN CON OTRAS VACUNAS Y MEDICAMENTOS.

No se tiene información de los efectos que la vacuna pueda causar al ser administrada con otros medicamentos. La administración de cualquier producto deberá ser bajo la supervisión del Médico Veterinario para cada caso en particular.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Administrar 2 ml por vía intramuscular en la tabla del cuello por cada animal.

SOBREDOSIFICACIÓN.

No se detectan efectos adversos al aplicar más de una dosis por animal, sin embargo, no es recomendable la sobredosificación.

PRECAUCIONES AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN.

Vacunar animales clínicamente sanos, con el sistema inmune no comprometido, preferentemente llevar a cabo la desparasitación antes de aplicar la vacuna. Evitar la exposición directa del producto a la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO.

Los animales vacunados solo podrán sacrificarse 15 días posteriores a la fecha de vacunación.

ADVERTENCIAS.

El manejo y aplicación de este producto deberá ser realizado por un Médico Veterinario.

PRINCIPALES INCOMPATIBILIDADES.

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún otro producto farmacéutico.

PERIODO DE VIGENCIA (CADUCIDAD).

24 meses.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Conservar el producto en refrigeración entre 4° a 8°C. Evitar la congelación de la vacuna. No exponer directamente el producto a la luz solar. No administrar el producto si las condiciones de almacenamiento no han sido las indicadas.

PRESENTACIÓN.

Frasco ampula de polietileno de alta densidad. Presentación de 10 dosis.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO.

La eliminación del envase y el contenido no utilizado deberá realizarse por medio de incineración.