

SALUD

Secretaría de Salud



INFORME SEMANAL DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMADAMENTE GRAVE



Semana Epidemiológica 53 de 2020



Información Relevante Semana Epidemiológica 53

- La razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave calculada es de 2.6 por cada 100 nacimientos estimados, con un total de 13,685 casos.
- Las principales afecciones de Morbilidad Materna Extremadamente Grave son:
 - Enfermedad Hipertensiva con el 55.6%
 - Hemorragia Obstétrica con el 12.6%
- Las entidades con razones de morbilidad materna más altas son: Yucatán con 9.3, Veracruz con 7.3 y Morelos con 5.5

Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Extremadamente Grave, Semana Epidemiológica 53

La razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (RMMEG) se obtiene del cociente de los casos de Morbilidad Materna Severa entre los nacidos vivos en el mismo período de tiempo.

Cabe señalar que la MMEG se define como una complicación extremadamente grave durante el embarazo, parto o puerperio y que requiere una intervención médica urgente, encaminada a prevenir la muerte materna.

El sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave es un sistema centinela que cuenta con 300 unidades en 32 entidades federativas.

Tabla 1. Número de Unidades Centinelas SIVEMMEG, por Entidad Federativa, 2020

Entidad	Unidades Centinelas
AGUASCALIENTES	4
BAJA CALIFORNIA	2
BAJA CALIFORNIA SUR	1
CAMPECHE	5
CHIAPAS	15
CHIHUAHUA	16
CIUDAD DE MÉXICO	4
COAHUILA	7
COLIMA	1
DURANGO	4
GUANAJUATO	16
GUERRERO	19
HIDALGO	9
JALISCO	2
MEXICO	4
MICHOACAN	9
MORELOS	2
NAYARIT	2
NUEVO LEON	8
OAXACA	18
PUEBLA	20
QUERETARO	3
QUINTANA ROO	6
SAN LUIS POTOSI	7
SINALOA	32
SONORA	2
TABASCO	10
TAMAULIPAS	5
TLAXCALA	5
VERACRUZ	39
YUCATAN	6
ZACATECAS	7
Total	300

Figura 1. Distribución de Unidades Centinelas SIVEMMEG, por Entidad Federativa, 2020




Tabla 2. Distribución de Unidades Centinelas SIVEMMEG por Institución, 2020.

Institución	Unidades	Porcentaje
SSA	187	62.3
IMSS	13	4.3
IMSS Bienestar	77	25.7
ISSSTE	13	4.3
Total	300	100

La Tabla 1 y Figura 1 nos muestra el número de unidades centinela por entidad federativa, mientras que la tabla 2 por la institución notificante.

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Extremadamente Grave, Semana Epidemiológica 53

Tabla 3. Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México, 2020

Indicador	Valor
Casos de MMS	13,685
Razón 1/(x100 nacidos vivos)	2.6
Defunciones	179
Letalidad	1.3

A la semana epidemiológica 53 del 2020, se registraron un total de 13685 casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, lo que equivale a una razón de morbilidad materna de 2.6 por cada 100 recién nacidos vivos estimados en las unidades monitoras.

¹El denominador utilizado para el cálculo de la Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, tiene como fuente la estimación de la tendencia de nacimientos para 2019 obtenida a partir de los nacimientos registrados durante el periodo 2016-2018 por unidad hospitalaria registrados en SINAC.

Tabla 4. Casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por causa, México, 2020

Afecciones	Total	%
ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO	7,608	55.6%
HEMORRAGIA OBSTETRICA	1,729	12.6%
ABORTO	283	2.1%
SEPSIS Y OTRAS INFECCIONES	99	0.7%
OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE DEL EMB/PART	2,643	19.3%
CAUSA OBSTETRICA INDIRECTA INFECCIOSA	71	0.5%
CAUSA OBSTETRICA INDIRECTA NO INFECCIOSA	157	1.1%
COVID-19	199	1.5%
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	71	0.5%
DIABETES MELLITUS	71	0.5%
SIN CLASIFICAR	754	5.5%
TOTAL	13,685	100.0%

La razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (RMMEG) calculada es de 2.6 casos por cada 100 nacidos vivos. Así mismo se ha registrado una letalidad del 1.3% entre las mujeres con morbilidad materna severa. (Tabla 3)

La Enfermedad Hipertensiva en el embarazo ocupa el primer lugar de causa de Morbilidad Materna Extremadamente Grave en el país con un total del 55.6% (Tabla 4)

Fuentes:


1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Extremadamente Grave, Semana Epidemiológica 53

De los 13,685 casos registrados las entidades federativas con mayor RMMEG son: Yucatán 9.3, Veracruz 7.3 y Morelos 5.5 x 100Nv. (Gráfico 1)

Gráfico 1. Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por Entidad de Residencia. México 2020



De los 13,685 casos registrados el 1.3% fallecieron. Los estados que registraron mayor letalidad son Oaxaca 3.7%, Quintana Roo 3.6%, y Tlaxcala 3.4% (Gráfico 2)

Gráfico 2. Letalidad de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por Entidad de Residencia. México 2020




Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Extremadamente Grave, Semana Epidemiológica 53

Gráfico 3. Casos y Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por Grupo de Edad, México 2020



El grupo de edad con mayor número de casos es el de 20 a 24 años con 3,330; no obstante la RMMEG es mayor en las mujeres de 45 a 49 años (11.2) x 100 nacidos vivos. (Gráfico 3)

De las cuatro instituciones con unidades centinelas, el 83.4% de los casos ha sido reportado por la Secretaría de Salud. (Gráfico 4)

Gráfico 4. Institución Notificante de casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2020





Gráfico 5. Motivo de Ingreso Hospitalario por Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2020



Solo el 6.0% ingresa muy grave y el 27.2% graves. (Gráfico 5)

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Extremadamente Grave, Semana Epidemiológica 53

Gráfico 6. Criterios de Ingreso para Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2020.




Gráfico 7. Motivo de Egreso en casos de Morbilidad Materna Extremadamente grave, México 2020.





Gráfico 8. Recién Nacidos hijos de madres con Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2020.



Los criterios de ingreso de Morbilidad Materna Extremadamente Grave se tiene que el 85.2% fue por una enfermedad específica, el 29.0% por falla orgánica y el 78.1% por manejo específico (Gráfico 6)

El 77.4% de las mujeres ingresadas por morbilidad materna extremadamente grave egresan por mejoría (Gráfico 7)

El 3.8% de los Recién nacidos de madres con morbilidad materna extremadamente grave mueren (Gráfico 8)

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Extremadamente Grave, Semana Epidemiológica 53

Tabla 5. Indicadores de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por entidad federativa, México, 2020

Entidad	Casos	% Cesáreas	% Cirugía adicional	% Transfusión ≥ 3 unidades	% Control prenatal >4 consultas	Letalidad
AGS	169	66.9	4.7	28.4	58.0	0.0
BC	125	60.0	4.8	34.4	57.6	0.0
BCS	14	57.1	21.4	107.1	35.7	0.0
CAMP	134	61.9	11.9	63.4	53.7	3.0
CHIS	575	60.2	13.9	16.7	46.1	0.7
CHIH	1160	64.0	11.5	54.0	53.7	1.6
COAH	84	47.6	11.9	16.7	46.4	0.0
COL	20	65.0	25.0	100.0	75.0	0.0
CDMX	255	61.2	18.0	52.2	52.5	2.4
DGO	24	50.0	16.7	20.8	75.0	0.0
GTO	935	68.3	17.5	56.6	66.2	1.6
GRO	1311	57.8	11.4	24.4	58.0	1.1
HGO	673	57.9	18.1	27.0	66.0	0.7
JAL	225	66.7	9.8	9.8	69.3	0.4
MEX	203	62.6	19.7	34.5	50.7	0.5
MICH	326	70.2	13.5	62.0	73.9	1.2
MOR	250	68.8	18.0	113.2	56.0	1.6
NAY	263	66.5	13.7	39.9	54.0	1.1
NL	454	65.6	3.1	18.7	55.7	0.4
OAX	735	66.9	16.5	104.9	55.1	3.7
PUE	487	71.3	10.5	20.3	69.8	0.6
QUER	351	60.4	19.1	47.0	61.8	1.1
QRRO	365	68.5	13.2	45.2	51.2	3.6
SLP	342	49.4	9.4	43.0	74.9	0.3
SIN	671	69.2	12.7	28.5	58.4	2.1
SON	125	80.8	6.4	34.4	50.4	0.0
TAB	350	62.0	11.1	37.7	38.9	2.0
TAMP	42	71.4	21.4	123.8	35.7	0.0
TLAX	117	70.1	25.6	72.6	56.4	3.4
VER	1414	64.7	21.8	47.3	64.1	1.6
YUC	959	61.7	5.5	8.8	60.3	0.0
ZAC	527	60.7	10.6	82.2	82.4	0.4
NACIONAL	13685	63.7	13.5	43.3	59.9	1.3

De los 13,685 casos registrados a nivel nacional:

- El 63.7% de los casos de MMS se ha resuelto por cesárea.
- El 59.9% de los casos llevó control prenatal con más de 4 consultas.

(Tabla 5)

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: Morbilidad Materna Extremadamente Grave, Semana Epidemiológica 53

Los Estados con mejor índice de calidad en atención prenatal son: Baja California Sur, Durango, Tamaulipas, Baja California y Colima,

Con peor índice de atención prenatal son: Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. (Figura 2)

Los Estados con mejor índice de gravedad obstétrica son: Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California.

Con peor índice de gravedad obstétrica son: Campeche, Quintana Roo, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca. (Figura 3)

Figura 2. Índice de calidad en atención prenatal

Entidad	Índice	Entidad	Índice
BCS	0.48	GRO	4.16
DGO	1.17	NAY	4.65
TAMP	1.25	QRRO	4.92
BC	1.55	VER	5.96
COL	1.74	YUC	7.40

²/El índice de **calidad en atención prenatal** se construye mediante promedios ponderados de la razón de MMEG y el % de cumplimiento de al menos 4 consultas de control prenatal.

Un índice menor refleja mejores resultados en la atención prenatal de las mujeres embarazadas.

Figura 3. Índice de gravedad obstétrica

Entidad	Índice	Entidad	Índice
YUC	1.23	CAMP	4.36
COAH	1.57	QRRO	4.53
NL	1.58	MOR	4.87
AGS	1.60	TLAX	5.68
BC	1.63	OAX	5.84

²/El índice de **gravedad obstétrica** se construye mediante promedios ponderados de los indicadores internacionales de para la atención de eventos obstétricos (% de cesáreas, % de mujeres con más de 3 transfusiones, % de mujeres que requieren una cirugía adicional) y la letalidad.

Un índice menor refleja mejores resultados en la atención hospitalaria del evento de gravedad obstétrica.

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2020

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2018-2019

Dirección General de Epidemiología
Dr. Jose Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
(DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles
Dr. Dario Alaniz Cuevas

Responsables del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna
Extremadamente Grave
Dra. Margarita Zarate Herreman
Dr. Manuel Camargo Castillo

Elaboró
Apoyo en la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles (DVEENT)
Psic. Lucía Elizabeth Hernández Tapia