

Boletín Climatológico

006_junio_2021

Condiciones presentadas en mayo de 2021



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



CONADESUCA
COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR



[f @Conadesuca](#) [t @CONADESUCAmx](#) [i CONADESUCA](#)



El Boletín Climatológico es elaborado en apoyo al sector de la agroindustria de la caña de azúcar, en éste se reportan los principales eventos meteorológicos y climatológicos ocurridos en el mes inmediato anterior y que tuvieron incidencia en el campo cañero; se da seguimiento a las temporadas de frentes fríos y ciclones tropicales; a las condiciones que presentaron algunas oscilaciones climáticas; el estado actual del monitor de sequía en México, y; el comportamiento de las variables precipitación y temperatura en el campo cañero para dicho mes.

Este producto va de la mano de la “Perspectiva Climatológica a seis meses” que se elabora los primeros días de cada mes, en esta perspectiva se toman en cuenta los resultados arrojados por el modelo de predicción numérica “Seasonal Climate Forecasts V2. (CFSv2)” del Centro de Predicciones Climáticas de los EUA (CPC-NOAA) y se estiman las variables de precipitación y temperatura. En el boletín climatológico se busca validar lo pronosticado para estas variables.

Lo invitamos a consultar estos dos productos, así como los pronósticos de precipitación y temperatura a diez días en la página del CONADESUCA, en la sección principal de Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero <https://www.gob.mx/conadesuca/> o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-canero>



Boletín climatológico

- Calendario de fenómenos meteorológicos para el sector azucarero
 - Calendario agroindustrial del sector azucarero
- Principales eventos meteorológicos con incidencia en el campo cañero
 - Seguimiento a Frentes Fríos – Temporada 2020-2021
 - Seguimiento a Ciclones Tropicales – Temporada 2021
 - Monitor de Sequía en México para los municipios cañeros
 - Oscilaciones climáticas
 - Comportamiento de la precipitación y temperatura en MAYO
- Validación de la perspectiva de precipitación y temperatura de MAYO

Condiciones presentadas en mayo de 2021

El Boletín Climatológico es elaborado en apoyo al sector de la agroindustria de la caña de azúcar y se actualizará cada mes.

Este boletín es un complemento al producto “Perspectiva Climatológica” que se publica los primeros días de cada mes, ambos productos se pueden consultar en la página del CONADESUCA en la sección principal de Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero <https://www.gob.mx/conadesuca/> o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-canero>



Calendario de fenómenos meteorológicos para el sector azucarero

- Este calendario debe considerarse como una herramienta para prevenir riesgos ante eventos meteorológicos.
- No se debe descartar que estos eventos se presenten previo o posterior a las fechas señaladas.

Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Sistemas Frontales + Norte ¹												
Heladas												
Incendios												
Suradas ²												
Granizadas												
Ondas Tropicales												
Ciclones Tropicales ³												
Periodo de lluvias ⁴												
Canícula ⁵												
Monzón de Norteamérica ⁶												
Estiaje ⁷ (sequía meteorológica)												
Periodo climatológico												
Frío-seco												
Cálido-húmedo												

Notas:

1. La temporada de Frentes Fríos inicia oficialmente el 15 de septiembre y concluye el 15 de mayo del siguiente año.
2. Las suradas pueden ocurrir desde el 15 de diciembre hasta el 15 de abril y se caracterizan por presentarse antes de un evento de Norte.
3. La temporada de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental inicia oficialmente el 15 de mayo y en el Océano Atlántico el 1 de junio, en ambas regiones finaliza el 30 de noviembre.
4. El periodo de lluvias varía de acuerdo a la región geográfica del país, a nivel nacional ocurre de junio a noviembre.
5. El inicio y duración de la canícula varía, esta puede iniciar en junio y extenderse hasta septiembre.
6. El inicio y duración del monzón es variable, a partir de la segunda quincena de junio comienza la vigilancia para los estados del noroeste del país debido a un cambio en el patrón de los vientos, lo que favorece el desarrollo de lluvias.
7. En agroclimatología a este periodo se le conoce como sequía preestival o sequía relativa y varía de acuerdo a la región geográfica del país, a nivel nacional en las zonas cañeras inicia en diciembre y se prolonga hasta abril del siguiente año.



Calendario agroindustrial del sector azucarero

	2021											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ciclo cañero	... Ciclo cañero 2020/21						Ciclo cañero 2021/22 ...					
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2020/21									Ciclo azucarero 2021/22 ...		
Zafra	... Zafra 2020/21									Zafra 2021/22 ...		

Condiciones meteorológicas ideales durante la etapa de zafra



Las condiciones ideales para la caña de azúcar son: baja humedad atmosférica y del suelo, escasas precipitaciones, alta insolación y gran amplitud térmica (con días frescos pero libres de heladas).

Estos factores ayudan a aumentar el contenido de sacarosa, favorecen una cosecha eficiente y facilitan el traslado de la materia prima a los ingenios azucareros.



Principales eventos meteorológicos con incidencia en el campo cañero

Mayo se encuentra dentro del periodo climatológico cálido - húmedo (mayo a octubre), aunque también es considerado un mes de transición de la temporada fría-seca (noviembre a abril) porque aún se pueden presentar sistemas característicos de esta temporada, los principales eventos meteorológicos que incidieron en el campo cañero fueron:

No.	Sistemas meteorológicos ¹	M A Y O																														Regiones cañeras ²																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	NW	Pac	Cen	NE	P-G	C-G	SE											
1	AMT																																			X	X		X	X	X	X								
2	CBP																																				X	X	X	X	X	X	X							
3	LV																																								X	X	X	X						
4	SAP																																								X	X	X	X	X					
5	FF No. 54																																										X							
6	MAF FF No. 54																																											X						
7	FF No. 55																																												X					
8	Z. de Inestabilidad																																												X					
9	TT Andres																																													X				
10	FF No. 56																																													X	X	X	X	
11	MAF FF No. 56																																														X	X	X	X

Notas:

1)Sistemas meteorológicos: AMT, Aire Marítimo Tropical; CBP, Canal de Baja Presión; LV, Línea de Vaguada; SAP, Sistema de Alta Presión; FF, Frente Frío; MAF, Masa de Aire Frío; y, TT. Tormenta Tropical.

2)Regiones Cañeras: NW, Noroeste; Pac, Pacífico; Cen, Centro; NE, Noreste; P-G, Papaloapan-Golfo; C-G, Córdoba-Golfo; y, SE, Sureste.

Condiciones presentadas en mayo de 2021


Seguimiento a Frentes Fríos - Temporada invernal 2020-2021

La temporada de Frentes Fríos finalizó en mayo, por lo que se retoma nuevamente el seguimiento en septiembre.

Efectos de un Frente Frío en el campo cañero

El paso de estos sistemas y la masa de aire frío que los impulsa pueden ocasionar:

- Lluvias intensas
- Descensos de Temperatura
- Heladas en zonas altas
- Evento de Norte (vientos fuertes) en las zonas cercanas a las costas del Golfo de México
- Niebla (nubosidad) que puede provocar visibilidad reducida



En la temporada se pronosticaron:
54 FF

Por climatología:
44 FF

Al mes de MAYO se observaron:
57 FF

de los cuales incidieron en el campo cañero:
33 FF


Incidencia de FF en el campo cañero:

Año	2020																												2021							Total de FF																										
	Mes: Sep.			Octubre						Noviembre						Diciembre						Enero					Febrero		Marzo				Abril				Mayo																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57				
No. de Frente Frío:																																																														
Nacional - Zonas Cañeras																																																														
Noroeste																																																														
Pacífico																																																														
Centro																																																														
Noreste																																																														
Papaloapan-Golfo																																																														
Córdoba-Golfo																																																														
Sureste																																																														

Grafica y tabla: Seguimiento de Frentes Fríos con incidencia en el campo cañero. Temporada invernal 2020-2021. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: SMN. Pronóstico de Frentes Fríos. <http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/frentes-frios>.

Seguimiento a Ciclones Tropicales – Pacífico Nororiental – Temporada 2021

Ciclones Tropicales (CT) que se desarrollaron al mes de mayo en el Pacífico Nororiental y que tuvieron incidencia directa o indirecta en el campo cañero




CT en la temporada 2021

- 1 Tormenta Tropical Andres /del 9 al 11 de mayo
- 2 Tormenta Tropical Blanca /del 30 de may. al 4 de jun.

No.	Mes	Registro a) CT / b) CICC ²	Máx. categoría alcanzada ³							Total de sistemas ciclónicos
			DT	TT	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	
1	Mayo	CT	-	2	-	-	-	-	-	2
		CICC	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Junio	CT								
		CICC								
3	Julio	CT								
		CICC								
4	Agosto	CT								
		CICC								
5	Septiembre	CT								
		CICC								
6	Octubre	CT								
		CICC								
7	Noviembre	CT								
		CICC								
Totales		CT	-	2	-	-	-	-	-	2
		CICC	-	1	-	-	-	-	-	1

- No. de CT en el Pacífico Nororiental
- No. de CT con incidencia directa en el campo cañero
- No. de CT con incidencia indirecta en el campo cañero



Notas: 1. Registro de sistemas: a) CT, No. de Ciclones Tropicales y B) CICC, No. de Ciclones con Incidencia en el Campo Cañero (ya sea de forma directa o indirecta).
2. Incidencia directa se define como la trayectoria del sistema que pasa sobre la superficie cañera; mientras que, en la indirecta el sistema pasa cercano a la superficie cañera.
3. Máxima categoría alcanzada: DT, Depresión Tropical; TT, Tormenta Tropical; H-1, Huracán categoría 1; H-2, Huracán categoría 2; H-3, Huracán categoría 3; H-4, Huracán categoría 4; H-5, Huracán categoría 5.

Efectos de un Ciclón Tropical en el campo cañero



Lluvias significativas.



Inundaciones.



Acame de la caña por vientos fuertes.



Deslizamientos de ladera en zonas de montaña.

Seguimiento de Ciclones Tropicales con incidencia en el campo cañero en mayo


Información general del Ciclón Tropical							Incidencia en el campo cañero						
No.	Ciclón Tropical	Máxima cat. alcanzada ¹	Período de duración		Vientos máx. (km/h)	Presión mín. central (hPa)	Tocó tierra		Tipo de Incidencia (directa o indirecta)	Máxima cat. alcanzada ¹	Región cañera	Lluvia registradas ²	Fecha
			Fecha inicio	Fecha fin			si/no	Lugar (aprox.)					
1	Andres	TT	9/05	11/05	65	1,006	NO	-----	indirecta	TT	1) Pacífico	L a M	9/05

Notas: 1. Máxima categoría alcanzada: ZI, Zona de Inestabilidad; CT, Ciclón Tropical; DT, Depresión Tropical; TT, Tormenta Tropical; H-1, Huracán categoría 1; H-2, Huracán categoría 2; H-3, Huracán categoría 3; H-4, Huracán categoría 4; H-5, Huracán categoría 5.
2. Lluvias registradas: L = ligeras < 5 mm; M = Moderadas de 5 a 25 mm; F = Fuertes de 25 a 50 mm; MF = Muy Fuertes de 50 a 75 mm; I = Intensas de 75 a 150 mm; T = Torrenciales > 150 mm

Tablas y Grafico: Seguimiento de Ciclones Tropicales con incidencia en el campo cañero.
Elaboró: CONADESUCA, Fuente: Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América (CNH-NOAA) <https://www.nhc.noaa.gov/>.

Seguimiento a Ciclones Tropicales – Atlántico Norte - Temporada 2021


Ciclones Tropicales (CT) que se desarrollaron al mes de mayo en el Atlántico Norte (Golfo de México y Mar Caribe) y que tuvieron incidencia directa o indirecta en el campo cañero



CT en la temporada 2021

1 Tormenta Tropical Ana / del 22 al 23 de mayo

No.	Mes	Registro a) CT / b) CICC ²	Máx. categoría alcanzada ³							Total de sistemas ciclónicos
			DT	TT	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	
1	Mayo	CT	-	1	-	-	-	-	-	1
		CICC	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Junio	CT								
		CICC								
3	Julio	CT								
		CICC								
4	Agosto	CT								
		CICC								
5	Septiembre	CT								
		CICC								
6	Octubre	CT								
		CICC								
7	Noviembre	CT								
		CICC								
Totales		CT	-	1	-	-	-	-	-	1
		CICC	-	-	-	-	-	-	-	-



Notas: 1. Registro de sistemas: a) CT, No. de Ciclones Tropicales y B) CICC, No. de Ciclones con Incidencia en el Campo Cañero (ya sea de forma directa o indirecta).
2. Incidencia directa se define como la trayectoria del sistema que pasa sobre la superficie cañera; mientras que, en la indirecta el sistema pasa cercano a la superficie cañera.
3. Máxima categoría alcanzada: DT, Depresión Tropical; TT, Tormenta Tropical; H-1, Huracán categoría 1; H-2, Huracán categoría 2; H-3, Huracán categoría 3; H-4, Huracán categoría 4; H-5, Huracán categoría 5.

Efectos de un Ciclón Tropical en el campo cañero



Lluvias significativas.



Inundaciones.



Acame de la caña por vientos fuertes.



Deslizamientos de ladera en zonas de montaña.

Seguimiento de Ciclones Tropicales con incidencia en el campo cañero en mayo

Información general del Ciclón Tropical								Incidencia en el campo cañero					
No.	Ciclón Tropical	Máxima cat. alcanzada ¹	Período de duración		Vientos máx. (km/h)	Presión mín. central (hPa)	Tocó tierra		Tipo de Incidencia (directa o indirecta)	Máxima cat. alcanzada ¹	Región cañera	Lluvia registradas ²	Fecha
			Fecha inicio	Fecha fin			si/no	Lugar (aprox.)					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas: 1. Máxima categoría alcanzada: ZI, Zona de Inestabilidad; CT, Ciclón Tropical; DT, Depresión Tropical; TT, Tormenta Tropical; H-1, Huracán categoría 1; H-2, Huracán categoría 2; H-3, Huracán categoría 3; H-4, Huracán categoría 4; H-5, Huracán categoría 5.
2. Lluvias registradas: L = ligeras < 5 mm; M = Moderadas de 5 a 25 mm; F = Fuertes de 25 a 50 mm; MF = Muy Fuertes de 50 a 75 mm; I = Intensas de 75 a 150 mm; T = Torrenciales > 150 mm

Tablas y Gráfico: Seguimiento de Ciclones Tropicales con incidencia en el campo cañero.
Elaboró: CONADESUCA, Fuente: Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América (CNH-NOAA) <https://www.nhc.noaa.gov/>.



Monitor de Sequía en México para los municipios cañeros

Para definir la situación de sequía en nuestro país se emplea el Monitor de Sequía en México (MSM), el cual permite determinar su presencia en una área geográfica, así como su intensidad. Este producto es emitido y actualizado quincenalmente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Condiciones para el campo cañero al 15 de mayo de 2021

De acuerdo al Monitor de sequía, de los 267 municipios cañeros, 117 se encontraron dentro de una categoría de sequía (D1 - D2 - D3), 103 como anormalmente secos (D0) y 47 sin presencia de sequía, ver la siguiente tabla:

No.	Región cañera	Entidad cañera	Número de municipios cañeros según la intensidad de sequía					Municipios sin presencia de sequía	Municipios anormalmente secos - (D0)	Municipios con sequía (D1 - D4)	Total
			D0	D1	D2	D3	D4				
1	Noroeste	Sinaloa	0	0	1	3	0	0	0	4	4
		Nayarit	0	0	11	0	0	0	0	11	11
2	Pacífico	Jalisco	0	3	35	1	0	0	0	39	39
		Michoacán	0	0	10	7	0	0	0	17	17
		Colima	0	0	3	5	0	0	0	8	8
3	Noreste	Tamaulipas	0	2	6	0	0	0	0	8	8
		Veracruz	0	0	6	0	0	0	0	6	6
4	Centro	San Luis Potosí	0	2	9	0	0	0	0	11	11
		Morelos	20	0	0	0	0	0	20	0	20
5	Papaloapan-Golfo	Edo. de México	2	0	0	0	0	0	2	0	2
		Puebla	8	11	0	0	0	1	8	11	20
		Veracruz	10	0	0	0	0	4	10	0	14
6	Córdoba-Golfo	Veracruz	40	2	0	0	0	12	40	2	54
		Oaxaca	1	0	0	0	0	1	1	0	2
7	Sureste	Veracruz	17	0	0	0	0	1	17	0	18
		Oaxaca	1	0	0	0	0	10	1	0	11
		Tabasco	0	0	0	0	0	6	0	0	6
		Campeche	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		Quintana Roo	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		Chiapas	3	0	0	0	0	10	3	0	13
Totales:			103	20	81	16	0	47	103	117	267

Tabla: Municipios cañeros que presentan afectación por sequía al 15 de mayo de 2021. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: SMN. Monitor de sequía de México. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico>.

Nota: Se debe de tomar con reserva el resultado de este proceso, ya que el análisis del MSM parte de información a escala nacional; por lo que se toma en cuenta el dato más extremo en la clasificación de sequía (D1, D2, D3, D4) para asignarla a la superficie cañera. Es decir, el que un municipio caiga dentro de una categoría de sequía asignada por el MSM, significa que no necesariamente el 100% de su superficie tiene ese grado de afectación. Sin embargo, este monitor ayuda a determinar la presencia de sequía en cierta área geográfica, así como su intensidad.





Imagen de referencia: Monitor de sequía en México al 15 de mayo de 2021. Fuente: SMN. Monitor de sequía de México. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico>.

Los rangos de intensidad de sequía de acuerdo al sistema de monitoreo son:

- Anormalmente Seco (D0):** Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía; al inicio, debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios; mientras que, al final del periodo puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.
- Sequía Moderada (D1):** Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.
- Sequía Severa (D2):** Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del recurso hídrico.
- Sequía Extrema (D3):** Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.
- Excepcional (D4):** Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua.



Monitor de Sequía en México para los municipios cañeros



Para definir la situación de sequía en nuestro país se emplea el Monitor de Sequía en México (MSM), el cual permite determinar su presencia en una área geográfica, así como su intensidad. Este producto es emitido y actualizado quincenalmente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Condiciones para el campo cañero al 31 de mayo 2021

De acuerdo al Monitor de sequía, de los 267 municipios cañeros, 103 se encontraron dentro de una categoría de sequía (D1 - D2 - D3), 81 como anormalmente secos (D0) y 83 sin presencia de sequía, ver la siguiente tabla:

No.	Región cañera	Entidad cañera	Número de municipios cañeros según la intensidad de sequía					Municipios sin presencia de sequía	Municipios anormalmente secos - (D0)	Municipios con sequía (D1 - D4)	Total
			D0	D1	D2	D3	D4				
1	Noroeste	Sinaloa	0	0	1	3	0	0	0	4	4
		Nayarit	0	0	7	4	0	0	0	11	11
2	Pacífico	Jalisco	0	3	27	9	0	0	0	39	39
		Michoacán	0	0	14	3	0	0	0	17	17
3	Noreste	Colima	0	0	0	8	0	0	0	8	8
		Tamaulipas	0	2	6	0	0	0	0	8	8
4	Centro	Veracruz	3	0	3	0	0	0	3	3	6
		San Luis Potosí	0	2	9	0	0	0	0	11	11
5	Papaloapan-Golfo	Morelos	11	0	0	0	0	9	11	0	20
		Edo. de México	1	0	0	0	0	1	1	0	2
6	Córdoba-Golfo	Puebla	10	0	0	0	0	10	10	0	20
		Veracruz	8	0	0	0	0	6	8	0	14
7	Sureste	Oaxaca	34	2	0	0	0	18	34	2	54
		Veracruz	1	0	0	0	0	1	1	0	2
7	Sureste	Oaxaca	12	0	0	0	0	6	12	0	18
		Oaxaca	0	0	0	0	0	11	0	0	11
7	Sureste	Tabasco	0	0	0	0	0	6	0	0	6
		Campeche	0	0	0	0	0	2	0	0	2
7	Sureste	Quintana Roo	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		Chiapas	0	0	0	0	0	13	0	0	13
Totales:			81	9	67	27	0	83	81	103	267

Tabla: Municipios cañeros que presentan afectación por sequía al 31 de mayo de 2021. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: SMN. Monitor de sequía de México. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico>.

Nota: Se debe de tomar con reserva el resultado de este proceso, ya que el análisis del MSM parte de información a escala nacional; por lo que se toma en cuenta el dato más extremo en la clasificación de sequía (D1, D2, D3, D4) para asignarla a la superficie cañera. Es decir, el que un municipio caiga dentro de una categoría de sequía asignada por el MSM, significa que no necesariamente el 100% de su superficie tiene ese grado de afectación. Sin embargo, este monitor ayuda a determinar la presencia de sequía en cierta área geográfica, así como su intensidad.

Imagen de referencia: Monitor de sequía en México al 31 de mayo de 2021. Fuente: SMN. Monitor de sequía de México. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico>.

Los rangos de intensidad de sequía de acuerdo al sistema de monitoreo son:

- Anormalmente Seco (D0):** Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía; al inicio, debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios; mientras que, al final del periodo puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.
- Sequía Moderada (D1):** Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.
- Sequía Severa (D2):** Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del recurso hídrico.
- Sequía Extrema (D3):** Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.
- Excepcional (D4):** Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua.

Oscilaciones climáticas

Algunas oscilaciones climáticas¹ que ayudan a entender la variabilidad climática y el comportamiento de las variables lluvia y temperatura durante el mes son:

El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

Estado

Neutra

En mayo las condiciones de ENOS estuvieron en fase Neutral y de acuerdo con el pronóstico se espera se mantenga en los meses de verano (junio a agosto) con 78% de probabilidad y hasta el otoño (septiembre a noviembre) con 50% de probabilidad.

La mayoría de los modelos predicen que continuará ENOS-Neutral durante el otoño 2021; sin embargo, hacia finales de este e inicios del invierno aumentan las probabilidades de retornar a fase La Niña con una probabilidad del 50%. **Se debe mantener en vigilancia.**

Por lo anterior, no se puede definir con exactitud un patrón establecido sobre el comportamiento de las lluvias en próximos meses para las regiones cañeras, ya que, ante este escenario también dependeremos de otras oscilaciones como la MJO.

Pero, de mantenerse ENOS en fase Neutral hasta el otoño y de acuerdo con la estadística, se esperarían más lluvias en zonas del centro-occidente del país y menor en el oriente-sureste; mayor actividad ciclónica en la cuenca de Pacífico Nororiental y un monzón más activo.

Mientras que, la transición ENOS en fase La Niña hacia el otoño-invierno, ocasionaría en esos meses ahora un aumento de lluvias en zonas del oriente y sureste e incremento de la actividad ciclónica en el Atlántico. **Se mantiene en vigilancia.**

Oscilación Ártica (OA)

Estado

Neutra

En mayo la **OA estuvo en fase neutra.**

Durante este mes los efectos por FF no fueron tan significativos debido a la presencia de sistemas de alta presión (en capas media de la atmósfera) que disminuyeron el potencial de lluvias.

Los sistemas invernales que incidieron en las regiones cañeras fueron los FF No. 54, 55 y 56.

En nuestro país se da seguimiento a la OA y NAO principalmente durante la temporada fría-seca debido a su importancia en el desarrollo de sistemas invernales.

A partir de mayo, nos encontramos en la fase cálida-húmeda y los sistemas tropicales comienzan a dominar en el territorio nacional, por lo que se concluye el seguimiento a dichas oscilaciones y se retoman en el mes de septiembre cuando inicie la temporada de frentes fríos.

Oscilación del Atlántico Norte (NAO)

Estado

Negativa/Neutra

En mayo la **NAO estuvo en fase negativa /neutra.**

La interacción de la OA y NAO en fase negativa (y/o neutra en los meses abril-mayo) refuerza un pronóstico de mayor número de sistemas invernales o de mayor intensidad.

La fase negativa de NAO genera un mayor número de sistemas invernales.

La fase positiva de NAO ocasiona lluvias por debajo del promedio en el centro y sur de país.

Oscilación "Madden-Julian" (MJO)

Estado

Fase: 2-3-4-5-6-7

La MJO es una oscilación de corto periodo, tiene un ciclo de 30 a 60 días. Es importante darle seguimiento cuando pasa por nuestra región, ya que modula patrones de precipitación de corto periodo, actividades de Ciclones Tropicales (CT) y el Monzón de Norteamérica. **Tiene mayor intensidad en episodios de ENOS Neutral y Niña débil.**

En nuestro país se observa que:

Fases 3, 4, 5 y 6: se presentan lluvias por debajo del promedio.

Fases 1, 2, 7 y 8: se presentan lluvias por arriba del promedio.

En mayo la **MJO se ubicó en las fases 2-3-4-5-6-7**, las lluvias en la primera mitad del mes estuvieron asociadas a esta oscilación.



Comportamiento diario y mensual por ingenio azucarero y región cañera de las variables:

- **Precipitación acumulada**
- **Temperatura máxima**
- **Temperatura media**
- **Temperatura mínima**

Condiciones presentadas en mayo de 2021

Precipitación acumulada mensual por ingenio azucarero y región cañera






Imagen de referencia: Lluvia acumulada mensual. Lluvia registrada por EMA's a nivel nacional. Fuente: SMN-CONAGUA. Datos preliminares del SIH.

Los 10 ingenios con máxima lluvia acumulada mensual

No.	Ingenio Azucarero	Región Cañera	Entidad Cañera	Lluvia en mm
1	Huixtla	Sureste	Chiapas	496.1
2	Mahuixtlán	Papaloapan - Golfo	Veracruz	322.1
3	Central El Potrero	Córdoba - Golfo	Veracruz	300.1
4	Adolfo López Mateos	Papaloapan - Golfo	Oaxaca	259.6
5	El Carmen	Centro	Veracruz	239.9
6	San Nicolás	Córdoba - Golfo	Veracruz	213.7
7	Central San Miguelito	Córdoba - Golfo	Veracruz	213.3
8	La Joya	Sureste	Campeche	208.2
9	Tres Valles	Papaloapan - Golfo	Veracruz	184.6
10	Central La Providencia	Córdoba - Golfo	Veracruz	166.1



MAYO
La precipitación acumulada a nivel nacional en las zonas cañeras fue de:
105.1 mm
30.4 mm por arriba de la climatología que es de **74.7 mm**



Temperatura máxima promedio mensual por ingenio azucarero y región cañera






Imagen de referencia: Temperatura máxima promedio mensual. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional. Fuente: SMN-CONAGUA. Datos preliminares del SIH.

Los 10 principales ingenios con temperatura máxima promedio mensual registrada

No.	Ingenio Azucarero	Región Cañera	Entidad Cañera	Temperatura en °C
1	Plan de Ayala	Noreste	San Luis Potosí	37.2
2	José María Morelos	Pacífico	Jalisco	36.8
3	Alianza Popular	Noreste	San Luis Potosí	36.7
4	La Joya	Sureste	Campeche	36.3
5	Tres Valles	Papaloapan - Golfo	Veracruz	36.1
6	El Mante	Noreste	Tamaulipas	36.0
7	Emiliano Zapata	Centro	Morelos	36.0
8	Aarón Sáenz Garza	Noreste	Tamaulipas	35.8
9	San Pedro	Papaloapan - Golfo	Veracruz	35.7
10	Adolfo López Mateos	Papaloapan - Golfo	Oaxaca	35.7

Temperatura máxima promedio mensual (°C) - Climatología vs Observada - Mayo 2021



MAYO
La temperatura máxima promedio mensual a nivel nacional en las zonas cañeras fue de:
33.5 °C
0.2 °C por debajo de la climatología que es de **33.7 °C**



Graficas y tabla: Temperatura máxima promedio mensual vs la climatología. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: Resúmenes Mensuales de Temperaturas y Lluvia. SMN-CONAGUA. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias>

Temperatura media mensual por ingenio azucarero y región cañera






Imagen de referencia: Temperatura media mensual. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional.
Fuente: SMN-CONAGUA. Datos preliminares del SIH.



Los 10 principales ingenios con temperatura media mensual registrada

No.	Ingenio Azucarero	Región Cañera	Entidad Cañera	Temperatura en °C
1	Plan de Ayala	Noreste	San Luis Potosí	30.0
2	Tres Valles	Papaloapan - Golfo	Veracruz	30.0
3	La Joya	Sureste	Campeche	30.0
4	San Pedro	Papaloapan - Golfo	Veracruz	29.7
5	San Cristóbal	Papaloapan - Golfo	Veracruz	29.6
6	El Mante	Noreste	Tamaulipas	29.5
7	San Rafael de Pucté	Sureste	Quintana Roo	29.4
8	Aarón Sáenz Garza	Noreste	Tamaulipas	29.4
9	Santa Rosalía	Sureste	Tabasco	29.3
10	Presidente Benito Juárez	Sureste	Tabasco	29.3



MAYO
La temperatura media mensual a nivel nacional en las zonas cañeras fue de:
26.5 °C
0.0 °C igual a la climatología que es de 26.5 °C

Graficas y tabla: Temperatura media mensual vs la climatología. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional.
Elaboró: CONADESUCA. Fuente: Resúmenes Mensuales de Temperaturas y Lluvia. SMN-CONAGUA. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias>



Temperatura media diaria por ingenio azucarero

Table with columns: No., Región Cañera, Entidad Cañera, Nombre del Ingenio, MAYO - 2021 (days 1-31), Prom. Temp. mensual, Máx. temp. mensual, Mín. temp. mensual. Data is color-coded by temperature range.

En la tabla se registra un estimado de temperatura media diaria por ingenio, los datos se obtienen a partir del Sistema de Información Hidrológica (SIH-CONAGUA).

Rango de temperatura:

rango: categoría:

- Color-coded legend for temperature ranges: menor a 5 °C (muy frías), de 5 a 12 °C (frías), de 12 a 20 °C (frescas), de 20 a 25 °C (templadas), de 25 a 30 °C (cálidas), de 30 a 35 °C (calurosas), de 35 a 40 °C (muy calurosas), superior a 40 °C (extremadamente calurosas).

Nota: Al ser un valor que se estima a diario, varía con el dato oficial reportado en la temperatura media mensual (diapositiva anterior). Sin embargo, ayuda a entender el comportamiento de la temperatura diaria.

Tabla: Temperatura media diaria. Temperatura registrada por EMA a nivel nacional. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: Sistema de Información Hidrológica. CONAGUA.

Temperatura mínima promedio mensual por ingenio azucarero y región cañera






Imagen de referencia: Temperatura mínima promedio mensual. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional. Fuente: SMN-CONAGUA. Datos preliminares del SIH.

Los 10 principales ingenios con temperatura mínima promedio mensual registrada

No.	Ingenio Azucarero	Región Cañera	Entidad Cañera	Temperatura en °C
1	Calipam	Centro	Puebla	11.4
2	Bellavista	Pacífico	Jalisco	12.5
3	Santa Clara	Pacífico	Michoacán	13.1
4	San Francisco Ameca	Pacífico	Jalisco	13.7
5	Tala	Pacífico	Jalisco	14.2
6	Tamazula	Pacífico	Jalisco	14.2
7	Lázaro Cárdenas	Pacífico	Michoacán	14.5
8	Mahuixtlán	Papaloapan - Golfo	Veracruz	15.0
9	Melchor Ocampo	Pacífico	Jalisco	15.5
10	El Carmen	Centro	Veracruz	16.2

Temperatura mínima promedio mensual (°C) - Climatología vs Observada - Mayo 2021



MAYO
La temperatura mínima promedio mensual a nivel nacional en las zonas cañeras fue de:
19.5 °C
0.3 °C por arriba de la climatología que es de **19.2 °C**



Graficas y tabla: Temperatura mínima promedio mensual vs la climatología. Temperatura registrada por EMA's a nivel nacional.

Elaboró: CONADESUCA. Fuente: Resúmenes Mensuales de Temperaturas y Lluvia. SMN-CONAGUA. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias>



Validación de la perspectiva climatológica de MAYO para las variables:

- **Precipitación acumulada**
 - **Temperatura máxima**
 - **Temperatura media**
 - **Temperatura mínima**

Esta sección es un complemento a la “**Perspectiva Climatológica a seis meses**” que se elabora los primeros días de cada mes, en dicho producto se toma en cuenta los resultados arrojados por el modelo de predicción numérica “Seasonal Climate Forecasts V2. (CFSv2)” del Centro de Predicciones Climáticas (CPC-NOAA) y se estiman las variables precipitación y temperatura.

En el **boletín climatológico** se busca validar lo pronosticado para estas variables a partir de los datos observados en el mes.

Puede consultar la **Perspectiva Climatológica de MAYO** en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/638405/05_Mayo_2021_PersClima_6m_CONADESUCA.pdf

Validación de la perspectiva climatológica de MAYO

Para elaborar la perspectiva climatológica se emplea como herramienta el modelo de predicción "Seasonal Climate Forecasts V2. (CFSv2)" del Centro de Predicciones Climáticas (CPC-NOAA, por sus siglas en inglés), éste simula condiciones promedio que podrían presentarse en determinado tiempo (hasta 9 meses) en algún lugar o región; para ello, parte de una **normal climatológica**, definida como el comportamiento promedio de un rango de años de alguna variable como precipitación, temperatura, etc., e identifica anomalías mostrando qué tan por arriba o por debajo de la normal (o climatología) se va a encontrar la variable de estudio dentro del periodo de pronóstico.

En el mes de mayo se obtuvieron los siguientes resultados:

Precipitación



En mayo se esperaba por pronóstico lluvias por debajo de la normal climatológica en todas las zonas cañeras. Sin embargo, en todas las regiones cañeras se presentaron lluvias por arriba de la normal (excepto en la región Noroeste), debido en parte por la Oscilación "Madden-Julian" que ocasionó lluvias significativas en gran parte de la superficie cañera durante la primera mitad y hacia finales del mes.

Las lluvias estuvieron asociadas a frentes fríos y líneas de vaguada, canales de baja presión, el ingreso de aire húmedo y de manera indirecta por un sistema ciclónico.

Al comparar con el dato observado por región cañera (ver gráfico 1), el modelo quedó por debajo en las regiones cañeras: Noreste, Pacífico, Centro, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste; mientras que, en la región Noroeste quedó por arriba (de manera irrelevante).

Ver gráfico 2. para consultar resultados por ingenio

Se debe tener en cuenta que la formación de sistemas meteorológicos extremos pueden modificar significativamente las condiciones medias esperadas en los pronósticos climatológicos.



Gráficos: Validación del pronóstico de lluvia. Modelo de pronóstico CFSv2 vs datos observados. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/> y <https://www.tropicaltidbits.com/>

Validación de la perspectiva climatológica de MAYO

En el mes de mayo se obtuvieron los siguientes resultados:

Temperatura

Se esperaba una tendencia donde las temperaturas (máxima, media y mínima) estuvieran por arriba de la climatología.

Al comparar con el dato observado por región cañera (ver gráfico 1) y por variable los resultados fueron los siguientes:

Temperatura Máxima:

El modelo quedó por arriba en Noreste, Pacífico, Centro, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste; mientras que, en la Noroeste quedó por debajo. El mayor grado de error fue en Centro con 3.4 °C y el menor en Noreste con 0.4 °C.

Temperatura Media:



El modelo quedó por arriba en las regiones Noreste, Pacífico, Centro, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste; mientras que, en la Noroeste quedó por debajo. El mayor grado de error fue en Papaloapan-Golfo con 2.7 °C y el menor en Noreste, así como en Sureste con 0.5 °C.

Temperatura Mínima:

El modelo quedó por arriba las regiones Noreste, Pacífico, Centro, Papaloapan-Golfo y Córdoba-Golfo; mientras que, en la Noroeste y Sureste quedó por debajo. El mayor grado de error fue en Centro con 1.7 °C y el menor en Papaloapan-Golfo con 0.2 °C.

Ver gráfico 2. para consultar resultados por ingenio.

Se debe tener en cuenta que la formación de sistemas meteorológicos extremos pueden modificar significativamente las condiciones medias esperadas en los pronósticos climatológicos.



Gráficas: Validación del pronóstico de temperatura Modelo de pronóstico CFSv2 vs datos observados. Elaboró: CONADESUCA. Fuente: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/> y <https://www.tropicaltidbits.com/>

Comentarios finales



Mayo se encuentra dentro del periodo climatológico cálido - húmedo (mayo a octubre), aunque también es considerado un mes de transición de la temporada fría-seca (noviembre a abril) porque aún se pueden presentar sistemas característicos de esta temporada (ver diapositiva 4).



Meteorológicamente los sistemas que dominaron fueron los frentes fríos No. 54, 55 y 56; el desarrollo de líneas de vaguada y canales de baja presión que también favorecieron lluvias en las regiones cañeras del oriente, sureste y occidente del territorio nacional; la Tormenta tropical Andres; y, durante el mes un sistema de alta presión en capas medias de la atmósfera ocasionó disminución de lluvias en algunas zonas de la superficie cañera (ver diapositiva 6).



La temporada de frentes fríos finalizó en mayo, no obstante, en mayo aún 3 frentes incidieron en las zonas cañeras. **En dicha temporada se registraron 57 sistemas, de los cuales 33 incidieron en el campo cañero** (ver diapositiva 7).



La temporada ciclónica en el Pacífico Nororiental inició oficialmente el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio; sin embargo, este año se adelantó la temporada en ambos litorales y se espera que sea un año más activo debido a la ausencia del ENOS en fase “El Niño”. Al mes de mayo se han presentado 2 sistemas ciclónicos en el Pacífico Nororiental y 1 en el Atlántico Norte; de los cuales en este mes, sólo la Tormenta Tropical Andres incidió de manera indirecta en la región cañera Pacífico (ver diapositiva 8 y 9).



El **Monitor de sequía en México al 31 de mayo** indica que 103 municipios cañeros se encontraron dentro de una categoría de sequía (D1 - D2 - D3), 81 como anormalmente secos (D0) y 83 sin presencia de sequía (ver diapositiva 10 y 11).



En mayo **El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)** se mantuvo en fase **Neutra**; la **Oscilación Ártica (OA)** estuvo en una **fase neutra**; la **Oscilación del Atlántico Norte (NAO)** en fase **neutra-negativa**; mientras que, la **Oscilación “Madden-Julian” (MJO)** transitó por las fases **2-3-4-5-6-7**. Por lo anterior, durante este mes los efectos por FF no fueron tan significativos debido a la presencia de sistemas de alta presión (en capas media de la atmósfera) que disminuyeron el potencial de lluvias en algunas zonas cañeras; sin embargo, la MJO favoreció con un temporal lluvioso durante la primera mitad del mes y poco a poco comenzaron a dominar los sistemas tropicales característicos de la temporada (ver diapositiva 12).



En mayo todas las regiones cañeras Centro, Córdoba-Golfo, Papaloapan-Golfo y Sureste presentaron una **precipitación acumulada mensual** por arriba de la climatología; las regiones Noroeste, Noreste y Pacífico estuvieron por debajo de la media (ver diapositiva 14 y 15).



En **temperatura máxima promedio mensual** las regiones cañeras que estuvieron por arriba de la climatología fueron Noroeste, Noreste y Papaloapan-Golfo: y, por debajo de la normal la región Centro, Pacífico, Córdoba-Golfo y Sureste. Mientras que, en **temperatura promedio y mínima mensual** las regiones Noroeste, Noreste, Papaloapan-Golfo y Sureste estuvieron por arriba de la normal; y, por debajo las regiones Pacífico, Centro y Córdoba-Golfo (ver diapositiva de la 16 a la 21).

La importancia de la lluvia en la caña de azúcar

La importancia de la lluvia en la caña de azúcar

- Uno de los requerimientos ambientales para el cultivo de la caña de azúcar es la disponibilidad de agua, el consumo de ésta varía en cada fase de crecimiento; sin embargo, los valores máximos se necesitan en la fase denominada “período de gran crecimiento”.
- Abundante lluvia puede afectar al cultivo causando inundaciones.

Posibles afectaciones de las inundaciones a la caña de azúcar

- En temporada de zafra afecta al corte, retrasando la producción en el ingenio.
- Las superficies afectadas pueden presentar menores rendimientos de campo.



Umbrales de temperatura para la caña de azúcar

Durante las fases fenológicas los requerimientos óptimos son los siguientes:

- Germinación y emergencia, 24 - 37 °C.
 - Amacollamiento, 26 - 30 °C.
 - Rápido crecimiento, menor a 30 °C.
 - Maduración, 18 - 35 °C (noches frescas y días calurosos).
- Umbrales por arriba o por debajo pueden afectar el crecimiento de la planta y/o en la producción de sacarosa.
 - La caña de azúcar puede soportar temperaturas máximas de 45°C y mínimas de 12°C; sin embargo, llegar a este umbral retrasa su crecimiento vegetativo.
 - El rango óptimo de la temperatura media anual oscila entre los 26 - 30 °C.
 - La presencia de heladas de acuerdo a su duración e intensidad puede afectar a la caña, dichas afectaciones pueden ir desde el amarillamiento del follaje hasta la reducción del rendimiento en fábrica.

Fuentes:

1. Aguilar, N. (S.F.). Ficha Técnica del cultivo de Caña de Azúcar. SIVICAÑA. Consultado el 21 de mayo de 2018. Disponible en: web: http://nutriciondebovinos.com.ar/MD_upload/nutriciondebovinos_com_ar/Archivos/File/CA%C3%91A_DE_AZ%C3%91ACAR_FICHA_T%C3%89CNICA.pdf
2. CONAGUA (Sin fecha). Glosario Técnico. Servicio Meteorológico Nacional. Consultado el 30 de mayo de 2018. Disponible en: <https://smn.conagua.gob.mx/es/smn/glosario>
3. CONAGUA-PRONACOSE (2014). Programa Nacional Contra la Sequía. Documento Rector. Consultado el 30 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20Nacional%20para%20la%20Sequ%C3%ADa%20Documento%20Rector.pdf>
4. Ochoa, M., Reyes M., Manríquez J., (2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México (FIRA). Consultado el 24 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abreArc=3681>
5. Romero, E., Dígonzelli, P., Scandalaris, J. (2009). Manual del cañero. Argentina: Las Talitas: Estación experimental agroindustrial Obispo Colombres.



Información adicional para interpretar el pronóstico climatológico: GLOSARIO

Anomalía. Diferencia entre el valor pronosticado de una variable meteorológica (p. ej. precipitación) y el valor medio o climatología.

Ciclón Tropical (CT). Es un sistema de baja presión que se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una circulación, en superficie, organizada y definida en el sentido contrario a las manecillas del reloj en el Hemisferio Norte. Los CT se clasifican en: Depresiones Tropicales (DT), Tormentas Tropicales (TT) y Huracanes. Se les asignan nombres a partir de la categoría TT para identificarlos, ya que al mismo tiempo se pueden presentar varios CT. Los nombres son asignados por miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los pronósticos se elaboran con base en la climatología de los CT, las variaciones climáticas como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), la temperatura superficial del mar (TSM), etc.; y así obtienen años análogos (años de comportamiento similar).

Normal climatológica. Es el promedio de datos de alguna variable meteorológica en un cierto período de años, sirve para comparar las observaciones recientes o para fundamentar el conjuntos de datos basados en anomalías (p. ej. la precipitación), también se usa para predecir las condiciones que muy probablemente se presentarán en un lugar.

Pronóstico estacional. Pronóstico a largo plazo de las variables precipitación y temperatura. Se realizan de acuerdo con las condiciones existentes y las proyecciones de modelos numéricos de pronóstico de tipo estadísticos y dinámicos. También se toma en cuenta la variabilidad climática, que parte de la interacción de los elementos del sistema climático en varios años e identifica patrones en la atmósfera y oscilaciones climáticas como es El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés).

Sequía. Es la insuficiencia de volumen usual en las fuentes de abastecimiento, derivado de una menor cantidad de lluvia, su retraso o a una combinación de ambas causas naturales. Tiene la característica de ser impredecible en el tiempo en el que inicia, en su duración, en la intensidad o severidad y en la extensión territorial sobre la que ocurre. Debe distinguirse y separarse claramente de una insuficiencia debida a causas de manejo humano, la cual se origina cuando la demanda supera a la oferta de las fuentes de abastecimiento, provocando en éstas disminución de su volumen.

Sistemas frontal o Frente Frío (FF). Es el límite entre dos masas de aire con diferente temperatura y/o contenido de vapor de agua. Durante este evento se puede presentar descenso de temperatura, con posible desarrollo de heladas, vientos intensos, fuerte oleaje, y de presentarse la suficiente humedad en la atmósfera genera nubosidad y la posibilidad de desarrollo de lloviznas a tormentas eléctricas.



Publicaciones de productos meteorológicos y climatológicos

Producto	L	M	M	J	V
Pronóstico de lluvias a 10 días	✓		✓		✓
Perspectiva climatológica a 6 meses	Primeros días de cada mes				
Boletín climatológico mensual					

Estos productos se pueden consultar en la página principal del CONADESUCA en la sección Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero
<https://www.gob.mx/conadesuca/>
 o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-canero>

Geoportal del CONADESUCA

https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/GEO_PORTAL_CONADESUCA/Informacion_Meteorologica.html

En el Geoportal puedes consultar estadísticas climáticas por ingenio de los índices e indicadores agroclimáticos como:

- Precipitación
- Temperatura (mínima, media y máxima)
- Índice de humedad
- Balance hídrico
- Diagrama bioclimático

Próximas publicaciones meteorológicas y climatológicas de interés

- Variabilidad climática y oscilaciones climáticas
- Glosario meteorológico - climatológico





SIE - CAÑA

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

El CONADESUCA elabora productos como son pronósticos y boletines meteorológicos orientados al sector agroindustrial de la caña de azúcar para facilitar la toma de decisiones ante un evento meteorológico adverso; además, permite contar con una perspectiva de las condiciones que se puedan presentar a corto, mediano y largo plazo.

Por lo anterior, se consideran para su elaboración información meteorológica y climatológica de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a fin de mantener en vigilancia la evolución y trayectoria de fenómenos meteorológicos que puedan afectar las zonas cañeras debido a su avance. Además, se toma en cuenta información que genera el CONADESUCA a partir del Sistema de Información Estratégica de la Caña de Azúcar (**SIE-Caña**), el cual es una herramienta que permite visualizar, procesar y actualizar información geoespacial relacionada con la producción nacional de la caña de azúcar para obtener datos acerca del cultivo y con ello, generar información focalizada a los ingenios azucareros del país.

Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Teléfono: 55-3871-1900, extensión 57011, gob.mx/conadesuca

 @Conadesuca  @CONADESUCAmx  CONADESUCA