

**INFORMACIÓN RELEVANTE:**  
**ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.**

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- La entidad federativa con mayor incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 38 es: Zacatecas(2.1).
- Precedida por Chihuahua (1.4) y Tlaxcala (1.4).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 38, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 18 de las 32 entidades federativas (56.3%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 11 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 38 , 18 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Guerrero (100%), Oaxaca (50%), México (33.3%), Campeche (33.3%), Tabasco (28.6%), Jalisco (20%), Morelos (20%) y Colima (16.7%).

**Información hasta la semana epidemiológica 38 del 2021**

Tabla 1. Comparativo de incidencia\* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 34 hasta la semana 38, por entidad federativa, México 2021.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	34	35	36	37	38		34	35	36	37	38
Aguascalientes	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	Morelos	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
Baja California	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	Nayarit	1.4	1.0	1.1	1.1	1.2
Baja California Sur	1.2	1.1	1.1	1.4	1.3	Nuevo León	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5
Campeche	0.9	0.9	0.8	0.9	1.2	Oaxaca	1.1	0.9	0.9	0.6	0.9
Coahuila	0.9	0.7	0.9	0.8	0.8	Puebla	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
Colima	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	Querétaro	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
Chiapas	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	Quintana Roo	1.0	1.1	1.2	0.9	1.0
Chihuahua	1.6	1.5	1.6	1.3	1.4	San Luis Potosí	0.9	0.6	0.9	0.8	0.9
Distrito Federal	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	Sinaloa	0.9	0.9	1.1	1.0	1.1
Durango	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	Sonora	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1
Guanajuato	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	Tabasco	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9
Guerrero	0.9	0.6	0.2	0.1	0.2	Tamaulipas	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8
Hidalgo	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Tlaxcala	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4
Jalisco	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	Veracruz	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7
México	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	Yucatán	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0
Michoacán	0.8	0.6	0.9	0.7	0.6	Zacatecas	2.7	2.5	2.3	2.3	2.1
						Nacional	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 38, 18 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Guerrero	( 100.0 %)
Oaxaca	( 50.0 %)
México	( 33.3 %)
Campeche	( 33.3 %)
Tabasco	( 28.6 %)
Jalisco	( 20.0 %)
Morelos	( 20.0 %)
Colima	( 16.7 %)

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 38 es:

Zacatecas	( 2.1 )
-----------	---------

Precedida por Chihuahua (1.4) y Tlaxcala (1.4).


En 18 de las 32 entidades federativas (56.3%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior; y 11 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 38, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

\*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Figura 1. Incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 38, México, 2021.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2016 - 2021.



### Información relevante

#### Gráfica 2:

Hasta la semana 38 del 2021 se registraron 431,522 casos, lo que representa un incremento del 18.4% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

#### Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 38 1 de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 22%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.02%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (92.7%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (4.2%).


Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

\*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44476.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia\* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2020 - 2021.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



#### Noticias relevantes

<https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/regional/visitan-casas-para-detectar-covid-19-e-infecciones-diarreicas-7243889.html>

#### Visitan casas para detectar Covid-19 e infecciones diarreicas

TULA DE ALLENDE, Hgo.- Los médicos de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) y del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) no han detectado entre la población tulense brotes de enfermedades que requieran seguimiento epidemiológico.

Desde hace 10 días, las dependencias, federal y estatal, desplegaron decenas de médicos en las zonas afectadas que recorren casa por casa detectando enfermedades provocadas por la exposición de la población a las aguas negras, tras el desbordamiento del río Tula, el 6 y el 18 de septiembre.

"Estamos haciendo actividades de promoción a la salud, "y estamos haciendo búsqueda de casos activos de importancia epidemiológica, ya que vamos, casa por casa" explicó la residente Daniela Valdés.

Detalló que están detectando enfermedades diarreicas y por la pandemia, personas con síntomas de Covid-19.

La médica informó que hasta ese momento, su brigada que recorría la Unidad Habitacional de Pemex, no tenía ningún caso sujeto a vigilancia epidemiológica.

Y explicó que cuando se detecta algún caso de interés se le toman muestras y se le da seguimiento y se vuelve a visitar el domicilio para ver su evolución, hasta que la persona se recupera.

#### Elementos de comunicación a la comunidad

- La entidad federativa con mayor incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 38 es: Zacatecas(2.1).
- Precedida por Chihuahua (1.4) y Tlaxcala (1.4).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 38, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 18 de las 32 entidades federativas (56.3%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 11 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 38, 18 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Guerrero (100%), Oaxaca (50%), México (33.3%), Campeche (33.3%), Tabasco (28.6%), Jalisco (20%), Morelos (20%) y Colima (16.7%).