

Marchitez del plátano

Es causada por el hongo *F. oxysporum f. sp. cubense*. Existen varias razas de este patógeno, sin embargo **la Raza 4 Tropical (Foc R4T)** se considera **altamente virulenta y destructiva**.

Más del 80 % de los bananos y plátanos que se producen en el mundo son **susceptibles** a este patógeno.

Foc R4T es una plaga **ausente en México** que **recientemente se detectó en Colombia**



SÍNTOMAS EXTERNOS



- Amarillamiento uniforme de las hojas adultas a lo largo del margen foliar que se extiende hacia la nervadura central de la hoja.
- Las hojas se marchitan, adquieren un color café y permanecen adheridas a la planta.
- Puede presentarse agrietamiento en la base del pseudotallo.
- Necrosis y doblez de peciolo.

PREVENCIÓN

- ✓ **Restringir el ingreso al país de cormos y plantas**, así como **artesanías o artículos elaborados con fibras de musáceas** y materiales de empaque de *Musa* spp. y otras plantas hospedantes, **procedentes u originarias de Asia, Australia y Colombia**.
- ✓ **Vigilancia** activa en zonas productoras.
- ✓ **Diagnóstico** en laboratorio de muestras con síntomas similares a partir de haces vasculares del pseudotallo.

SÍNTOMAS INTERNOS

Cambio de color de los haces vasculares que se observa al cortar las raíces, el cormo o el pseudotallo.



Si observas síntomas parecidos

Notifica

01 800 987 98 79

alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



GOBIERNO DE
MÉXICO

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA