



PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATE




- **Barrenador de ramas del aguacate** (*Copturus aguacatae*), causa caída prematura de las hojas, ramas secas y ruptura de la rama afectada.
- **Barrenador pequeño del hueso del aguacate** (*Conotrachelus aguacatae* y *C. perseae*), perfora el fruto hasta llegar a la semilla.
- **Barrenador grande de la semilla del aguacate** (*Heilipus lauri*), ataca durante todo el ciclo de desarrollo del fruto. Barrena la parte carnosa (pulpa) del fruto para llegar a la semilla, donde completa su desarrollo. Los adultos se alimentan principalmente de frutos, pero también de ramas tiernas y flores.
- **Palomilla barrenadora del aguacate** (*Stenoma catenifer*), perfora la pulpa del fruto para llegar a la semilla. Sus daños se distinguen por la presencia de manchas blancas de apariencia caliza en el exterior de los frutos y su caída prematura.



Medidas de prevención y control:

- Elimina y destruye los frutos infestados y caídos para evitar que las larvas se sigan desarrollando.
- Poda e incinera las ramas afectadas para eliminar huevos, larvas y pupas que pudieran dispersarse en huertos aledaños.
- Controla las plagas con productos autorizados por la Cofepris.
- Monitorea e inspecciona los frutos en tu huerto de traspatio o predio, antes y durante la cosecha para mitigar el riesgo de dispersión de las plagas.
- Evita movilizar frutos infestados con larvas.



NOTIFICA cualquier caso sospechoso:
01 800 987 98 79
alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Comité Estatal o Junta Local de Sanidad Vegetal del Estado
osiap.org.mx

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”



GOBIERNO DE
MÉXICO

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA