

000599

S35

CONSEJO MÉDICO LEGAL Y FORENSE

C.M.L.F No.1319

OAXACA

DEPARTAMENTO
DE DERECHO ALA NACION



OAXACA, OAXACIANO.

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO.
"OFICIO EJECUTIVO DEL SEGURO TURNO ADSC. AL HOSPITAL CIVIL.
CIUDAD.

ASUNTO: AUTOPSIA.

Oaxaca de Juárez Oax., a 22 de mayo de 2007

Relativo a su oficio No. 365, Av. Prev. 636(LC) 2007

evado a cabo a

IDENTIFICACIÓN.- Cadáver del sexo masculino, raza mestiza, complejión regular de 20 a 21 años de edad, de 1.70 metros de estatura por 85 kilogramos de peso aproximado, cabello negro, lacio, corto, frente mediana, cejas pobladas de forma arqueada, ojos de color café, nariz recta con base mediana, bigote recortado y barba en mentón, boca con labios medianos y mentón oval. Como señas particulares presenta tatuajes: en el dorso de la espalda con la imagen de la virgen de Guadalupe, otro con las letras KK1 en cara externa tercio medio de la pierna izquierda, tatuaje con el nombre de Angélica en cara externa tercio medio de la pierna derecha.

EXAMEN EXTERNO.- Con todos los signos de muerte real y los de haber fallecido hace 10 horas aproximadamente. Presenta dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego: la primera con caracteres de orificio de entrada, de 7.5 mm de diámetro con presencia de halo equimótico alrededor del mismo y sin tatuaje, el orificio se encuentra en el epigastrio en su línea media sin presentar orificio de salida. La segunda herida con orificio de forma oval y con característica de entrada sin tatuaje en cara anterior tercio medio del muslo izquierdo con salida en cara interna tercio medio superior del muslo izquierdo para volver a penetrar en cara interna tercio superior del muslo derecho sin orificio de salida. También presenta múltiples escoriaciones de 0.5 cm con costra hemática en etapa de descamación en cara anterior del muslo derecho y dorso del pie izquierdo, así como huellas de venopunciones por tratamiento intrahospitalario.

EXAMEN INTERNO.- Abiertas que fueron las cavidades:

CRÁNEO. En los tejidos epicraneales y bóveda craneana no encontramos huellas de traumatismos ni lesiones, el cerebro se encuentra pálido e ingurgitado en sus vasos; la base del cráneo se encuentra integra y sin alteraciones.

Dr. Ramón Pardo No. 2
Col. Centro, Oaxaca, Oax.
C.P. 68000 / Tel. 5-16-33-42

DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
PACIFIDAD.
AYUDA DE BÚSQUEDA DE
PARÉNTESIS

CONUNIDAD
GUBERNATURA




CONSEJO MÉDICO LEGAL Y FORENSE

SUBPROCURADURÍA
PREVENCIÓN DEL D
COI
FISCALÍA ESPECIAL
PERSONAS


TÓRAX.- Los pulmones se encuentran pálidos al corte fluye sangre oscura y escasa. El corazón en diástole, ligeramente aumentado de tamaño. íntegro, pálido y vacío al corte.

ABDOMEN.- La primera herida descrita al exterior el proyectil vulnerante penetró a esta cavidad interesando en dicho trayecto piel, tejido subcutáneo, músculos, perforando epiplón mayor, lóbulo ~~DERECHO~~ del hígado, colon transverso, arteria aorta abdominal y fracturando la sexta vértebra dorsal fragmentándose el proyectil por lo que no se pudo recuperar, provocando una hemorragia en una cantidad que cuantificamos de 5000 mililitros, el hígado pálido aumentado de tamaño y sin alteraciones macroscópicas, y al corte fluye sangre oscura y escasa; el tracto gastro intestinal distendidos con escaso contenido alimenticio sin olor alcohol; riñones, bazo y restos de vísceras pálidos. El trayecto del proyectil vulnerante fue de adelante a atrás, de arriba hacia abajo en un ángulo aproximado de 15° y de izquierda a derecha en un ángulo aproximado de 25°.

PELVIS.- En el miembro pélvico derecho la segunda herida descrita al exterior el proyectil vulnerante provoca herida en sedal del muslo izquierdo lesionando piel y tejidos subcutáneo, sale y penetra en muslo derecho lesionando, piel, tejidos subcutáneos músculo del muslo derecho, se impacta con el fémur derecho cambiando de dirección y lesionando músculos del glúteos (sin lesionar vísceras abdominales) alojándose en región dorsal derecha de donde se extrajo la ojiva. El trayecto del proyectil vulnerante fue de adelante a atrás, de abajo hacia arriba en un ángulo aproximado de 35° y de izquierda a derecha en un ángulo aproximado de 40°.



Primer trayecto



Segundo trayecto.

Dr. Ramón Pardo No. 2
Col. Centro, Oaxaca, Oax.
C.P. 68000 / Tel. 5-16-33-42

PROCURADURÍA
PREVENCIÓN DEL D
COI
FISCALÍA ESPECIAL
PERSONAS



000600

534

536

DERECHO



DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
UNIDAD.

CONCLUSIÓN. Que la causa de la muerte de FABIAN LÓPEZ SUMANO, fue: HEMORRAGIA INTERNA INTENSA EN CAVIDAD ABDOMINAL POR PERFORACIÓN DE VISCERAS Y GRANDES VASOS, CAUSADAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO. PERSONA HOSPITALIZADA TRES HORAS APROXIMADAMENTE.



A T E N T A M E N T E
SUFRAZIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
LOS PERITOS MEDICOS LEGISTAS FORENSES DEL ESTADO.

Se anexa ojiva con un peso de 5.7 gramos, con longitud de 11 mm y 9 mm de diámetro, encamisado y ligeramente deformada en la punta.



CIÓN DE
IS HUMANO



DE DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
UNIDAD.
ZADA DE BÚSQUEDA DE
APARECIDOS

SUBPROCURADURÍA
PREVENCIÓN DEL CRIMEN
CONtra LAS PERSONAS

C.M.L.F No.1372

ASUNTO: AUTOPSIA.

Oaxaca de Juárez Oax., a 25 de mayo de 2007

CIUDADANO.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO.
SEGUNDO TURNO ADSC. A LA CRUZ ROJA.
C I U D A D.

Relativo a su oficio No. 301, Av. Prev. 656(C.R) 2007.

llevado a

cabo a las 10.00 horas del día 25 de mayo de 2007.

IDENTIFICACIÓN.- Cadáver del sexo masculino, raza mestiza, complejión robusta, de 37 a 38 años de edad, de 1.57 metros de estatura por 80 kilogramos de peso aproximado, cabello negro, crespo, semicrecido, frente mediana, cejas pobladas de forma arqueada, ojos de color café oscuro, nariz convexa con base ancha, bigote recortados y barba rasurada, boca con labios medianos y mentón oval. Sin señas particulares.

EXAMEN EXTERNO.- Con todos los signos de muerte real y los de haber fallecido hace 12 horas aproximadamente. Presenta 5 heridas producidas por proyectil de arma de fuego: Primera herida orificio con caracteres de entrada de 11 milímetros en cara interna tercio medio del brazo izquierdo sin quemadura ni tatuaje con orificio con caracteres de salida (2^a herida) de la anterior en cara externa tercio inferior del brazo izquierdo; Tercera herida con caracteres de orificio de entrada de 8 mm de diámetro con presencia de halo equimótico alrededor del mismo sin quemadura ni tatuaje, se encuentra en línea axilar anterior derecha con intersección del cuarto espacio intercostal derecho sin orificio de salida; Cuarta herida, orificio con caracteres de entrada sin quemaduras ni tatuaje en hipocondrio derecho a dos centímetros de la séptima costilla con orificio con caracteres de salida (5^a herida) de la anterior en flanco izquierdo con intersección de la línea axilar media izquierda.

EXAMEN INTERNO.- Abiertas que fueron las cavidades:

CRÁNEO. En los tejidos epicraneales y bóveda craneana no encontramos huellas de traumatismos ni lesiones, el cerebro se encuentra edematoso, pálido e ingurgitado en sus vasos y congestión capilar; la base del cráneo se encuentra intacta y sin alteraciones.

EXTREMIDADES SUPERIORES. La primera herida descrita al exterior el proyectil vulnerante lesionó piel, tejido subcutáneo y músculos del brazo izquierdo. El

SUBPROCURADURÍA
PREVENCIÓN DEL CRIMEN
CONtra LAS PERSONAS
ESCALA ESPECIAL
PERSONAS

000601

537

435

DERECH


TRAJECTO DE

trayecto del proyectil vulnerante fue de adelante a atrás, de abajo a arriba en un ángulo aproximado de 38° y de derecha a izquierda en un ángulo aproximado de 45° .


TÓRAX.- Al disecar los tejidos y al abrir esta cavidad observamos un coágulo de 400 mililitros en mediastino. La segunda herida descrita al exterior el proyectil vulnerante penetró a esta cavidad interesando en dicho trayecto piel, tejido subcutáneo, músculos, perforando el lóbulo medio del pulmón derecho, corazón y lóbulo superior del pulmón izquierdo provocando hemorragia en ambas hemitórax en una cantidad que cuantificamos en 4 litros, el proyectil en su paso lesiona músculos intercostales alojándose el proyectil en músculo deltoideo izquierdo de donde se extrajo la ojiva; los pulmones se encuentran pálidos al corte fluye escasa sangre oscura. El trayecto del proyectil vulnerante fue de adelante a atrás, de abajo a arriba en un ángulo aproximado de 15° y de derecha a izquierda en un ángulo aproximado de 25° .




ABDOMEN.- La tercera herida descrita al exterior el proyectil vulnerante penetró a esta cavidad interesando en dicho trayecto piel, tejido subcutáneo, músculos, perforando epíplón mayor y menor, lóbulo derecho del hígado y yeyuno, provocando una hemorragia en una cantidad que cuantificamos de 500 mililitros, el hígado pálido aumentado de tamaño y sin alteraciones macroscópicas, y al corte fluye sangre oscura y escasa; el tracto gastro intestinal distendidos con escaso contenido alimenticio sin olor alcohol; riñones, bazo y restos de vísceras pálidos. El trayecto del proyectil vulnerante fue de adelante a atrás, de arriba a abajo en un ángulo aproximado de 15° y de derecha a izquierda en un ángulo aproximado de 25° .



Primer trayecto



Segundo trayecto



Tercer trayecto



DE DERECHOS HUMANOS
DELITO Y SERVICIOS A LA
HUMANIDAD.
IZADA DE BÚSQUEDA DE
DESAPARECIDOS

SUBPROCURADURÍA
PREVENCIÓN DEL DELITO
CON

CONCLUSIÓN. Que la causa de la muerte de FAUSTINO ARAGON RAMIREZ, fue: HEMORRAGIA INTERNA INTENSA EN CAVIDAD TORACICA Y ABDOMINAL POR PERFORACIÓN DE VISCERAS Y GRANDES VASOS, CAUSADAS POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
LOS PERITOS MÉDICOS LEGISTAS FORENSES DEL ESTADO.

Se anexa ojiva con un peso de 6.1 gramos, con longitud de 11.5 mm y 9 mm de diámetro, encamisado.

GENE
SPECIALIZADA
D R O G A S
UNIDAD RESPE
INVESTIGACIÓN
CÓPIO Y TRAI
PROCURADURÍA GENE
SUBPROCURADURÍA
INVESTIGACIÓN
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE TERRORISMO ACCIÓN
DIR
DERECI



PROCURADURÍA DE
PREVENCIÓN DEL DELITO
COMÚN
ALIA ESPECIALIZADA
PERSONAS DES

1475

000602

1412 - 538

286

CONSEJO MÉDICO LEGAL Y FORENSE



=1412=

ASUNTO: AUTOPSIA.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo de 2007.

CIUDADANO
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
TERCER TURNO – HOSPITAL CIVIL
C I U D A D .

Relativo a su Oficio No. 580, Av. Previa No. 651(H.C.)2007.

AUTOPSIA MÉDICO LEGAL de JORGE FRANCISCO ESTRADA DIAZ,
llevada a cabo a las 07:50 horas del día 26 de MAYO de 2007..

N. INVESTIGACIÓN
N. DELINCUENCIA

IDENTIFICACIÓN:- Cadáver del sexo masculino; raza mestiza; complejión media, de 1.75 metros de estatura por 80 kilos de peso aproximado; de 28 a 30 años de edad; cabello negro y crespo; frente mediana; cejas pobladas; ojos de color café; nariz recta y ancha en su base; boca mediana; labios gruesos; bigote y barba semi crecidos; sin señas particulares.

EXAMEN EXTERNO:- Con todos los signos de muerte real y los de haber fallecido hace 5 a 6 horas presenta; excoriaciones dermoepidérmicas cubiertas de costra hemática no recientes en region frontal izquierda; ambos tercios proximales cara antero interna de ambas piernas; equimosis en pliegues de codo derecho; edema de rodilla y tobillo con acortamiento del miembro pélvico derecho; sobre rodilla y tobillo del mismo lado; tiene huellas de venopunciones en pliegue del codo izquierdo y subclavia izquierda; hay flacidez corporal generalizada; tiene huellas circulares sobre la región pectoral izquierda de los electrodos para electrocardiograma; se aprecia congestión de cara así como cianosis de labios y lechos ungueales de ambas manos; tiene una herida de naturaleza quirúrgica, se observa suturada de cuatro centímetros sobre la region del codo derecho.

Dr. Ramón Pardo No. 2
Col. Centro, Oaxaca, Oax.
C.P. 68000 / Tel. 5-16-33-42

 CONUNII

DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
CIUDAD.
DEPARTAMENTO DE
BÚSQUEDA DE
DESAPARECIDOS



OAXACA

CONSEJO MÉDICO LEGAL Y FORENSE

SUBPROCURADURÍA
DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO
COM

Hoja 2.....

EXAMEN INTERNO:- Abiertas que fueron las cavidades.

CRÁNEO:- Al disecar los tejidos blandos epicraneales se aprecia una zona de infiltrado hemático en periodo de reabsorción sobre la región frontal izquierda, al retirar la calota el encéfalo se encuentra con presencia de pequeños coágulos a diferentes niveles, datos de edema y congestivo.

CUELLO .- Se diseña la tráquea y en su interior se encuentra su mucosa hiperhemática..

TORAX.- Al retirar esta cavidad ambos pulmones se encuentran congestionados y disminuidos de tamaño, con aspecto moteado en su parénquima, al corte del parénquima se observa con zonas hemorrágicas, con escasa fluidez de sangre obscura y presencia de múltiples coágulos pequeños, el corazón macroscópicamente normal no graso, se observa una zona de cinco por tres punto cinco centímetros de diámetro enrojecida y reblandecida sobre la cara posterior del ventrículo izquierdo.

ABDOMEN.-El hígado de coloración violácea de superficie lisa y macroscópicamente normal, el bazo ligeramente aumentado de tamaño; el estómago vacío y sin olor característico, ambos riñones aumentados de tamaño y congestionado; el riñón derecho a su disección con presencia de pus.

CONCLUSIÓN.- La causa de la muerte de JORGE FRANCISCO ESTRADA DIAZ, fue : TROMBOEMBOLIS MULTIPLES (CEREBRAL PULMONARES Y CARDIACA) SECUNDARIAS A LAS LESIONES QUE SUFRIÓ EN SU ATROPELAMIENTO. PACIENTE HOSPITALIZADO DURANTE DOS DIAS, DADO DE ALTA Y REHOSPITALIZADO DOS HORAS.

PROCURADURÍA GENERAL
SUBPROCURADURÍA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE TERRORISMO AL DERECHO

Dr. Ramón Pardo No. 2
Col. Centro, Oaxaca, Oax.
C.P. 68000 / Tel. 5-16-33-42

OP
AV.P. 681(H.c) 07 ✓
D.A.P. 37 Forma H.C.

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIÓN
PREVENCIÓN DEL DELITO
SCALIA ESPECIALIZADA
PERSONAS DIFUNDIDAS



... - - - - -
agosto 5
en el Dr. Luis Jiménez L.

000603

Desp = H13 = 539

Túnel hídrico Segundo de Delfino Cárdenas Salazar,
 Odo a ~~desde~~ a las 10:00 A.M. hora del 26 de Mayo de 2007.
 Oficio. - Cadáver del exo varón, raza mestiza.
 complejo media ~~de~~ ^{edad} de 20 a 30 años, pesa 75 kg, pelo
 oscuro, de 95-98 cm de edad, cabello negro, loco-
 to, mucha azafrán, ojos pardos, ojos de color café, mui-
 doso. Ellos se vio que era de gran tamaño, labios gruesos,
 el seco todo, barba sencilla, nariz oval, piernas
 robustas.

Sistemas externos. - En orden por rigores: en la parte
 posterior de la nuca ^{9 a 10} cm, frente: un herida por cuchillo
 en la oreja izquierda, de 3 a 4 cm que intercruzó los pezones
 y contiene escoria por contrario en su interior, labios
 y ojos, ~~que~~ ^{que} poseían 12 grados; herida 12 grados
 dorsal de la nuca 12 grados, cara exterior del brazo
 izquierdo, ótimo grado por conducto 12 grados; el ombligo
 tiene igual grado de ambos lados; abdomen globo 20;

Ciudad de México
D.F.
C.I.D.H.

Sistemas internos. - Cerebro: se observan infiltrados a nivel
 de la base del sistema nervioso central en la región occipital; al re-
 sacular el cerebro observa una hoz de fractura con doble
 dirección que va de occipital a la región temporal
 todo dentro y fuera por medio; el encefalo
 muestra engrosamiento con múltiples engrosamientos a
 nivel de ese centro.

R.A.X. Dislocamiento de la articulación en rotundo ambos
 hombros, moratones con manchas de coloración
 roja y a la ^{edad} de ~~aparecidas~~ ^{de búsqueda} en forma fluida

metico, hay trozos de fracturas a nivel de 1º y 2º vértebras cervicales de ambos troncos, los cuales ~~no~~ son consecuentes pulmonar; el corazón presenta actividad normal.

ABDOMEN: El fígado de coloración café cloro de superficie blanca y al corte con sección fluida sanguinosa y ligeramente amarillenta normal y el hígado es redondo con gruesa piel de granularidad; el riñón es rojo oscuro contenido gástrico de coloración amarillenta sin alteraciones características, el asa de la vena renal palida y sin alteraciones estructurales. Se observan datos de lesión en este órganos.

CONCLUSIÓN - La causa de la muerte de D. JOSÉ COSTA PROVENIENTE, fue: Traumatismo profundo de ambos extremidades inferiores con fracturas de tibia y fibula y luxación utrera del mismo, causados en Vehículo de Motor.

OF. 581

AV.P. 661 (C.R) 2007

A.M.P. II falso C.R.

✓
10)

PROCU
PREVENC
FISCALIA ESPECIAL
PERSONAS DE



000604

Dep. = 1214 =

2009 Sept

DIRECCION
DIFERENCIAL

Autopsia Medico Legal de Fernando Garcia Tor
Realizada el 26 de Mayo de 2009 a las 12:00 hrs

Identificación. Cadáver del sexo masculino de
aproximadamente 46 años de edad, complejoa los
1.69 mts de estatura y de 90 kilos de peso apro
ximado, raza mestiza, cabello negro, lucio cejas postulado
negro, nariz grande de base ancha, bigote y barba
de boca grande, labios gruesos. No presenta heridas
particulares.

Examen Externo: Con todos los signos de muerte
y los de lesión ocurrida hace aproximadamente 12
presenta una herida por contusión en labio inferior
en ~~parte~~ parcial del mismo, cercana de los incis
frontales laterales y premolares, dientes, fractura de
molar inferior, coaptación del mismo y ~~que~~ se
sujeta coaptación del maxilo facial, bien da con des
inecto óseo de 3x2 cm en hombro regiendo
y riñones por contusión sobre region estomacal.

Examen Interno:

Cerebro. ~~Al~~ reborde tegido blando y gelatinoso
en forma trébol de los vasos ~~con~~ fractura de
edenros ~~con~~ congestivo y hemorragico, ~~con~~ coagulos de ~~que~~
~~de los qd. frontel.~~

Uris artenos. ~~Y~~ fragmentaria de maxilo facial
coronaria fractura en la fragmentaria de maxilo facial
maxilar inferior ~~por dada de piezas dentarias~~
~~en como perdida parcial del maxilo inferior.~~

vello. No hay datos de lesiones en esta zona anatomico.

Tórax: Descubrimos tejido blando, ~~observado~~ en el hilio sanguíneo a nivel de mango del estómago, al robar el mismo se observa coágulo de yeso a nivel del mismo en su cara interna, Ambos pulmones sanguinolentos y al corte de puente quirúrgico con fluido escasa de sangre negra, el corazón mucoso, ligeramente normal, no hay fracturas en este sentido.

Abdomen: Descubriendo esta cavidad el hígado mucoso ligeramente normal, el bazo con flujo hemorrágica rojiza, el estómago vacío sin olor característico, ambos riñones y sus calidades normales, resto de vísceras dentro de la normalidad.

Conclusion: La causa de la muerte de Fermín Guridi Toros fue ~~fracturismo profundo~~ de cráneo y cara con fracturas de piso de nariz y maxilla fracturadas con hemorragia intracraneal severa dañando los vasos que se localizó en vena de riego.

Of 341

D.V.P. 464 (7.41) 2007
Ayer 306 fmro (2108)

PERSONAS D

000605

Desp

MIG-
2007

Autopsia Médico Legal del menor Arnulfo Francisco
Gómez Gómez, recluidado a la 20:15 h del
26 de Mayo de 2007.

dentificación. Cuerpo del sexo masculino de 4 a 5
años de edad, de 1.06 mts de estatura y de 22
kg de peso aproximado, complejión delgada, con
cabello negro, liso y a rayas en trenza.
rostro amplio, cejas semi-pobladas, ojos colo-
res, nariz recta, chata, boca grande de labios gruesos.

Examen exterior. Con todos los signos de u-
n muerto natural y los de haber ocurrido han apro-
ximadamente 24 horas; presente: 4 heridas por
enfriamiento subcutáneo en región parietal y occipital
extensión de 2,3 y 4 cm, una herida geognaria que
lleva extensión de 22 cm de longitud que va
desde la sien izquierda y en forma de media luna al
occipital del lado derecho, presenta nódulos hiper-
tensionados por continuar en hombro izquierdo,
en forma posterior derecha, ambos lados así con
huellas de compresión en ambos pliegues de cuello
y subclavicular dejando una escoriación en regi-
ón de clavícula izquierda, muy hipertrofia de
ambos pies.

Examen interno:

Aspero al drenaje tejidos blandos epiteliales
les y sobre superficies presentan ampollas rabi-
tosas breves ^{ADA DE BUSQUEDA DE}
^{SAPARECIDAS} en regiones del hombro y
derecho. Asimismo una coagulación de

le 7 x 6 cm de diámetro que abarca huesos
costados y temporal descalcados como hermo-
sis de mosaico encefálico col sección caliza
~~de~~ observamos tronco ~~de~~ fractura del
tronco parietal descalcado con invasión ^{PERSONAS} a piso mu-
scular leprosogría sus bordes de hemisferio de
lo el anelito se encuentra hemorragia y
hematomas, sangre diseminada

Tórax: Ambas pulmones se encuentran pal-
pables y con disociación con exceso fluido pleural
y esparsa corona sin patología aparente
el fino ó fumoso y evolución
a la edad.

Abdomen: El ligado ~~parado~~ y en su parte
fluido de exceso sangre oxígena, el estómago
los procesos de acuerdo a edad y microscópicamente
normales.

Conclusion: La causa de la muerte del menor
Arístides Francisco Pérez Gómez fue
con fusión profunda de costillas con
fractura y herida granular de la parte del pecho
pasa una postoperación de 8 días.
Firma: José Alvaro

Of-517
D.P.-654 (46) 2004
M.R. 8 de Mayo

PROCURADURÍA DE
PREVENCIÓN DEL CRIMEN
FISCALIZACIÓN
SPECIALIZADA EN
PERSONAS DES
ESTRUCTURA

José Alvaro
Alex Pé-
rez Martíne-

000606

DOD = 1417 ^{SHT}
~~6488~~

Autopsia médica legal de fallecimiento TECACO por, Cle
a Col. a las 14:00 hrs el 27 de May de 2007.

~~Participación: Colas del Dgo municipal, vsg. Mefiz. Cor.
mediano de 1.58 metros de estatura por 85 kg de peso y
de 34-36 años de edad, cabellero negro, est, loco, fruto de
cognos potestos, oj. de color café, voz adulto, chico, boca sin
labios gruesos, bigote y barba bien cuidados, ojos fuertes,
color gris perla. Tatuaje en el brazo derecho que representa un
pezicote en pleno vuelo y en forma de peces; el segundo tatuaje
peatonal izquierdo y tiene la figura de linea en la mitad
una estrella; el brazo en cera y trazo de goma 12 gramos
la figura de un tiburón mostillo.~~

~~Examen EXTERNO. - En todo los figuras se observa a
los humanos haber fallecido hace 15. Años aproximadamente, p
ara a medida que continúan a regiones profunda temporal
un centímetro de diámetro con suavidad al
tacto; igualmente la palpebral deseca, con huello
profundo por conducto al lábito 13 gramos. Multitud
de moratones tenues en todo y rodilla deseca;
dorsal de los dedos de ambos manos; huello de la
presión en uñas clavas desecadas y ambas antebrazos.~~

~~Examen INTERNO. - Clavos: Se observa capilar blando epí
encontrando una vena impulsada que no tiene su
desecho; se observa una fractura en la base de los
que abarca a más de 1 cm. de diámetro en la parte
ósea; se observa una fractura en la parte ósea; se observa
fractura en la parte ósea; se observa una fractura en la parte ósea;
se observa una fractura en la parte ósea; se observa una
fractura en la parte ósea; se observa una fractura en la parte ósea;~~

predominio del hígado portal; la próstata desciende al exterior cuenta con una invasión más que media.

TOPS X: Al abrir este corazón los pulmones se presentan antracicos y al tacto con flama ardiente de la ocrea y espirarse; el corazón microscópante muestra; no hay dudas de contusiones en este corazón.

ASOCEN: El fígado se encuentra con aspecto amarillento y moteado, ad su secamiento con escasa fluidez, friaca, el riñón grande y engorgado, órgano contenido gastos y de coloración verdosa; el resto de los órganos dentro de límite de normalidad.

CONCLUSIÓN: Se causa de la muerte de ~~explosión~~ de explosivo de Cr. de Colecto pár, por: Contusión producida en proctos y hemorragia latente del mismo causados en un accidente de Vehículo de ~~motor~~ persona hospitalizada durante 2 días.

OF. 523

S.V.P. 655 (H.C) 2007
S.M.P. 18 form A.C.

Dr. José Alberto Jiménez
Dr. Alejandro Berrels
Dr. María Jiménez I

PROFESIONAL
SUSPENSIÓN
INVESTIGACIÓN DEL DELITO
COMISIÓN
ESPECIAL DE PERSONA

000607

DODP.: 1438 = 543
111

Autopsia Medico Legal de Eusebio Uzcátegui Ulloa
nacido en el año 1950 m.s. el 28 de Mayo de 2001.

DE DERECHOS HUMANOS
DENTO Y SERVICIOS A LA
MUNIDAD.

DENTIFICACION: Cadáver del sexo masculino, raza mestiza, complejión normal, de 88 años de edad, o 87 años. De estatura por 70 kgs. De peso aproximado 73,5 kg. Cabello cano todo él, frate aúlio, cejas escasas, los de color café, nariz mediana, dentada y ancha, boca grande, labios gruesos, bigote cano y negro, un ligamento roto e implantado su mentón y con dos súrs particularidades presenta una cicatriz antigua de 11 cm. de longitud en mesognathio, así como un orificio proximal en ambos maxilares.

REPÚBLICA
DE VIGILANCIA
DELITOS Y DELINCUENCIA

ELABORADO EN EL LIZADA EN
CENTRO DE ATENCIÓN AL HOMBRE
EXCEPCIONAL
FEDACION DE
LOS HUMANOS

ESTADO DE MÉXICO
ARMADA DE MÉXICO
FEDACION DE
LOS HUMANOS

DETALLADO - Con todos los signos de muerte y los de haber fallecido hace 3 ó 4 horas p. egimosis se el labio inferior, región submaxilar izquierda, cara anterior interna de BRAZO 1874-20
lado izquierdo y ventosas posteriores del brazo. Se observaron, por confusión se rodilla y pie izquierdo, una herida quirúrgica para fraguado de 3 cm., una herida sufrida de 25 cm. se observó herida derecha, perdida de piel de 35 x 20 sobre el brazo derecho; se palpa fundem. del h. en su tercio distal y el codo con una fijación de 10; con presencia de material pulvulado; pero la piel del dorso d. humano derecho; una herida en la falange distal del dedo indice del mismo lado derecho; fijos edemas de ambos pies anormalmente superiores, fijos puntos oscuras e inflamados superior izquierdo y subclavio izquierdo.

D. RECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
MUNIDAD.
REBECIO: 10.
REBECIO: 10.
REBECIO: 10.