


Consejo Nacional de Población

INDICADORES DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

ENADID 1997




FECUNDIDAD

Tasa global de
fecundidad, 1960-2000

Año	Tasa
1960	7.3
1961	7.3
1962	7.3
1963	7.2
1964	7.2
1965	7.2
1966	7.1
1967	7.1
1968	7.0
1969	6.9
1970	6.8
1971	6.7
1972	6.5
1973	6.4
1974	6.2
1975	6.1
1976	5.9
1977	5.6
1978	5.4
1979	5.2
1980	5.0
1981	4.8
1982	4.6
1983	4.4
1984	4.2
1985	4.1
1986	3.9
1987	3.8
1988	3.7
1989	3.6
1990	3.4
1991	3.3
1992	3.2
1993	3.1
1994	3.0
1995	2.9
1996	2.8
1997	2.6
1998	2.6
1999	2.5
2000	2.4

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población.

Tasa global de fecundidad, 1960-2000




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población.


Tasas de fecundidad por edad para años seleccionados, 1974-2000

Grupos de edad	1974	1982	1992	1997	2000
15-19	0.13145	0.1112	0.0830	0.0766	0.0604
20-24	0.28081	0.2244	0.1682	0.1400	0.1268
25-29	0.28493	0.2089	0.1602	0.1432	0.1296
30-34	0.25011	0.1666	0.1159	0.0978	0.0943
35-39	0.17625	0.1150	0.0708	0.0557	0.0514
40-44	0.08241	0.0481	0.0252	0.0135	0.0170
45-49	0.01648	0.0096	0.0052	0.0028	0.0034

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.



Porcentaje de hijos nacidos vivos que tuvieron un patrón reproductivo favorable,* según periodo de nacimiento, 1977 - 1997



* Corresponden a primogénitos y subsecuentes bien espaciados con velocidades reproductivas lentas y medias de mujeres de 20 a 34 años de edad.


Fuente:

1977-1986 Bobadilla J. et al. "Family Formation Patterns and Child Mortality in Mexico" En: IRD.ISP Demographic and Health Surveys Further Analysis Series, Number 5. 1990.

1987-1992. Zubieta B. y R. Aparicio. "Efecto de los patrones reproductivos en la mortalidad neonatal" En: Hernández B y C. Menkes, coord: La población de México al final del siglo XX.


1990-1997. Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.

Tasa global de fecundidad según nivel educativo, 1974-1996



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.

Tasa global de fecundidad rural y urbana, 1974-1996



Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.


Tasa global de fecundidad por entidad
federativa, 1990 y 2000

Estado	2000	1990
Nacional	2.4	3.4
Aguascalientes	2.6	3.6
Baja California	2.2	3.1
Baja California Sur	2.1	2.8
Coahuila	2.4	3.1
Colima	2.1	2.9
Campeche	2.3	3.6
Chiapas	2.9	4.5
Chihuahua	2.2	3.2
Distrito Federal	1.8	2.2
Durango	2.7	4.0
Guanajuato	2.8	3.7
Guerrero	3.0	4.2
Hidalgo	2.6	3.4
Jalisco	2.5	3.8
México	2.2	3.1
Michoacán	2.8	4.2
Morelos	2.1	2.9
Nayarit	2.4	3.5
Nuevo León	2.1	2.5
Oaxaca	2.9	4.4
Puebla	3.0	4.3
Querétaro	2.5	4.1
Quintana Roo	2.4	3.5
San Luis Potosí	2.9	4.0
Sinaloa	2.1	2.9
Sonora	2.1	2.7
Tabasco	2.6	3.5
Tamaulipas	2.1	2.8
Tlaxcala	2.3	3.8
Veracruz	2.3	3.2
Yucatán	2.2	3.6
Zacatecas	2.7	4.1

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población.

Tasa global de fecundidad por entidad federativa, 1990 y 2000

Hijos por mujer



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población.


INICIO DE LA VIDA REPRODUCTIVA

Distribución porcentual de las mujeres según edad a la primera unión o matrimonio, por generación, 1997

Generación	Menos de 16 años	16-19 años	20-24 años	Sin unión a los 25 años
1953-1957	14.9	34.9	28.2	22.0
1958-1962	14.2	33.4	27.4	24.9
1963-1967	12.6	32.2	27.5	27.7
1968-1972	9.9	30.6	28.1	31.3

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de las mujeres según edad a la primera unión o matrimonio, por generación, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Proporción acumulada de mujeres nacidas entre 1953-1957 y entre 1968-1972 que se encontraban unidas en primeras nupcias a cada edad, 1997

Edad	1953-1957	1968-1972
14	7.8	5.4
15	14.9	9.9
16	23.2	16.3
17	32.1	24.6
18	41.3	32.6
19	49.8	40.5
20	57.3	48.1
21	63.8	54.6
22	69.6	59.9
23	74.2	64.8
24	78.0	68.7
25	80.9	71.3
26	83.0	73.0
27	85.2	73.8
28	86.4	74.4
29	87.3	74.4

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.




Distribución porcentual de las mujeres según edad a la primera unión o matrimonio, por escolaridad y lugar de residencia (generación 1963-1972), 1997

Características	Menos de 16 años	16-19 años	20-24 años	Sin unión a los 25 años
Total	11.1	31.4	27.8	29.7
Sin escolaridad	34.9	34.3	14.1	16.7
Primaria incompleta	25.6	40.5	17.4	16.6
Primaria completa	15.0	40.0	23.8	21.1
Secundaria y más	4.0	25.7	33.2	37.1
Rural	20.2	38.9	22.0	18.9
Urbana	8.7	29.3	29.4	32.6

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de las mujeres según edad a la primera unión o matrimonio, por escolaridad y lugar de residencia (generación 1963-1972), 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de las mujeres nacidas entre 1953-1957 y entre 1968-1972 que se unieron antes de edades específicas por entidad federativa

Entidad federativa	Generación 1968-1972			Generación 1953-1957		
	Primera unión antes de los			Primera unión antes de los		
	16 años	20 años	25 años	16 años	20 años	25 años
Nacional	9.9	40.5	68.7	14.9	49.8	78.0
Aguascalientes	5.8	33.7	66.6	8.6	45.2	78.0
Baja California	9.6	40.4	72.2	13.2	48.0	79.7
Baja California Sur	8.7	47.4	70.4	10.8	48.2	77.0
Campeche	13.3	53.3	77.8	18.1	61.1	87.0
Coahuila	8.5	48.5	76.4	14.7	53.1	79.6
Colima	11.0	38.8	71.2	13.3	45.8	73.9
Chiapas	23.4	61.9	81.5	24.3	62.7	84.0
Chihuahua	9.9	44.4	72.6	10.3	49.2	77.0
Distrito Federal	2.7	25.3	55.0	11.4	40.6	68.4
Durango	9.9	45.2	71.9	14.9	53.9	83.1
Guanajuato	7.4	36.4	67.3	8.8	44.4	69.4
Guerrero	21.2	56.8	78.5	26.4	61.7	81.3
Hidalgo	11.9	46.5	72.5	22.7	54.8	79.0
Jalisco	5.4	34.0	62.9	9.1	37.6	71.5
México	7.3	36.4	64.4	13.9	49.3	82.4
Michoacán	12.2	39.6	67.4	15.6	53.3	79.0
Morelos	11.3	42.7	71.4	20.1	57.8	79.8
Nayarit	14.5	49.8	75.9	18.2	56.8	81.6
Nuevo León	7.7	32.9	68.0	10.7	40.8	72.0
Oaxaca	17.6	56.7	75.8	25.5	54.9	80.7
Puebla	12.3	46.1	70.4	13.2	55.9	79.8
Querétaro	7.1	37.4	68.8	12.4	44.3	74.8
Quintana Roo	12.7	49.8	78.7	18.5	60.4	81.9
San Luis Potosí	14.0	44.5	72.2	16.1	51.0	79.6
Sinaloa	12.6	46.4	85.1	17.5	59.1	84.9
Sonora	7.6	39.3	67.7	16.3	53.2	82.3
Tabasco	19.1	50.3	75.9	26.2	59.2	85.3
Tamaulipas	6.5	39.2	70.4	12.3	51.7	80.3
Tlaxcala	10.8	47.6	74.5	17.8	54.0	81.0
Veracruz	13.7	42.2	68.3	16.4	50.9	82.1
Yucatán	9.2	40.5	70.3	15.2	54.6	84.1
Zacatecas	8.5	43.3	73.0	17.5	55.6	79.3

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población, con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de las mujeres que se unieron o casaron antes de cumplir 25 años de edad según tipo de primera unión, por generación, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de las mujeres unidas antes de los 25 años según tipo de primera unión, por entidad federativa (generación 1968-1972)

Entidad	Matrimonio	Unión consensual
Nacional	63.7	36.3
Aguascalientes	82.9	17.1
Baja California Sur	71.0	29.0
Baja California	67.7	32.3
Campeche	79.7	20.3
Coahuila	81.4	18.6
Colima	65.0	35.0
Chiapas	61.4	38.6
Chihuahua	73.0	27.0
Distrito Federal	73.0	27.0
Durango	76.3	23.7
Guanajuato	83.6	16.4
Guerrero	66.7	33.3
Hidalgo	55.9	44.1
Jalisco	81.0	19.0
México	68.3	31.7
Michoacán	76.9	23.1
Morelos	64.8	35.2
Nayarit	55.8	44.2
Nuevo León	83.5	16.5
Oaxaca	60.5	39.5
Puebla	62.0	38.0
Querétaro	69.8	30.2
Quintana Roo	67.2	32.8
San Luis Potosí	68.0	32.0
Sinaloa	62.9	37.1
Sonora	66.9	33.1
Tabasco	64.8	35.2
Tamaulipas	70.9	29.1
Tlaxcala	65.3	34.7
Veracruz	53.6	46.4
Yucatán	83.0	17.0
Zacatecas	86.4	13.6

Distribución porcentual de las mujeres que se unieron o casaron antes de cumplir los 25 años de edad según tipo de primera unión, por entidad federativa (generación 1968-1972)




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Probabilidad acumulada de tener el primer hijo antes de cumplir
edades específicas, por generación

Años	1953-1957	1958-1962	1963-1967	1968-1972
15	3.1	2.8	2.4	1.7
16	6.3	6.2	5.5	4.1
17	11.9	11.9	11.0	8.8
18	20.5	19.4	18.2	15.2
19	29.9	28.4	27.0	23.4
20	39.5	38.5	35.9	31.7
21	48.6	46.8	44.2	40.4
22	55.8	54.1	51.7	48.3
23	62.5	60.7	58.2	54.9
24	68.2	66.9	64.1	60.4
25	73.4	71.8	68.6	65.0

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.




Probabilidad acumulada de tener el primer hijo(a) antes de cumplir 18, 20 y 25 años de edad de las mujeres nacidas entre 1953-1957 y entre

Entidad federativa	Generación 1968-1972			Generación 1953-1957		
	18 años	20 años	25 años	18 años	20 años	25 años
Nacional	15.2	31.7	65.0	20.5	39.5	73.4
Aguascalientes	10.7	25.9	63.7	15.0	35.2	72.8
Baja California	17.0	30.8	68.4	19.7	39.1	69.5
Baja California Sur	18.4	33.3	69.2	14.8	40.6	72.3
Campeche	17.4	39.9	72.1	23.2	44.0	78.5
Coahuila	14.7	35.8	73.9	23.2	44.8	76.5
Colima	16.3	32.0	67.9	16.1	37.7	71.5
Chiapas	28.0	49.5	76.9	30.1	52.6	78.3
Chihuahua	16.5	35.4	73.4	18.7	37.2	73.0
Distrito Federal	7.6	19.4	51.6	13.7	30.0	62.6
Durango	14.0	34.8	72.4	21.9	43.2	79.2
Guanajuato	14.0	30.4	62.2	14.6	34.4	67.8
Guerrero	27.4	44.7	75.9	28.7	51.2	74.4
Hidalgo	19.7	41.3	71.8	28.2	50.0	81.2
Jalisco	10.4	25.0	60.4	16.6	31.7	69.0
México	12.8	28.4	61.4	21.2	39.9	79.2
Michoacán	18.6	34.9	65.2	23.6	42.5	77.0
Morelos	16.3	33.5	66.2	26.7	44.2	73.9
Nayarit	23.0	42.6	73.7	24.8	47.2	79.3
Nuevo León	10.4	25.4	59.6	15.7	30.6	62.7
Oaxaca	25.2	42.6	74.8	27.8	44.9	74.5
Puebla	18.2	35.2	68.8	19.9	41.9	74.7
Querétaro	14.4	32.3	63.6	18.4	32.9	72.3
Quintana Roo	16.7	34.4	72.5	29.2	48.7	76.0
San Luis Potosí	19.9	37.7	69.2	22.1	42.1	77.9
Sinaloa	15.0	31.1	75.8	24.5	49.5	80.0
Sonora	14.5	30.3	66.9	23.7	45.1	77.8
Tabasco	24.9	40.5	69.3	26.7	47.7	76.5
Tamaulipas	13.2	28.6	62.4	18.9	37.5	72.3
Tlaxcala	19.3	38.4	73.0	23.2	45.5	79.7
Veracruz	14.9	33.7	63.9	19.0	37.9	77.2
Yucatán	14.7	30.7	62.4	20.5	42.1	77.1
Zacatecas	14.9	34.0	66.5	23.3	43.1	74.6

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de las mujeres unidas de acuerdo a la duración de su intervalo protogenésico, según generación, 1997 (Mujeres que se unieron antes de cumplir 26 años de edad y con al menos 5 años de unión o matrimonio)




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.


Probabilidad acumulada de tener un embarazo premarital antes de cumplir edades específicas, por generación

Años	1953-1957	1958-1962	1963-1967	1968-1972
15	0.9	0.7	0.6	0.6
16	1.4	1.4	1.4	1.1
17	2.3	2.6	2.3	2.3
18	3.9	4.2	3.9	3.9
19	5.7	6.1	5.9	5.9
20	7.3	8.4	8.2	7.7
21	9.0	10.0	10.1	10.6
22	10.3	11.5	11.7	12.7
23	11.7	13.1	13.2	14.5
24	12.6	14.2	14.6	15.9
25	13.3	15.2	15.6	17.1

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.



Peso de los embarazos premaritales en la probabilidad de tener el primer hijo(a) antes de los 20 años, según generación



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Probabilidad acumulada de tener un embarazo premarital antes de cumplir 20 y 25 años de edad de las mujeres nacidas entre 1953-1957 y entre 1968-1972, según entidad federativa

Entidad federativa	Generación 1968-1972		Generación 1953-1957	
	20 años	25 años	20 años	25 años
Nacional				
Aguascalientes	6.6	14.8	7.5	14.3
Baja California	8.8	18.3	9.8	11.0
Baja California Sur	8.8	19.2	10.0	15.7
Campeche	6.7	13.2	5.2	9.1
Coahuila	11.7	21.3	13.4	19.7
Colima	9.0	17.4	9.1	14.5
Chiapas	4.1	5.9	3.3	3.8
Chihuahua	11.8	22.5	8.3	17.1
Distrito Federal	9.4	23.7	6.3	13.5
Durango	8.3	19.0	9.8	16.1
Guanajuato	7.9	14.5	6.2	9.7
Guerrero	7.0	11.8	5.9	9.5
Hidalgo	14.5	25.9	10.5	18.4
Jalisco	5.7	16.6	7.1	16.8
México	7.5	19.3	11.1	19.3
Michoacán	6.6	10.6	4.7	8.9
Morelos	6.0	14.4	9.2	15.9
Nayarit	9.3	14.6	8.0	13.0
Nuevo León	7.1	18.1	5.8	11.4
Oaxaca	5.9	13.7	3.8	7.2
Puebla	7.3	16.0	7.2	13.4
Querétaro	13.0	23.3	9.8	15.1
Quintana Roo	9.4	15.3	7.2	12.0
San Luis Potosí	11.3	21.2	10.3	16.0
Sinaloa	2.2	6.3	4.2	6.5
Sonora	10.7	19.2	9.0	15.4
Tabasco	3.5	7.0	4.3	7.1
Tamaulipas	6.3	15.7	6.9	12.2
Tlaxcala	10.5	22.4	12.1	21.2
Veracruz	7.3	16.4	3.7	11.3
Yucatán	5.9	13.1	5.7	8.7
Zacatecas	6.1	13.9	4.6	9.2


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Peso de los embarazos premaritales en la
probabilidad de tener el primer hijo(a)
antes de los 20 años por entidad federativa
(generación 1968-1972)

Entidad	1997
Nacional	24.3
Aguascalientes	25.5
Baja California	28.6
Baja California Sur	26.4
Campeche	16.8
Coahuila	32.6
Colima	28.1
Chiapas	8.3
Chihuahua	33.3
Distrito Federal	48.5
Durango	23.9
Guanajuato	26.0
Guerrero	15.7
Hidalgo	35.1
Jalisco	22.8
México	26.4
Michoacán	18.9
Morelos	17.9
Nayarit	21.8
Nuevo León	28.0
Oaxaca	13.8
Puebla	20.7
Querétaro	40.2
Quintana Roo	27.3
San Luis Potosí	30.0
Sinaloa	7.1
Sonora	35.3
Tabasco	8.6
Tamaulipas	22.0
Tlaxcala	27.3
Veracruz	21.7
Yucatán	19.2
Zacatecas	19.2

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de
Población con base en la ENADID, 1997.

Peso de los embarazos premaritales en la probabilidad de tener el primer hijo(a) antes de los 20 años por entidad federativa (generación 1968-1972)



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS

Promedio del número ideal de hijos e hijas de las mujeres
unidas en edad fértil, según características
seleccionadas, 1976, 1987, y 1997

Características	1976	1987	1997
Total	4.5	3.3	3.2
Grupo de edad			
15-19	3.9	2.8	2.7
20-24	3.7	2.9	2.8
25-29	4.2	3.1	2.9
30-34	4.6	3.3	3.1
35-39	5.0	3.8	3.4
40-44	5.3	3.8	3.6
45-49	5.5	4.1	4.0
Escolaridad			
Sin escolaridad	5.3	4.5	4.3
Primaria incompleta	4.8	3.6	3.8
Primaria completa	3.9	3.1	3.3
Secundaria y más	3.4	2.7	2.7
Lugar de residencia			
Rural	5.0	4.0	3.8
Urbano	4.2	3.0	3.0
Condición de habla de lengua indígena			
Habla	n.d.	n.d.	3.9
No habla	n.d.	n.d.	3.1

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la EMF, 1976; la ENFES, 1987; y la ENADID, 1997.

Promedio del número ideal de hijos e hijas y
paridad de las mujeres unidas en edad fértil,
según características seleccionadas, 1997

Características	Ideal	Paridad
Total	3.2	3.1
Grupo de edad		
15-19	2.7	0.8
20-24	2.8	1.5
25-29	2.9	2.2
30-34	3.1	3.0
35-39	3.4	3.7
40-44	3.6	4.4
45-49	4.0	5.2
Escolaridad		
Sin escolaridad	4.3	5.3
Primaria incompleta	3.8	4.3
Primaria completa	3.3	3.1
Secundaria y más	2.7	2.1
Lugar de residencia		
Rural	3.8	3.9
Urbano	3.0	2.8
Condición de habla de lengua indígena		
Habla	3.9	4.1
No habla	3.1	3.0

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la
ENADID, 1997.

Distribución porcentual de las mujeres unidas
en edad fértil por número ideal de hijos e hijas, según paridad, 1997


Paridad	Número ideal de hijos/as					
	0	1	2	3	4	5 y más
Total	1.4	4.5	34.2	29.0	17.3	13.6
0	1.8	10.0	49.6	26.8	8.4	3.5
1	0.7	9.8	51.0	28.7	6.6	3.2
2	1.0	3.0	48.6	29.6	13.5	4.4
3	1.4	3.7	17.4	48.8	19.2	9.5
4	1.4	2.4	23.7	12.5	44.3	15.8
5 y más	2.5	1.9	19.3	19.1	15.8	41.5

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Promedio del número ideal de hijos e hijas de
las mujeres en edad fértil por entidad federativa,
1997


Entidad	Promedio
Nacional	3.2
Aguascalientes	3.7
Baja California	2.9
Baja California Sur	2.9
Campeche	3.3
Coahuila	3.3
Colima	3.1
Chiapas	3.4
Chihuahua	3.1
Distrito Federal	2.5
Durango	3.7
Guanajuato	3.6
Guerrero	3.7
Hidalgo	3.3
Jalisco	3.7
México	2.8
Michoacán	3.5
Morelos	2.8
Nayarit	3.4
Nuevo León	3.2
Oaxaca	3.1
Puebla	3.4
Querétaro	3.4
Quintana Roo	3.2
San Luis Potosí	3.7
Sinaloa	3.5
Sonora	3.2
Tabasco	3.4
Tamaulipas	3.0
Tlaxcala	2.9
Veracruz	3.0
Yucatán	3.4
Zacatecas	4.0

Promedio del número ideal de hijos e hijas de las mujeres en edad fértil por entidad federativa, 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que no desea otro hijo(a) según paridad (incluye embarazo actual), lugar de residencia y condición de habla de lengua indígena, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres en edad fértil
unidas que no desea otro hijo(a) por
entidad federativa, 1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	62.3
Aguascalientes	53.5
Baja California Sur	62.4
Bja California	66.1
Campeche	55.7
Coahuila	60.8
Colima	61.1
Chiapas	61.3
Chihuahua	63.0
Distrito Federal	67.9
Durango	60.3
Guanajuato	56.3
Guerrero	61.5
Hidalgo	62.9
Jalisco	55.9
México	71.4
Michoacán	59.8
Morelos	68.9
Nayarit	62.0
Nuevo León	57.2
Oaxaca	59.3
Puebla	62.1
Querétaro	53.9
Quintana Roo	59.3
San Luis Potosí	61.1
Sinaloa	54.2
Sonora	61.0
Tabasco	62.3
Tamaulipas	58.9
Tlaxcala	65.0
Veracruz	63.2
Yucatán	64.8
Zacatecas	49.4

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que no desea otro hijo(a) por entidad federativa, 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

PRÁCTICAS ANTICONCEPTIVAS

Porcentaje mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo,
según características seleccionadas, 1976-1997


	1976	1987	1992	1997
Total	89.0	92.9	94.9	96.6
Grupos de Edad				
15-19	79.8	89.8	90.9	93.4
20-24	88.8	94.0	96.1	96.8
25-29	93.1	95.2	97.1	98.2
30-34	91.3	94.3	97.5	97.9
35-39	89.7	92.6	95.9	97.4
40-44	86.1	93.3	95.4	97.4
45-49	85.9	92.5	93.1	95.8
Paridad				
0	86.6	91.3	92.5	94.1
1	89.7	94.3	96.7	98.2
2	91.8	95.5	97.8	99.0
3	91.3	95.2	97.6	98.8
4 y más	88.6	92.4	94.7	96.5
Escolaridad				
Sin escolaridad	73.7	72.9	79.5	82.4
Primaria incompleta	88.9	90.3	92.7	93.8
Primaria completa	95.6	95.4	95.1	95.8
Secundaria y más	99.1	98.9	98.7	99.4
Lugar de residencia				
Rural	78.6	83.1	86.5	90.0
Urbano	95.8	96.4	97.7	98.5
Condición de habla de lengua indígena				
Habla	n.d.	n.d.	n.d.	79.5
No habla	n.d.	n.d.	n.d.	97.8

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF, 1976; ENFES, 1987; ENADID, 1992 y 1997.

Porcentaje de mujeres en edad fértil que declara conocer la existencia de distintos métodos anticonceptivos, 1976, 1992 y 1997

	1976	1992	1997
Pastillas	82.3	91.8	93.6
DIU	73.6	85.8	89.7
Inyecciones	67.1	85.0	88.6
OTB	67.5	86.7	89.4
Vasectomía	38.2	70.4	81.0
Condón	41.4	79.9	90.0
Locales	46.0	55.3	59.0
Ritmo	48.3	62.2	68.6
Retiro	44.9	41.7	53.4

Porcentaje de mujeres en edad fértil que declara conocer la existencia de distintos métodos anticonceptivos, 1976, 1992 y 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.

Porcentaje de mujeres en edad fértil que declara conocer la existencia de distintos métodos anticonceptivos por lugar de residencia, 1992 y 1997

Método	1992			1997		
	Lugar de residencia			Lugar de residencia		
	Total	Rural	Urbano	Total	Rural	Urbano
Pastillas	91.8	81.4	95.2	93.6	84.7	96.2
DIU	85.8	70.5	90.8	89.7	78.3	93.0
Inyecciones	85.0	73.6	88.8	88.6	79.2	91.3
Norplant	6.4	2.3	7.8	14.8	7.5	16.9
OTB	86.7	73.9	90.9	89.4	79.4	92.3
Vasectomía	70.4	45.5	78.6	81.0	61.8	86.6
Condomes	79.9	54.6	88.3	90.0	74.1	94.6
Espermicidas	55.3	30.1	63.6	59.0	33.9	66.2
Ritmo	62.2	38.2	70.2	68.6	45.4	75.3
Retiro	41.7	23.1	47.9	53.4	34.3	59.0

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1992 y 1997.

Porcentaje de mujeres en edad fértil que no conoce algún método anticonceptivo según escolaridad, lugar de residencia y condición de habla de lengua indígena, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres en edad fértil que
conoce al menos un método
anticonceptivo por entidad federativa,
1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	96.6
Aguascalientes	98.5
Baja California	98.5
Baja California Sur	99.5
Campeche	97.2
Coahuila	99.1
Colima	99.4
Chiapas	87.2
Chihuahua	98.6
Distrito Federal	99.2
Durango	98.5
Guanajuato	96.2
Guerrero	88.4
Hidalgo	93.9
Jalisco	96.9
México	97.0
Michoacán	96.2
Morelos	99.3
Nayarit	97.7
Nuevo León	99.0
Oaxaca	86.3
Puebla	94.4
Querétaro	97.0
Quintana Roo	98.1
San Luis Potosí	96.7
Sinaloa	99.6
Sonora	99.3
Tabasco	98.1
Tamaulipas	98.5
Tlaxcala	98.6
Veracruz	97.8
Yucatán	95.3
Zacatecas	97.4

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con
base en la ENADID, 1997

Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo por entidad federativa, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que usa métodos anticonceptivos, 1976-2000



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que nunca ha usado métodos anticonceptivos, 1979-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que usan métodos
anticonceptivos, según características seleccionadas, 1976-1997


	1976	1987	1992	1997
Total	30.2	52.7	63.1	68.5
Grupos de edad				
15-19	14.2	30.2	36.4	45.0
20-24	26.7	46.9	55.4	59.3
25-29	38.6	54.0	65.7	67.8
30-34	38.0	62.3	70.1	75.4
35-39	37.9	61.3	72.6	76.1
40-44	25.1	60.2	67.4	74.5
45-49	11.8	34.2	50.5	61.4
Paridad				
0	6.5	15.3	20.7	23.9
1	27.2	50.5	56.6	59.8
2	39.1	60.0	71.0	75.4
3	38.4	67.5	75.0	80.6
4 y más	29.6	51.3	62.6	70.4
Nivel de escolaridad				
Sin escolaridad	12.8	23.7	38.2	48.0
Primaria incompleta	25.5	44.8	56.4	61.3
Primaria completa	40.3	62.0	66.7	69.8
Secundaria y más	55.8	69.9	73.6	74.8
Lugar de residencia				
Rural	13.7	32.5	44.6	53.6
Urbano	42.1	61.5	70.1	73.3
Condición de habla de lengua indígena				
Habla	n.d.	n.d.	n.d.	48.3
No habla	n.d.	n.d.	n.d.	70.2

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF, 1976; ENFES, 1987; ENADID, 1992 y 1997.


Porcentaje de mujeres unidas en
edad fértil que usa métodos
anticonceptivos por grupos de edad,
1992 y 1997

	1992	1997
15-19	36.4	45.0
20-24	55.4	59.3
25-29	65.7	67.8
30-34	70.1	75.4
35-39	72.6	76.1
40-44	67.4	74.5
45-49	50.5	61.4

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1992 y 1997.




Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que usa métodos anticonceptivos por lugar de residencia, 1976-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que usa métodos anticonceptivos por paridad y lugar de residencia, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que usa métodos
anticonceptivos por entidad federativa, 1992, 1997 y 2000

Entidad	1992	1997	2000
Nacional	63.1	68.5	70.8
Aguascalientes	57.5	63.5	67.4
Baja California	73.7	74.1	75.6
Baja California Sur	77.2	77.1	78.3
Campeche	60.8	71.6	74.1
Coahuila	73.5	75.3	77.6
Colima	70.2	73.7	75.8
Chiapas	49.9	53.5	57.1
Chihuahua	71.0	74.1	76.1
Distrito Federal	75.9	78.1	78.8
Durango	58.6	67.4	70.2
Guanajuato	53.5	54.6	59.1
Guerrero	46.9	47.4	51.8
Hidalgo	60.2	63.2	66.3
Jalisco	59.6	66.7	69.7
México	71.1	75.4	77.3
Michoacán	55.8	60.9	64.3
Morelos	66.5	73.8	75.7
Nayarit	70.3	74.0	76.1
Nuevo León	75.4	73.6	75.3
Oaxaca	46.3	55.1	58.5
Puebla	49.5	59.4	62.8
Querétaro	50.3	61.1	64.3
Quintana Roo	62.6	69.9	72.6
San Luis Potosí	51.9	60.6	64.4
Sinaloa	70.9	77.4	79.0
Sonora	70.4	76.0	77.9
Tabasco	66.9	68.7	71.5
Tamaulipas	66.8	72.4	74.6
Tlaxcala	57.9	72.1	75.4
Veracruz	59.9	70.3	73.0
Yucatán	56.2	70.5	72.8
Zacatecas	57.4	68.3	71.4

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas..

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que usa métodos anticonceptivos por entidad federativa, 1992, 1997 y 2000




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que
nunca ha usado métodos anticonceptivos por
entidad federativa, 1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	16.3
Aguascalientes	14.7
Baja California	8.8
Baja California Sur	9.5
Coahuila	9.0
Colima	9.7
Campeche	13.3
Chiapas	33.2
Chihuahua	10.3
Distrito Federal	9.0
Durango	16.0
Guanajuato	26.0
Guerrero	35.4
Hidalgo	22.6
Jalisco	15.0
México	12.7
Michoacán	21.8
Morelos	11.1
Nayarit	12.2
Nuevo León	10.0
Oaxaca	31.5
Puebla	27.0
Querétaro	22.5
Quintana Roo	14.1
San Luis Potosí	19.9
Sinaloa	8.4
Sonora	9.8
Tabasco	14.7
Tamaulipas	9.6
Tlaxcala	13.3
Veracruz	14.3
Yucatán	12.3
Zacatecas	14.7

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que nunca ha usado métodos anticonceptivos por entidad federativa, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil, usuarias de anticonceptivos, según tipo de método,
1976-1997

Años	Pastillas	DIU	Oclusión tubaria bilateral	Vasectomía	Inyecciones	Locales	Métodos tradicionales
1976	35.9	18.7	8.9	0.6	5.6	7.0	23.3
1979	33.0	16.1	23.5	0.6	6.7	5.0	15.1
1982	29.7	13.8	28.1	0.7	10.6	4.1	13.0
1987	18.2	19.4	36.2	1.5	5.3	4.7	14.7
1992	15.3	17.7	43.3	1.4	5.1	5.0	12.2
1995	12.7	22.3	41.4	0.9	4.6	5.0	13.1
1997	10.0	20.8	44.7	1.8	4.6	5.8	12.3

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas..

Distribución porcentual de mujeres unidas en edad fértil, usuarias de
anticonceptivos, según tipo de método, 1976-1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil usuarias de
anticonceptivos por tipo de método, según lugar de residencia, 1992 y 1997

Método	1992			1997		
	Total	Lugar de residencia		Total	Lugar de residencia	
		Rural	Urbano		Rural	Urbano
Pastillas	15.3	19.5	14.4	10.0	10.8	9.9
DIU	17.7	12.9	18.8	20.8	20.5	20.9
Inyecciones	5.1	6.8	4.7	4.6	5.8	4.3
Locales	0.5	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2
Condomes	4.6	3.9	4.7	5.5	4.0	5.8
OTB	43.3	41.2	43.8	44.7	43.4	45.0
Vasectomía	1.4	0.4	1.6	1.8	0.5	2.1
Naturales	12.2	15.2	11.5	12.3	15.0	11.7
Norplant	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1992 y 1997.

Distribución porcentual de las mujeres unidas usuarias de anticonceptivos por tipo de participación del varón y lugar de residencia, 1992 y 1997



Nota: Participación directa = Condón, vasectomía y retiro.

Participación indirecta = Locales y ritmo.

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1992 y 1997.

Distribución porcentual de las usuarias de métodos anticonceptivos, según tipo de método por entidad federativa, 1997

	Pastillas	DIU	Inyecciones	Espemicidas	Condomes	OTB	Vasectomía	Naturales	Norplant
Aguascalientes	12.4	20.4	3.2	0.2	11.4	32.7	1.2	18.6	0.0
Baja California	17.0	11.3	7.1	0.6	6.4	46.5	2.9	7.7	0.6
Baja California Sur	12.9	18.1	4.9	0.0	3.6	52.5	2.3	4.2	1.5
Campeche	9.9	10.3	7.1	0.0	2.9	52.9	0.8	16.2	0.0
Coahuila	14.1	17.1	4.8	0.3	4.9	48.2	1.1	9.4	0.1
Colima	9.6	22.9	3.7	0.1	4.0	48.8	1.2	9.7	0.1
Chiapas	7.4	15.3	6.6	0.1	3.7	55.7	0.9	10.3	0.0
Chihuahua	19.4	22.9	4.2	0.2	4.0	40.9	2.0	6.4	0.0
Distrito Federal	8.3	24.4	4.3	0.4	6.8	43.8	3.6	8.2	0.2
Durango	15.0	21.2	4.9	0.1	5.6	43.4	1.0	8.9	0.1
Guanajuato	8.1	19.9	3.2	0.3	7.0	38.5	1.5	21.6	0.0
Guerrero	7.1	16.9	9.3	0.1	5.5	52.6	0.8	7.8	0.0
Hidalgo	5.2	24.2	5.5	0.1	4.1	48.0	1.2	11.6	0.0
Jalisco	14.5	13.6	2.5	0.1	10.5	38.3	1.6	18.8	0.0
México	5.9	27.2	4.3	0.2	5.4	41.9	2.8	12.3	0.1
Michoacán	9.7	20.1	4.4	0.1	6.0	42.3	1.4	16.0	0.0
Morelos	7.1	18.9	5.3	0.0	6.3	50.2	1.8	10.3	0.1
Nayarit	13.8	19.0	6.5	0.0	5.0	49.5	0.5	5.4	0.2
Nuevo León	9.7	25.8	3.0	0.4	6.1	43.3	1.8	9.9	0.0
Oaxaca	4.8	17.8	6.7	0.0	2.7	45.6	0.7	21.4	0.2
Puebla	4.6	24.3	5.0	0.0	5.1	41.2	1.7	18.1	0.0
Querétaro	5.8	23.2	2.7	0.4	7.2	44.5	2.2	14.0	0.0
Quintana Roo	11.7	14.2	6.7	0.3	5.0	44.7	2.3	14.9	0.0
San Luis Potosí	12.5	26.8	4.0	0.3	4.9	37.3	1.1	13.1	0.0
Sinaloa	17.0	20.6	2.3	0.0	2.3	51.8	1.0	5.0	0.0
Sonora	19.8	17.9	3.9	0.1	4.3	45.3	1.9	6.9	0.0
Tabasco	7.0	10.0	10.8	0.1	2.9	53.0	1.3	14.8	0.0
Tamaulipas	16.1	16.1	7.1	0.5	6.0	42.7	0.7	10.8	0.0
Tlaxcala	4.6	23.2	4.2	0.1	5.4	36.5	1.5	24.5	0.0
Veracruz	7.6	18.8	4.0	0.0	3.5	53.6	0.7	11.8	0.0
Yucatán	15.4	8.6	3.0	0.0	2.6	44.9	1.5	24.0	0.0
Zacatecas	11.4	30.8	2.1	0.2	7.0	36.0	0.6	11.9	0.0


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población, con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usa cada método anticonceptivo por entidad federativa, 1992 y 1997

Entidad Federativa	Quirúrgicos			DIU			Hormonales			Locales			Tradicionales		
	1992	1997	Incremento	1992	1997	Incremento	1992	1997	Incremento	1992	1997	Incremento	1992	1997	Incremento
Aguascalientes	19.2	21.0	1.8	12.6	12.7	0.1	11.0	10.3	-0.7	4.8	7.3	2.5	10.0	12.2	2.3
Baja California	29.6	35.5	5.9	7.4	8.7	1.3	22.8	18.7	-4.1	5.1	5.1	0.0	8.7	6.0	-2.7
Baja California Sur	40.0	41.2	1.2	9.3	13.9	4.7	20.1	15.6	-4.5	3.7	2.9	-0.8	4.2	3.5	-0.7
Campeche	30.0	37.2	7.1	4.4	7.4	3.0	19.5	12.9	-6.7	0.8	2.1	1.3	6.1	12.1	6.0
Chiapas	23.4	29.5	6.1	3.9	8.3	4.4	11.6	8.0	-3.6	1.2	1.8	0.6	9.8	5.8	-4.0
Chihuahua	25.4	30.7	5.3	14.1	17.0	3.0	23.2	18.1	-5.2	3.7	3.2	-0.5	4.6	5.1	0.5
Coahuila	36.8	37.0	0.2	9.9	12.6	2.7	19.8	14.3	-5.5	2.5	3.9	1.4	4.6	7.5	2.9
Colima	33.3	36.6	3.3	13.7	16.5	2.8	13.9	9.8	-4.0	3.8	3.2	-0.6	5.5	7.6	2.1
Distrito Federal	34.2	38.2	4.0	18.4	18.8	0.4	12.2	9.7	-2.5	3.8	4.7	0.9	7.4	6.8	-0.6
Durango	23.3	29.0	5.8	9.5	14.2	4.7	16.8	13.8	-3.0	3.6	4.0	0.4	5.4	6.3	0.9
Guanajuato	19.8	21.2	1.4	7.9	10.8	3.0	10.1	6.3	-3.9	4.0	3.9	0.0	11.8	12.3	0.5
Guerrero	20.1	24.7	4.6	7.0	8.0	1.0	11.4	8.0	-3.3	1.8	2.8	1.0	6.7	3.9	-2.7
Hidalgo	28.9	31.2	2.3	12.6	14.7	2.0	7.3	6.9	-0.4	2.3	2.7	0.4	9.0	7.7	-1.3
Jalisco	22.4	25.9	3.5	9.0	8.7	-0.3	12.5	11.5	-1.0	4.9	7.3	2.5	10.9	13.3	2.4
México	33.9	33.1	-0.8	17.0	20.1	3.1	10.1	8.1	-2.0	3.1	4.0	1.0	7.0	10.1	3.0
Michoacán	20.7	25.4	4.7	8.7	12.6	3.9	12.1	8.9	-3.3	3.7	3.9	0.2	10.6	10.1	-0.5
Morelos	32.0	37.1	5.1	13.6	14.6	0.9	11.6	9.2	-2.4	3.5	4.8	1.3	5.8	8.1	2.3
Nayarit	32.8	36.5	3.6	10.8	14.0	3.1	19.0	15.5	-3.5	4.0	3.9	-0.1	3.6	4.1	0.5
Nuevo León	34.4	32.8	-1.7	16.9	18.7	1.8	10.7	9.6	-1.1	4.5	5.0	0.5	8.9	7.5	-1.5
Oaxaca	17.3	24.2	6.9	5.2	10.1	4.9	8.7	6.7	-2.0	2.4	1.4	-1.1	12.7	12.7	0.0
Puebla	23.0	25.0	2.0	7.6	14.5	7.0	7.1	5.7	-1.4	2.5	2.8	0.4	9.4	11.3	1.9
Querétaro	21.1	28.1	7.0	11.8	14.3	2.5	7.6	5.4	-2.2	2.8	4.4	1.6	7.1	8.8	1.7
Quintana Roo	26.9	32.2	5.3	5.5	10.1	4.7	20.8	12.6	-8.2	2.8	3.6	0.8	6.6	11.3	4.7
San Luis Potosí	16.4	22.7	6.3	13.3	16.4	3.0	12.7	10.4	-2.3	2.9	3.1	0.2	6.6	8.0	1.4
Sinaloa	35.1	40.0	4.8	8.4	15.7	7.3	21.4	15.8	-5.6	2.8	2.0	-0.8	3.2	4.0	0.8
Sonora	31.8	34.9	3.2	12.1	13.7	1.5	18.6	18.4	-0.2	4.1	3.3	-0.8	3.9	5.7	1.8
Tabasco	32.6	36.8	4.2	5.0	6.7	1.7	16.5	12.3	-4.2	1.4	2.1	0.7	11.4	10.8	-0.6
Tamaulipas	31.9	31.4	-0.5	8.2	11.5	3.3	18.5	16.8	-1.7	2.9	4.5	1.6	5.2	8.2	2.9
Tlaxcala	21.7	26.2	4.5	15.0	17.1	2.1	8.0	6.4	-1.6	2.7	3.8	1.1	10.5	18.5	8.0
Veracruz	30.6	37.4	6.8	8.4	13.0	4.6	12.1	8.4	-3.6	1.8	2.4	0.5	7.0	9.1	2.1
Yucatán	22.0	31.4	9.4	3.0	6.2	3.1	18.5	13.4	-5.0	1.4	1.8	0.4	11.3	17.7	6.4
Zacatecas	19.4	24.4	5.0	13.9	21.2	7.3	11.5	9.0	-2.5	3.7	5.0	1.4	9.0	8.7	-0.3

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población, con base en la ENADID, 1992 y 1997.

Distribución porcentual de las mujeres en edad fértil usuarias de anticonceptivos, según lugar de obtención, 1992 y 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1992 y 1997.

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil, usuarias de anticonceptivos modernos, por lugar de obtención, según lugar de residencia, 1992 y 1997

	1992			1997		
Fuente de obtención del						
método anticonceptivo	Total	Rural	Urbano	Total	Rural	Urbano
IMSS/IMSS Sol	41.5	40.3	41.8	41.4	37.4	42.3
ISSSTE	4.3	1.9	4.9	4.5	2.1	5.1
SSA	15.0	27.8	12.2	19.6	39.5	15.3
Otro público	5.9	5.1	6.1	6.7	5.8	6.9
Farmacia	18.5	14.7	19.4	13.5	6.4	15.0
Otro	14.7	10.3	15.7	14.2	8.6	15.4


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: ENADID, 1992 y 1997.

Porcentaje de mujeres usuarias de métodos
modernos que obtuvieron el método en el sector
público, según entidad federativa, 1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	72.3
Aguascalientes	69.8
Baja California	56.3
Baja California Sur	78.7
Campeche	79.9
Coahuila	75.6
Colima	81.5
Chiapas	78.3
Chihuahua	67.5
Distrito Federal	61.2
Durango	80.1
Guanajuato	70.7
Guerrero	76.1
Hidalgo	76.0
Jalisco	68.1
México	75.3
Michoacán	73.2
Morelos	72.1
Nayarit	83.8
Nuevo León	75.3
Oaxaca	79.3
Puebla	68.8
Querétaro	70.2
Quintana Roo	68.5
San Luis Potosí	76.6
Sinaloa	74.2
Sonora	67.8
Tabasco	78.0
Tamaulipas	64.6
Tlaxcala	79.7
Veracruz	81.2
Yucatán	71.7
Zacatecas	86.4

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población
con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres usuarias de métodos modernos que obtuvieron el método en el sector público, según entidad federativa, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil
usuarias de anticonceptivos modernos por tipo de
método, según sector de obtención, 1997

Método empleado	1997	
	Sector público	Sector privado
Total	72.3	27.7
Pastillas	41.3	58.7
DIU	86.1	13.9
Inyecciones	33.4	66.6
Locales	0.4	99.6
Condomes	37.9	65.1
OTB	81.2	18.8
Vasectomía	84.7	15.3
Norplant	62.6	37.4

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1997.

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil usuarias de anticonceptivos, según el momento de adopción del método, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres en edad fértil, usuarias de anticonceptivos, que inició el uso del método en el posparto, por entidad federativa, 1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	46.5
Aguascalientes	37.7
Baja California	40.4
Baja California Sur	51.5
Campeche	46.5
Coahuila	51.8
Colima	53.1
Chiapas	43.7
Chihuahua	46.6
Distrito Federal	46.6
Durango	41.0
Guanajuato	42.3
Guerrero	48.9
Hidalgo	51.4
Jalisco	37.8
México	51.1
Michiacán	42.5
Morelos	48.8
Nayarit	48.9
Nuevo León	54.4
Oaxaca	42.9
Puebla	42.4
Querétaro	44.8
Quintana Roo	46.0
San Luis Potosí	45.5
Sinaloa	47.1
Sonora	44.0
Tabasco	47.0
Tamaulipas	47.1
Tlaxcala	40.5
Veracruz	47.4
Yucatán	42.0
Zacatecas	50.0


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres en edad fértil, usuarias de anticonceptivos, que inició el uso del método en el posparto, por entidad federativa, 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres atendidas en el sector público que recibió información sobre planificación familiar durante la atención prenatal (último o penúltimo nacimiento), 1994-1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres que recibió información sobre
planificación familiar durante la atención prenatal, por entidad
federativa, 1994-1997
(último o penúltimo nacimiento atendido en el sector público)

Entidad	Hablaron sobre planificación familiar	Ofrecieron método posparto
Nacional	80.8	66.9
Aguascalientes	80.1	72.6
Baja California	75.8	59.7
Baja California Sur	90.5	72.9
Campache	89.6	79.6
Coahuila	85.4	70.8
Colima	85.3	73.8
Chiapas	86.4	73.1
Chihuahua	86.9	74.4
Distrito Federal	83.5	71.3
Durango	80.6	69.0
Guanajuato	70.3	63.1
Guerrero	75.0	55.1
Hidalgo	81.6	67.1
Jalisco	79.1	65.9
México	78.1	57.4
Michoacán	72.8	57.2
Morelos	78.9	60.5
Nayarit	83.2	66.9
Nuevo León	91.6	84.7
Oaxaca	74.7	64.4
Puebla	77.3	61.1
Querétaro	77.7	69.6
Quintana Roo	86.6	78.2
San Luis Potosí	81.7	70.3
Sinaloa	87.0	65.4
Sonora	79.1	67.4
Tabasco	83.7	70.7
Tamaulipas	81.0	67.2
Tlaxcala	79.3	66.0
Veracruz	81.7	68.4
Yucatán	85.3	76.6
Zacatecas	86.2	68.3


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la
ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres que recibió información sobre planificación familiar durante la atención prenatal, por entidad federativa, 1994-1997 (último o penúltimo nacimiento atendido en el sector público)



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Demanda total, demanda satisfecha y demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos de las mujeres en edad fértil unidas, 1987 y 1997




Fuente: estimaciones de Consejo Nacional de Población con base en la ENFES, 1987, y la ENADID, 1997.

Demanda insatisfecha de planificación familiar de las mujeres en edad fértil unidas, según

Características de la madre	1987			1997		
	Total	Espaciar	Limitar	Total	Espaciar	Limitar
Total	25.1	12.1	13.0	12.1	6.9	5.2
Grupos de edad						
15-19	33.8	27.2	6.6	26.7	23.8	2.9
20-24	31.3	21.1	10.2	21.1	17.0	4.1
25-29	31.4	15.8	15.6	14.7	9.0	5.7
30-34	23.5	8.1	15.4	10.3	4.4	5.9
35-39	23.7	8.1	15.6	9.3	2.6	6.7
40-44	15.5	3.1	12.4	6.6	1.0	5.6
45-49	9.7	1.2	8.5	3.2	0.3	2.9
Paridad						
0	8.3	8.1	0.2	11.8	10.9	0.9
1	25.8	22.4	3.4	17.3	15.3	2.0
2	21.4	12.8	8.6	10.6	6.6	4.0
3	22.0	11.7	10.3	8.6	4.1	4.5
4 y más	30.2	9.1	21.1	12.8	3.5	9.3
Lugar de residencia						
Rural	45.7	23.7	22.0	22.2	12.8	9.4
Urbana	15.9	6.9	9.0	8.9	5.0	3.9
Escolaridad						
Sin escolaridad	45.8	20.6	25.2	21.8	9.3	12.5
Primaria incompleta	32.7	15.1	17.6	16.9	8.8	8.1
Primaria completa	17.8	9.1	8.7	12.4	7.7	4.7
Secundaria y más	10.4	6.2	4.2	8.0	5.2	2.8
Condición de habla de lengua indígena						
Habla	n.d.	n.d.	n.d.	25.8	14.6	11.3
No habla	n.d.	n.d.	n.d.	11.0	6.3	4.7

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENFES, 1987, y la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres unidas con demanda insatisfecha de anticonceptivos, según lugar de residencia, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas con
demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos
por entidad federativa, 1997

Entidad	Espaciar	Limitar
Nacional	6.9	5.2
Aguascalientes	7.4	6.3
Baja California	4.9	3.8
Baja California Sur	4.4	2.0
Campeche	5.9	2.9
Coahuila	4.5	2.5
Colima	4.0	2.9
Chiapas	11.8	9.0
Chihuahua	4.0	3.4
Distrito Federal	3.9	2.4
Durango	9.4	5.1
Guanajuato	10.9	8.1
Guerrero	14.5	11.3
Hidalgo	9.1	7.2
Jalisco	6.5	3.6
México	4.6	5.1
Michoacán	9.7	7.8
Morelos	5.9	5.1
Nayarit	4.8	2.9
Nuevo León	4.5	1.4
Oaxaca	12.4	8.7
Puebla	9.6	9.8
Querétaro	9.9	8.2
Quintana Roo	7.7	4.4
San Luis Potosí	9.7	8.5
Sinaloa	4.4	2.3
Sonora	4.3	2.5
Tabasco	6.5	5.5
Tamaulipas	5.2	3.3
Tlaxcala	5.8	5.2
Veracruz	7.7	5.0
Yucatán	5.6	3.1
Zacatecas	6.5	4.9

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con
base en la ENADID, 1997.


Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas con demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos por entidad federativa, 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.


SALUD MATERNA

Tasa de mortalidad materna, 1985-1997




Fuente: SSA/DGEI; Mortalidad 1985-1997

Distribución porcentual de las muertes maternas por grupos de edad, 1989-1991 y 1995-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.

Distribución porcentual de las muertes maternas según causa, 1989-1991 y 1995-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.


Tasa de mortalidad materna por entidad
federativa, 1997

Entidad	1997
Nacional	4.7
Aguascalientes	3.2
Baja California	1.9
Baja California Sur	4.1
Campeche	4.2
Coahuila	2.1
Colima	4.9
Chiapas	6.3
Chihuahua	4.9
Distrito Fedreal	5.1
Durango	3.1
Guanajuato	3.5
Guerrero	5.3
Hidalgo	4.0
Jalisco	4.3
México	6.2
Michoacán	4.2
Morelos	5.2
Nayarit	5.0
Nuevo león	2.4
Oaxaca	7.5
Puebla	4.7
Querétaro	4.7
Quintana Roo	3.2
San Luis Potosí	4.7
Sinaloa	2.0
Sonora	3.0
Tabasco	5.3
Tamaulipas	3.4
Tlaxcala	8.6
Veracruz	4.2
Yucatán	6.1
Zacatecas	6.0

Fuente: Mortalidad 1997, Secretaría de Salud, Noviembre, 1998


Tasa de mortalidad materna por entidad federativa, 1997

Defunciones por 10 000 nacimientos registrados



Fuente: SSA/DGEI; Mortalidad, 1997.

Tasa global de fecundidad y tasa global de aborto, 1976-1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la EMF, 1976; ENP 1979; END 1982; ENFES 1987; ENPF 1995 y ENADID, 1997.

Porcentaje de mujeres alguna vez embarazadas con
al menos un aborto por entidad federativa, 1992 -
1997

Entidad	1992	1997
Nacional	19.6	19.0
Aguascalientes	25.9	24.3
Baja California	21.2	15.1
Baja California Sur	20.8	17.8
Campeche	22.9	19.7
Coahuila	16.8	21.3
Colima	20.1	20.9
Chiapas	9.5	13.9
Chihuahua	18.3	18.5
Distrito Federal	19.0	19.6
Durango	18.4	20.8
Guanajuato	16.9	21.4
Guerrero	22.2	16.0
Hidalgo	15.2	14.7
Jalisco	29.0	24.8
México	18.5	17.2
Michoacán	18.3	23.9
Morelos	25.7	21.8
Nayarit	19.8	19.7
Nuevo León	22.3	19.1
Oaxaca	9.9	11.7
Puebla	16.4	18.6
Querétaro	17.5	16.8
Quintana Roo	18.6	19.6
San Luis Potosí	22.8	17.0
Sinaloa	16.6	19.6
Sonora	19.6	19.6
Tabasco	20.8	16.2
Tamaulipas	22.5	22.4
Tlaxcala	13.6	16.9
Vercaruz	21.3	19.3
Yucatán	23.1	23.7
Zcatecas	24.9	21.7

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la
ENADID, 1992 y 1997.


Porcentaje de mujeres alguna vez embarazadas con al menos un aborto por entidad federativa, 1992 - 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1992 y 1997.


ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA

Atención prenatal por tipo de agente, 1974-1976, 1985-1987 y 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la EMF, 1976; ENFES, 1987 y ENADID, 1997.

Atención prenatal por tipo de agente, según lugar de residencia, 1985-1987 y 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENFES, 1987 y ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos
nacidos vivos por agente que revisó a la madre durante el embarazo,
según características seleccionadas, 1994 - 1997

	Tipo de agente que brinda la atención prenatal			
	Médico	Enfermera/auxiliar /promotora de	Partera o comadrona	Sin revisión
Total	83.5	2.5	6.2	7.8
Edad de la madre al nacimiento del hijo				
12-19	81.2	3.3	7.7	7.7
20-34	85.0	2.3	5.7	6.9
35-49	75.3	2.1	7.8	14.8
Orden de nacimiento				
1	91.9	2.1	3.3	2.7
2	88.7	2.2	4.3	4.7
3	84.5	2.5	5.9	7.1
4 o más	68.9	3.1	11.4	16.6
Escolaridad				
Sin escolaridad	51.1	3.3	18.4	27.2
Primaria incompleta	67.2	4.4	13.4	15.0
Primaria completa	83.3	3.2	6.1	7.4
Secundaria y más	95.6	1.2	1.3	1.9
Lugar de residencia				
Urbano	90.6	1.4	3.2	4.7
Rural	66.6	5.0	13.3	15.2
Condición de habla de lengua indígena				
Habla	56.1	5.5	15.7	22.7
No habla	86.3	2.2	5.2	6.3


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por tipo de agente que brindó la atención prenatal, según entidad federativa, 1994-1997

Entidad	Médico	Enfermera	Partera	Sin revision
Nacional	83.5	2.5	6.2	7.8
Aguascalientes	92.0	1.5	3.8	2.7
Baja California	95.1	1.0		3.9
Baja California Sur	93.0	1.3	0.5	5.3
Campeche	81.6	1.2	11.3	5.8
Coahuila	95.1	1.1	0.8	3.0
Colima	90.2	2.5	2.8	4.5
Chiapas	53.3	2.5	27.1	17.0
Chihuahua	91.0	4.2	0.9	3.9
Distrito Federal	97.1	0.6	0.1	2.1
Durango	87.9	2.1	2.7	7.3
Guanajuato	82.8	2.3	7.0	7.9
Guerrero	61.4	2.2	16.5	19.9
Hidalgo	80.2	7.1	4.1	8.6
Jalisco	93.1	2.0	0.9	3.9
México	87.3	1.0	2.7	9.0
Michoacán	82.5	1.2	3.9	12.4
Morelos	83.3	1.3	9.4	5.9
Nayarit	89.4	2.2	2.0	6.3
Nuevo León	98.0	0.7	0.2	1.0
Oaxaca	66.5	5.8	8.8	19.0
Puebla	69.3	4.5	16.2	10.0
Querétaro	89.0	1.6	3.0	6.4
Quintana Roo	79.9	2.1	10.5	7.6
San Luis Potosí	81.4	7.6	4.2	6.9
Sinaloa	90.6	1.2	1.5	6.6
Sonora	94.0	0.8	0.8	4.5
Tabasco	82.5	2.4	8.4	6.8
Tamaulipas	90.5	3.0	1.7	4.8
Tlaxcala	84.6	1.5	8.7	5.2
Veracruz	72.7	4.8	13.8	8.8
Yucatán	92.8	1.8	2.5	2.9
Zacatecas	87.6	2.7	5.1	4.7


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por tipo de agente que brindó la atención prenatal, según entidad federativa, 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por lugar de atención del embarazo, según lugar de residencia, 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos
hijos nacidos vivos por trimestre de inicio de la atención prenatal,
según características seleccionadas, 1994 - 1997

		Trimestre de inicio de la atención prenatal		
		1er.	2o.	3er.
Total		74.1	21.4	4.6
Edad de la madre al nacimiento del hijo				
	12-19	67.9	26.3	5.8
	20-34	76.0	20.0	4.1
	35-49	69.9	23.8	6.2
Escolaridad				
	Sin escolaridad	52.6	37.8	9.6
	Primaria incompleta	64.4	27.8	7.8
	Primaria completa	69.6	25.2	5.2
	Secundaria y más	82.2	15.4	2.5
Lugar de residencia				
	Urbano	77.7	18.5	3.8
	Rural	64.6	28.9	6.5
Condición de habla de lengua indígena				
	Habla	57.2	34.0	8.8
	No habla	75.5	20.3	4.2


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos
nacidos vivos por trimestre de inicio de la atención prenatal,
según entidad federativa, 1994-1997

Entidad	1er. trimestre	2o. trimestre	3er. trimestre
Nacional	74.1	21.4	4.6
Aguascalientes	75.9	21.0	3.1
Baja California	82.2	14.7	3.1
Baja California Sur	80.4	16.4	3.2
Campeche	74.2	21.5	4.4
Coahuila	76.3	18.4	5.2
Colima	73.6	21.0	5.4
Chiapas	70.5	24.3	5.2
Chihuahua	78.3	18.7	3.0
Distrito Federal	81.5	14.8	3.6
Durango	73.8	22.2	4.0
Guanajuato	75.2	19.8	5.0
Guerrero	62.3	30.2	7.5
Hidalgo	66.8	26.5	6.7
Jalisco	78.9	19.1	2.0
México	75.9	20.3	3.8
Michoacán	71.8	22.2	5.9
Morelos	76.6	17.6	5.8
Nayarit	75.1	20.9	4.0
Nuevo León	82.8	13.6	3.6
Oaxaca	60.1	30.5	9.4
Puebla	60.3	31.9	7.9
Querétaro	73.1	22.6	4.3
Quintana Roo	79.4	16.9	3.7
San Luis Potosí	70.9	23.6	5.5
Sinaloa	81.6	15.6	2.8
Sonora	78.4	16.8	4.8
Tabasco	73.1	24.9	2.0
Tamaulipas	80.3	16.8	2.9
Tlaxcala	73.1	22.7	4.1
Veracruz	66.4	28.5	5.0
Yucatán	77.1	19.2	3.7
Zacatecas	79.3	17.3	3.3


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por trimestre de inicio de la atención prenatal, según entidad federativa, 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por número de consultas prenatales, según lugar de residencia, 1994-1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Promedio de consultas prenatales de los
últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por
entidad federativa, 1994-1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	6.9
Aguascalientes	6.7
Baja California	7.6
Baja California Sur	7.9
Campeche	7.0
Coahuila	7.8
Colima	7.6
Chiapas	6.0
Chihuahua	7.8
Distrito Federal	8.2
Durango	6.9
Guanajuato	6.6
Guerrero	5.4
Hidalgo	6.1
Jalisco	7.3
México	6.8
Michoacán	6.0
Morelos	7.2
Nayarit	7.1
Nuevo León	8.2
Oaxaca	5.3
Puebla	5.9
Querétaro	6.7
Quintana Roo	7.3
San Luis Potosí	6.3
Sinaloa	7.4
Sonora	8.1
Tabasco	6.2
Tamaulipas	6.9
Tlaxcala	6.2
Veracruz	7.2
Yucatán	7.2
Zacatecas	7.4


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Promedio de consultas prenatales de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por entidad federativa, 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de últimos y penúltimos hijos nacidos vivos a cuyas madres les fueron practicados acciones y exámenes de salud durante las revisiones prenatales, por lugar de residencia, 1994 - 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de últimos y penúltimos hijos nacidos vivos a cuyas madres les fueron practicados acciones y exámenes de salud durante las revisiones prenatales, por entidad federativa, 1994 - 1997

Entidad Federativa	Presión	Peso	Vacuna contra el tétanos
Nacional	92.3	91.4	80.2
Aguascalientes	95.3	94.7	79.9
Baja California	98.1	98.0	75.4
Baja California Sur	97.8	98.6	91.0
Campeche	91.5	90.4	93.2
Coahuila	97.4	98.2	85.5
Colima	97.4	97.1	88.6
Chiapas	72.5	71.8	78.0
Chihuahua	98.5	98.4	77.4
Distrito Federal	97.2	97.3	63.8
Durango	94.4	94.2	89.6
Guanajuato	92.4	90.3	79.0
Guerrero	76.2	71.6	73.1
Hidalgo	93.9	92.2	86.2
Jalisco	97.5	96.9	81.5
México	95.1	93.4	73.8
Michoacán	91.1	90.8	73.8
Morelos	90.3	90.5	83.4
Nayarit	95.2	95.1	90.9
Nuevo León	98.2	99.7	83.3
Oaxaca	86.7	86.4	82.3
Puebla	82.6	79.7	71.8
Querétaro	94.4	94.3	83.9
Quintana Roo	90.6	90.6	88.4
San Luis Potosí	94.1	94.6	85.6
Sinaloa	97.4	97.2	95.8
Sonora	98.6	97.1	84.3
Tabasco	89.1	89.1	92.7
Tamaulipas	96.9	95.1	87.1
Tlaxcala	93.3	89.4	82.5
Veracruz	87.1	85.5	88.4
Yucatán	95.0	96.3	89.2
Zacatecas	95.2	94.1	90.6


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población, con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por agente que atendió el parto, 1974 - 1976, 1985 - 1987 y 1994 - 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la EMF, 1976; ENFES, 1987 y ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por agente que atendió el parto, según lugar de residencia, 1985 - 1987 y 1994 - 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENFES, 1987 y ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos
por agente que atendió el parto, según características seleccionadas, 1994 - 1997

		Tipo de agente que atendió el parto			
		Médico	Enfermera/auxiliar /promotora de	Partera o comadrona	Otro/ella sola
Total		81.5	1.7	13.6	3.3
Edad de la madre al nacimiento del hijo					
	12-19	79.2	2.3	15.7	2.8
	20-34	82.7	1.5	12.7	3.1
	35-49	75.7	1.9	16.7	5.6
Orden de nacimiento					
	1	91.4	1.3	6.3	1.0
	2	87.1	1.5	9.3	2.1
	3	83.3	1.4	12.7	2.7
	4 o más	64.6	2.3	25.9	7.2
Escolaridad					
	Sin escolaridad	46.8	2.5	38.2	12.5
	Primaria incompleta	63.4	2.8	27.7	6.1
	Primaria completa	80.9	2.3	14.5	2.4
	Secundaria y más	95.0	0.8	3.2	1.1
Lugar de residencia					
	Urbano	91.0	1.1	6.2	1.6
	Rural	58.9	2.9	31.0	7.2
Condición de habla de lengua indígena					
	Habla	41.3	3.4	42.5	12.8
	No habla	85.7	1.5	10.5	2.3


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por tipo de agente que atendió el parto, según entidad federativa, 1994-1997

Entidad	Médico	Enfermera	Partera	Otro/Ella sola
Nacional	81.5	1.7	13.6	3.3
Aguascalientes	95.4	1.9	2.3	0.4
Baja California	97.0	1.0	0.3	1.6
Baja California Sur	97.1	0.9	1.0	1.1
Campeche	72.8	1.1	23.1	3.0
Coahuila	94.7	1.7	0.9	2.7
Colima	93.5	1.8	4.0	0.7
Chiapas	44.8	2.1	49.4	3.7
Chihuahua	93.0	2.9	1.7	2.3
Distrito Federal	96.4	1.0	1.1	1.6
Durango	86.4	3.3	8.2	2.0
Guanajuato	83.5	1.7	12.6	2.2
Guerrero	62.2	1.7	28.1	8.1
Hidalgo	72.6	3.8	17.8	5.8
Jalisco	95.8	0.6	2.0	1.6
México	87.5	0.8	7.4	4.2
Michoacán	83.0	0.4	12.7	3.9
Morelos	83.4	1.4	13.7	1.5
Nayarit	87.3	1.5	7.3	4.0
Nuevo León	98.1	0.2	0.8	0.9
Oaxaca	52.3	3.4	31.1	13.2
Puebla	67.4	2.9	26.8	2.9
Querétaro	87.3	0.8	7.2	4.8
Quintana Roo	74.3	2.1	22.3	1.4
San Luis Potosí	74.1	2.6	17.9	5.5
Sinaloa	91.6	1.0	6.3	1.0
Sonora	95.6	1.0	1.9	1.5
Tabasco	63.9	1.6	32.7	1.9
Tamaulipas	94.2	1.5	3.3	1.0
Tlaxcala	85.6	1.2	12.0	1.2
Veracruz	65.8	3.4	27.0	3.8
Yucatán	80.7	1.1	16.6	1.6
Zacatecas	90.1	1.1	7.2	1.6


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por tipo de agente que atendió el parto, según entidad federativa, 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos e hijas nacidos vivos por lugar donde fue atendido el parto, 1974-1976, 1985-1987 y 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la EMF, 1976; ENFES, 1987 y ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por lugar donde fue atendido el parto, según características seleccionadas, 1994 - 1997

		Lugar de atención del parto						
		IMSS/IMSS-Sol.	ISSSTE	SSA	Otras públicas	Sector privado	Casa	Otro /no especificad
Total		32.9	3.3	17.0	8.3	21.3	16.2	1.0
Escolaridad								
	Sin escolaridad	13.9	0.2	18.8	7.4	9.6	48.6	1.4
	Primaria incompleta	21.7	0.8	22.2	8.6	12.6	32.8	1.4
	Primaria completa	33.2	1.6	21.3	7.6	18.5	16.7	1.2
	Secundaria y más	40.4	5.7	12.4	8.7	28.0	4.1	0.7
Lugar de residencia								
	Urbano	38.2	4.3	14.7	9.5	24.8	7.6	0.9
	Rural	20.2	1.1	22.3	5.3	12.8	36.9	1.3
Condición de habla de lengua indígena								
	Habla	18.2	1.0	14.2	4.5	6.7	54.3	1.2
	No habla	34.4	3.6	17.2	8.7	22.8	12.3	1.0


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos
por lugar de atención del parto, según entidad federativa, 1994-1997

Entidad	Sector público	Sector privado	Casa
Nacional	61.5	21.3	16.2
Aguascalientes	78.6	18.1	3.0
Baja California	64.0	33.6	1.1
Baja California Sur	85.9	12.3	1.6
Campeche	64.9	9.3	24.8
Coahuila	86.3	8.8	2.7
Colima	81.5	13.3	4.6
Chiapas	38.2	8.5	51.7
Chihuahua	72.1	23.1	2.7
Distrito Federal	64.6	33.0	2.0
Durango	74.6	15.0	9.7
Guanajuato	57.5	27.0	14.5
Guerrero	43.4	19.5	35.9
Hidalgo	61.3	16.3	21.5
Jalisco	72.8	23.4	3.2
México	62.1	27.4	10.0
Michoacán	52.0	31.1	15.1
Morelos	62.5	22.3	15.1
Nayarit	80.4	9.7	9.1
Nuevo León	76.7	21.6	1.6
Oaxaca	41.7	13.1	44.3
Puebla	39.3	28.0	30.4
Querétaro	70.5	18.5	9.8
Quintana Roo	62.9	13.3	23.5
San Luis Potosí	60.9	15.4	22.7
Sinaloa	68.2	24.2	7.1
Sonora	82.5	14.0	2.9
Tabasco	54.8	10.0	34.6
Tamaulipas	71.0	21.2	4.1
Tlaxcala	57.7	27.2	14.4
Veracruz	57.2	11.4	30.4
Yucatán	67.4	12.7	18.7
Zacatecas	75.1	16.5	8.1

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por lugar de atención del parto, según entidad federativa, 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos
y penúltimos hijos nacidos vivos por tipo de parto,
según características seleccionadas, 1994 - 1997

		Tipo de parto	
		Normal	Cesárea
Total		73.5	26.5
Edad de la madre al nacimiento del hijo			
	12-19	78.6	21.4
	20-34	72.4	27.6
	35-49	73.1	26.9
Lugar de atención del parto			
	IMSS/IMSS-Sol	67.9	32.1
	SSA	80.3	19.7
	Otras públicas	64.5	35.5
	Sector privado	60.0	40.0
Lugar de residencia			
	Urbano	67.8	32.2
	Rural	87.0	13.0


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de últimos y penúltimos hijos
nacidos vivos por cesárea, según entidad
federativa, 1994-1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	26.5
Aguascalientes	26.4
Baja California	32.4
Baja California Sur	37.4
Campeche	23.2
Coahuila	36.7
Colima	33.7
Chiapas	11.0
Chihuahua	33.0
Distrito Federal	42.3
Durango	21.8
Guanajuato	24.6
Guerrero	14.8
Hidalgo	18.8
Jalisco	27.3
México	28.6
Michoacán	22.1
Morelos	27.2
Nayarit	25.9
Nuevo León	48.6
Oaxaca	14.8
Puebla	21.1
Querétaro	26.6
Quintana Roo	28.8
San Luis Potosí	18.6
Sinaloa	31.1
Sonora	30.1
Tabasco	23.1
Tamaulipas	32.5
Tlaxcala	23.1
Veracruz	19.2
Yucatán	28.5
Zacatecas	23.0


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población
con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por cesárea, según entidad federativa, 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos cuyas madres fueron atendidas durante el puerperio, según características seleccionadas, 1994 - 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Cobertura de atención del puerperio de
los últimos y penúltimos hijos nacidos
vivos, según entidad federativa, 1994-
1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	59.1
Aguascalientes	56.4
Baja California	70.3
Baja California Sur	74.9
Campeche	61.3
Coahuila	60.3
Colima	61.6
Chiapas	54.1
Chihuahua	74.9
Distrito Federal	81.4
Durango	51.3
Guanajuato	49.9
Guerrero	44.5
Hidalgo	58.0
Jalisco	51.4
México	63.5
Michoacán	44.9
Morelos	63.7
Nayarit	58.6
Nuevo León	69.0
Oaxaca	50.1
Puebla	53.2
Querétaro	58.3
Quintana Roo	69.4
San Luis Potosí	61.3
Sinaloa	60.6
Sonora	65.0
Tabasco	58.6
Tamaulipas	59.2
Tlaxcala	61.0
Veracruz	53.1
Yucatán	60.6
Zacatecas	53.0

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Cobertura de atención del puerperio de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos, según entidad federativa, 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

LACTANCIA MATERNA

Porcentaje de niños que nunca fueron amamantados e
indicadores de la duración de la lactancia,
1972-1976, 1982-1987 y 1994-1997

	1972-1976	1982-1987	1994-1997
Porcentaje que nunca recibió leche materna	16.8	14.9	9.6
Duración de la lactancia ^{1/}			
Primer cuartil	6.0	4.0	4.4
Mediana	12.4	12.1	9.8
Tercer cuartil	18.3	18.5	18.2

Nota: Se incluyen a los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos sobrevivientes al momento de la entrevista.

1/ El primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil corresponden al número de meses a los cuales, entre los niños que sí recibieron leche materna, el 75, 50 y 25 por ciento no habían sido destetados.

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la EMF, 1976; ENFES, 1987 y ENADID, 1997.

Porcentaje de los últimos y penúltimos
hijos sobrevivientes que fueron amamantados,
según características seleccionadas, 1994 - 1997

Total	89.9
Edad de la madre al nacimiento del hijo	
12-19	89.1
20-34	90.4
35-49	87.0
Escolaridad	
Sin escolaridad	92.9
Primaria Incompleta	89.2
Primaria Completa	89.3
Secundaria y más	89.9
Lugar de atención del parto	
Sector público	90.9
Sector privado	86.2
Casa	91.3
Lugar de residencia	
Urbano	88.8
Rural	92.4
Condición de habla de lengua indígena	
Habla	95.5
No habla	89.3


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de los últimos y penúltimos
hijos sobrevivientes que fueron
amamantados por entidad federativa,
1994-1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	89.9
Aguascalientes	86.3
Baja California	79.1
Baja California Sur	91.4
Campeche	90.8
Coahuila	87.8
Colima	92.6
Chiapas	92.5
Chihuahua	85.2
Distrito Federal	86.8
Durango	88.6
Guanajuato	89.9
Guerrero	93.6
Hidalgo	94.2
Jalisco	89.2
México	87.6
Michoacán	88.8
Morelos	93.2
Nayarit	94.0
Nuevo León	88.8
Oaxaca	96.5
Puebla	93.5
Querétaro	91.1
Quintana Roo	90.0
San Luis Potosí	89.7
Sinaloa	94.6
Sonora	91.9
Tabasco	88.1
Tamaulipas	84.6
Tlaxacala	89.6
Veracruz	91.3
Yucatán	94.8
Zacatecas	90.6

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Porcentaje de los últimos y penúltimos hijos sobrevivientes que fueron amamantados por entidad federativa, 1994-1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Duración mediana de la lactancia de los
últimos y penúltimos hijos sobrevivientes
que fueron amamantados por entidad
federativa, 1994-1997

Entidad	Porcentaje
Nacional	9.8
Aguascalientes	6.6
Baja California	5.0
Baja California Sur	9.3
Campeche	12.2
Coahuila	7.6
Colima	7.4
Chiapas	14.5
Chihuahua	5.8
Distrito Federal	6.4
Durango	7.8
Guanajuato	8.2
Guerrero	14.4
Hidalgo	14.3
Jalisco	6.7
México	8.9
Michoacán	10.5
Morelos	12.4
Nayarit	12.2
Nuevo León	6.0
Oaxaca	18.6
Puebla	12.8
Querétaro	12.1
Quintana Roo	11.8
San Luis Potosí	12.2
Sinaloa	8.4
Sonora	6.8
Tabasco	12.3
Tamaulipas	6.1
Tlaxcala	12.2
Veracruz	12.8
Yucatán	12.9
Zacatecas	12.1

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Duración mediana de la lactancia de los últimos y penúltimos hijos sobrevivientes que fueron amamantados por entidad federativa, 1994-1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.

Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos sobrevivientes
que recibieron leche materna de acuerdo a la edad a la que fueron ablactados,
según características seleccionadas, 1994 - 1997

	Meses				
	Menos de 2	2 a 3	4 a 7	8 o más	No ha ablactado
Total	34.7	31.7	25.1	3.8	4.7
Edad de la madre al nacimiento del hijo					
12-19	31.4	32.0	27.5	4.5	4.5
20-34	34.6	32.1	25.1	3.6	4.7
35-49	41.3	28.0	21.7	4.3	4.8
Escolaridad					
Sin escolaridad	25.5	25.1	30.9	11.4	7.2
Primaria Incompleta	29.2	30.0	28.9	6.4	5.5
Primaria Completa	31.7	32.0	27.5	4.0	4.8
Secundaria y más	39.8	33.3	21.6	1.4	3.9
Lugar de residencia					
Urbano	38.3	33.2	22.2	2.3	4.0
Rural	26.4	28.1	31.9	7.3	6.3
Condición de habla de lengua indígena					
Habla	21.9	20.1	38.3	11.0	8.6
No habla	36.1	33.0	23.7	3.0	4.3

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1997.


MORTALIDAD INFANTIL

Tasa de mortalidad infantil, 1950-
2000

Año	Tasa
1950	126.6
1951	126.3
1952	119.6
1953	119.5
1954	112.5
1955	109.0
1956	105.6
1957	103.0
1958	99.1
1959	96.2
1960	94.5
1961	90.5
1962	87.9
1963	85.6
1964	83.6
1965	82.0
1966	80.6
1967	79.3
1968	77.9
1969	76.4
1970	79.0
1971	73.6
1972	72.7
1973	70.8
1974	67.4
1975	64.6
1976	62.4
1977	60.2
1978	57.9
1979	55.6
1980	53.0
1981	50.2
1982	47.2
1983	44.3
1984	41.7
1985	39.8
1986	38.5
1987	37.6
1988	36.9
1989	38.7
1990	36.6
1991	34.1
1992	33.2
1993	32.3
1994	31.4
1995	30.5
1996	29.3
1997	28.1
1998	26.9
1999	25.9
2000	24.9


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población.

Tasa de mortalidad infantil, 1950-2000



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población.

Tasa de mortalidad infantil, según lugar de residencia, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990 y 1991-1995




Fuente: CONAPO, *Mortalidad*, en La Situación Demográfica de México, 1997, p.9.

Cuadro 55. Tasa de mortalidad infantil
según entidad federativa, 2000

Entidad	Tasa
Nacional	24.9
Aguascalientes	21.9
Baja California	22.0
Baja California Sur	22.1
Campeche	26.0
Coahuila	22.3
Colima	21.9
Chiapas	31.9
Chihuahua	23.4
Distrito Federal	19.8
Durango	25.7
Guanajuato	25.1
Guerrero	29.7
Hidalgo	27.4
Jalisco	22.1
México	22.0
Michoacán	25.9
Morelos	23.2
Nayarit	24.8
Nuevo León	20.9
Oaxaca	31.7
Puebla	27.6
Querétaro	24.6
Quintana Roo	23.6
San Luis Potosí	27.3
Sinaloa	24.3
Sonora	22.6
Tabasco	25.3
Tamaulipas	23.9
Tlaxcala	24.2
Veracruz	28.0
Yucatán	27.0
Zacatecas	26.8


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población.

Tasa de mortalidad infantil según entidad federativa, 2000



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población.

Tasa de mortalidad infantil por causas seleccionadas, 1990 y 1997



Fuente: SSA/DGEI, Mortalidad 1990-1997.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA

Tasa de incidencia de enfermedades sexualmente transmisibles, 1990-1998


Año	Infección gonocócica	Herpes genital	Sífilis adquirida	Candidiasis	Tricomoniasis
1990	23.2	4.4	5.7	86.8	112.4
1991	18.3	4.1	3.8	94.7	112.3
1992	21.3	3.8	3.5	105.4	118.6
1993	23.3	3.5	2.2	109.0	115.9
1994	21.8	6.6	2.2	136.5	117.8
1995	20.4	4.5	2.4	172.7	156.9
1996	17.6	4.1	2.3	173.3	140.5
1997	16.9	5.1	2.4	210.5	143.2
1998	15.6	5.0	1.8	238.6	142.1

Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Poblacion con base en:

SSA/DGE, Morbilidad Compendios y Anuarios, 1990-1998.

Tasa de incidencia de enfermedades sexualmente transmisibles, 1990-1998



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en:
SSA/DGE, Morbilidad Compendios y Anuarios, 1990-1998.

Tasa de incidencia de enfermedades sexualmente transmisibles,
por entidad federativa, 1998

Entidad	Candidiasis urogenital	Tricomoniasis urogenital	Infección gonocócica	Herpes genital	Sífilis adquirida
Nacional	238.6	142.1	15.6	5.0	1.8
Aguascalientes	178.4	168.0	13.3	1.9	0.6
Baja California	131.1	62.2	23.4	5.1	2.2
Baja California Sur	492.1	120.8	20.6	4.3	6.9
Campeche	467.2	278.8	31.0	7.0	8.6
Coahuila	141.7	69.8	10.2	3.6	1.7
Colima	334.3	220.9	5.4	11.5	2.1
Chiapas	269.5	194.2	40.3	12.6	4.1
Chihuahua	132.0	64.4	11.2	6.8	2.7
Distrito Federal	118.8	68.1	6.8	2.6	0.6
Durango	187.5	173.9	39.0	5.5	1.1
Guanajuato	173.0	131.0	4.1	1.6	0.6
Guerrero	325.6	168.7	33.2	7.9	2.6
Hidalgo	211.4	170.0	7.4	2.8	1.4
Jalisco	211.2	86.3	9.1	3.3	0.8
Edo. de México	152.6	83.3	4.7	1.4	0.4
Michoacán	237.1	179.8	20.8	3.4	0.6
Morelos	701.1	347.3	41.3	11.6	0.3
Nayarit	582.9	354.4	31.9	13.6	6.7
Nuevo León	254.6	76.0	7.8	5.5	2.9
Oaxaca	258.6	172.9	25.9	8.3	1.8
Puebla	155.5	111.3	16.0	3.8	0.6
Querétaro	253.0	166.4	10.1	3.1	0.7
Quintana Roo	340.7	224.2	36.2	20.0	13.1
San Luis Potosí	146.6	83.6	8.6	2.4	0.4
Sinaloa	349.7	136.2	14.7	7.1	3.4
Sonora	214.2	109.2	18.5	2.8	2.7
Tabasco	598.1	311.7	37.3	15.1	3.8
Tamaulipas	279.8	150.1	19.3	4.4	3.4
Tlaxcala	361.6	424.9	24.3	4.2	2.4
Veracruz	344.7	247.5	18.8	5.0	2.4
Yucatán	433.1	210.2	9.9	13.1	4.1
Zacatecas	304.9	226.1	11.8	4.3	1.0

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Poblacion con base en:


SSA/DGE, Morbilidad Compendios y Anuarios, 1998.

Casos nuevos de SIDA por año de notificación, 1990-1998

Año	Anuales	Acumulados
1990	2354	7007
1991	2274	9281
1992	3194	12475
1993	5045	17520
1994	4049	21569
1995	4296	25865
1996	4194	30059
1997	3652	33711
1998	4679	38390

Fuente: Registro Nacional de Casos de SIDA. Dirección General de Epidemiología, SSA.

Casos nuevos y acumulados de SIDA por año de notificación, 1990 - 1998




Fuente: registro Nacional de Casos de SIDA. Dirección General de Epidemiología, SSA.

Tasa de incidencia acumulada
de SIDA,
1990 - 1998

Año	Nacional
1990	8.4
1991	10.9
1992	14.3
1993	19.7
1994	23.9
1995	28.1
1996	32.1
1997	35.4
1998	39.7

Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Poblacion
con base en: SSA/DGE, Morbilidad Compendios
y Anuarios, 1990-1998.



Casos acumulados de SIDA,
según categoría de transmisión,
al 31 de diciembre de 1998


Categoría de Transmisión	Casos	Porcentaje
Total	38390	100.0
Vía sexual	23285	85.1
Homosexual	8999	32.9
Bisexual	6020	22.0
Heterosexual	8266	30.2
Vía sanguínea	3351	12.2
Transfusión	2454	9.0
Hemofílico	264	1.0
Usuario drogas intravenosa	252	0.9
Donador remunerado	373	1.4
Exposición ocupacional	8	0.0
Homosexual/drogas	204	0.7
Perinatal	525	1.9
Subtotal	27365	100.0
No Documentado	11025	28.7

Fuente: registro Nacional de Casos de SIDA. Dirección General de Epidemiología, SSA.

Tasa de mortalidad por SIDA según sexo, 1990-1997

Año	Hombres	Mujeres
1990	3.0	0.6
1991	4.0	0.7
1992	5.1	0.8
1993	6.2	1.0
1994	6.8	1.0
1995	7.8	1.0
1996	8.2	1.2
1997	7.8	1.1

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.



Distribución porcentual de las
defunciones por SIDA por grupos de edad,
según sexo, 1989-1997

	Total	Hombres	Mujeres
Total	100.0	100.0	100.0
< 1	0.5	0.3	1.8
1-4	0.6	0.4	2.1
5-14	0.8	0.5	2.4
15 - 19	1.0	0.9	1.7
20 - 24	7.9	7.6	9.7
25 - 29	18.8	19.1	17.1
30 - 34	21.7	22.2	18.2
35 - 39	17.4	17.6	15.6
40 - 44	11.4	11.5	11.1
45 - 49	7.7	7.7	7.9
50 - 64	10.2	10.2	9.9
65 y más	1.7	1.6	2.2
N.E.	0.3	0.2	0.4


Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir
de las bases de defunciones.

Tasa de incidencia anual y acumulada de SIDA por
entidad federativa, 1998

Entidad	Anual	Acumulada
Nacional	4.8	39.7
Aguascalientes	3.5	18.1
Baja California	8.4	62.2
Baja California Sur	14.0	56.2
Campeche	5.6	25.0
Coahuila	0.3	26.0
Colima	4.6	21.7
Chiapas	1.3	10.6
Chihuahua	3.0	14.6
Distrito Federal	12.1	121.6
Durango	5.9	18.6
Guanajuato	3.6	13.5
Guerrero	6.0	39.2
Hidalgo	2.1	15.8
Jalisco	7.6	67.9
México	2.9	37.5
Michoacán	4.4	29.1
Morelos	4.8	58.8
Nayarit	7.2	52.1
Nuevo León	1.8	26.4
Oaxaca	3.5	19.2
Puebla	8.2	48.3
Querétaro	5.7	20.3
Quintana Roo	2.6	21.1
San Luis Potosí	1.0	14.4
Sinaloa	2.1	20.8
Sonora	3.8	23.4
Tabasco	1.7	12.5
Tamaulipas	3.3	26.1
Tlaxcala	5.3	32.7
Veracruz	3.9	25.2
Yucatán	9.2	49.6
Zacatecas	2.2	15.0

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en:
SSA/DGE, Morbilidad Compendios y Anuarios, 1998.

Tasa de incidencia anual y acumulada de SIDA por entidad federativa, 1998




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: SSA/DGE, Morbilidad Compendios y Anuarios, 1998.

Tasa de mortalidad por SIDA según
entidad federativa, 1997

Entidad	Tasa
Nacional	4.4
Aguascalientes	2.4
Baja California	9.3
Baja California Sur	4.9
Campeche	3.1
Coahuila	2.1
Colima	6.3
Chiapas	1.9
Chihuahua	3.9
Distrito Federal	10.2
Durango	2.0
Guanajuato	1.7
Guerrero	4.5
Hidalgo	1.4
Jalisco	5.6
México	4.4
Michoacán	1.8
Morelos	6.1
Nayarit	5.6
Nuevo León	3.6
Oaxaca	2.8
Puebla	5.1
Querétaro	2.6
Quintana Roo	5.8
San Luis Potosí	2.0
Sinaloa	3.7
Sonora	2.2
Tabasco	4.2
Tamaulipas	2.8
Tlaxcala	2.5
Veracruz	4.8
Yucatán	6.0
Zacatecas	1.1

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a
partir de las bases de defunciones.

Tasa de mortalidad por SIDA según entidad federativa, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.

Lugar que ocupa el SIDA dentro de las
20 principales causas de mortalidad
general, 1997

Estado	Lugar
Nacional	15
Aguascalientes	19
Baja California	11
Baja California Sur	15
Coahuila	20
Colima	13
Campeche	17
Chiapas -	
Chihuahua	19
Distrito Federal	12
Durango -	
Guanajuato -	
Guerrero	16
Hidalgo -	
Jalisco	14
México	15
Michoacán	20
Morelos	15
Nayarit	14
Nuevo León	14
Oaxaca -	
Puebla	16
Querétaro -	
Quintana Roo	12
San Luis Potosí -	
Sinaloa	16
Sonora	20
Tabasco	16
Tamaulipas	16
Tlaxcala -	
Veracruz	17
Yucatán	15
Zacatecas -	

Fuente:SSA/DGEI, Mortalidad, 1997.

Lugar que ocupa el SIDA dentro de las 20 principales causas de mortalidad general, 1997



Fuente: SSA/DGEI, Mortalidad 1997.

Distribución porcentual de los casos acumulados de SIDA en México según categoría de tra

Entidad	Homosexua 	Bisexual	Heterosexua 	Transfusión	Hemofílico	Drogas	Don. Rem.
Nacional	32.9	22.0	30.2	9.0	1.0	0.9	1.4
Aguascalientes	29.6	23.7	34.8	7.4	0.0	0.7	2.2
Baja California	31.9	21.9	24.2	8.6	0.2	5.5	0.5
Baja California Sur	35.8	28.5	28.5	3.6	0.6	1.8	0.0
Campeche	30.4	21.4	35.7	8.0	0.0	0.9	0.0
Coahuila	35.9	29.5	24.3	4.8	2.7	1.0	0.2
Colima	38.3	20.2	26.6	10.6	1.1	0.0	2.1
Chiapas	20.5	16.6	50.4	8.9	0.6	0.0	0.0
Chihuahua	34.0	29.7	21.1	10.2	0.0	1.6	0.8
Distrito Federal	46.1	21.2	22.2	6.5	0.9	0.4	1.2
Durango	29.0	28.5	32.6	5.7	1.0	2.1	0.0
Guanajuato	27.6	23.7	32.7	10.6	1.6	0.9	0.5
Guerrero	29.7	23.5	35.7	6.5	1.0	0.6	0.4
Hidalgo	20.5	20.9	42.7	7.7	2.1	2.6	0.9
Jalisco	26.6	19.7	25.5	19.8	1.4	1.1	1.8
México	30.7	19.1	30.5	10.6	1.6	0.8	3.7
Michoacán	23.4	22.7	41.8	7.5	0.9	0.9	0.3
Morelos	22.1	22.2	35.8	12.3	0.5	0.5	2.4
Nayarit	23.2	26.7	34.2	11.7	0.5	0.2	0.2
Nuevo León	42.4	29.2	20.8	3.1	1.2	0.6	0.2
Oaxaca	25.7	26.4	37.7	6.9	0.4	0.2	0.2
Puebla	16.3	14.8	51.2	11.5	0.4	0.5	3.1
Querétaro		20.9	33.0	6.0	0.9	2.3	0.0
Quintana Roo	36.9	29.5	21.3	6.6	0.0	1.6	0.0
San Luis Potosí	28.9	31.0	27.2	7.0	0.3	0.7	0.7
Sinaloa	29.2	29.2	25.6	9.7	0.8	1.8	0.3
Sonora	30.4	24.2	27.4	7.0	0.7	5.0	0.0
Tabasco	27.7	25.0	33.2	8.7	2.2	0.5	0.5
Tamaulipas	31.5	24.6	34.3	4.7	0.7	1.2	0.7
Tlaxcala	14.0	13.2	56.0	9.3	1.6	0.4	1.9
Veracruz	32.0	26.3	33.8	4.3	0.5	0.3	0.4
Yucatán	44.9	32.7	15.6	3.0	0.7	0.6	0.1
Zacatecas	24.2	16.8	40.9	12.1	0.0	2.0	0.7

Fuente: Registro Nacional de Casos de SIDA, Dirección General de Epidemiología, SSA.

nsmisión y entidad federativa, al 31 de diciembre de 1988


Exposición Ocupacional	Homosexual/ Drogas	Perinatal	Subtotal	No documentado
0.0	0.7	1.9	71.3	28.7
0.0	0.7	0.7	79.4	20.6
0.1	3.3	3.7	57.6	42.4
0.0	0.6	0.6	74.7	25.3
0.0	0.9	2.7	65.5	34.5
0.0	0.6	1.0	80.1	19.9
0.0	0.0	1.1	83.2	16.8
0.0	0.0	3.0	86.6	13.4
0.0	1.2	1.6	59.4	40.6
0.0	0.2	1.3	68.0	32.0
0.0	0.5	0.5	69.2	30.8
0.0	0.5	1.8	67.8	32.2
0.0	1.3	1.3	83.5	16.5
0.0	0.4	2.1	66.1	33.9
0.0	1.5	2.5	64.9	35.1
0.1	0.2	2.7	60.7	39.3
0.0	0.9	1.4	88.6	11.4
0.0	0.9	3.3	84.2	15.8
0.0	1.4	1.9	87.3	12.7
0.0	1.4	1.1	82.2	17.8
0.2	0.6	1.9	79.8	20.2
0.0	0.2	1.9	93.0	7.0
0.0	0.5	2.8	78.5	21.5
0.0	0.0	4.1	75.3	24.7
0.0	1.4	2.8	85.2	14.8
0.0	0.8	2.8	75.9	24.1
0.0	4.7	0.5	78.5	21.5
0.0	0.5	1.6	78.6	21.4
0.0	0.7	1.6	61.4	38.6
0.0	0.0	3.5	82.6	17.4
0.1	0.3	2.1	61.8	38.2
0.0	0.6	1.6	83.2	16.8
0.0	1.3	2.0	70.3	29.7

Razón hombre/mujer de casos de SIDA
al 1º de enero de 1999

Estado	Razón
Nacional	6.5
Aguascalientes	9
Baja California	6
Baja California Sur	10
Campeche	5
Coahuila	10
Colima	6
Chiapas	4
Chihuahua	9
Distrito Federal	9
Durango	9
Guanajuato	6
Guerrero	7
Hidalgo	4
Jalisco	4
México	5
Michoacán	6
Morelos	3
Nayarit	5
Nuevo León	14
Oaxaca	7
Puebla	3
Quintana Roo	6
Quintana Roo	8
San Luis Potosí	6
Sinaloa	6
Sonora	9
Tabasco	9
Tamaulipas	7
Tlaxcala	3
Veracruz	7
Yucatán	9
Zacatecas	7

Fuente: Registro Nacional de Casos de SIDA, Dirección General de Epidemiología, SSA.

Razón hombre/mujer de casos de SIDA al 1º de enero de 1999



Fuente: Registro Nacional de Casos de SIDA, Dirección General de Epidemiología, SSA.


CANCER CÉRVICO UTERINO Y DE LA MAMA

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino, 1990 - 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino según grupos de edad, 1995-1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico
uterino según entidad federativa, 1997

Estado	Cáncer cérvicouterino
Nacional	20.9
Aguascalientes	16.1
Baja California	19.3
Baja California Sur	15.9
Campeche	27.4
Coahuila	17.2
Colima	28.1
Chiapas	27.4
Chihuahua	22.4
Distrito Federal	15.1
Durango	16.8
Guanajuato	17.1
Guerrero	23.3
Hidalgo	16.5
Jalisco	20.4
México	15.8
Michoacán	27.2
Morelos	26.9
Nayarit	31.5
Nuevo León	14.8
Oaxaca	29.9
Puebla	22.4
Querétaro	17.9
Quintana Roo	17.2
San Luis Potosí	24.3
Sinaloa	18.3
Sonora	19.2
Tabasco	28.3
Tamaulipas	23.8
Tlaxcala	24.6
Veracruz	28.1
Yucatán	30.4
Zacatecas	14.8

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de
Población a partir de las bases de defunciones.

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino según entidad federativa, 1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.

Tasa de mortalidad por cáncer de la mama, 1990 - 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.

Tasa de mortalidad por cáncer de la mama según grupos de edad, 1995-1997




Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.

Tasa de mortalidad por cáncer de la
mama según entidad federativa,
1997

Estado	Cáncer de la mama
Nacional	14.8
Aguascalientes	21.1
Baja California	12.9
Baja California Sur	15.9
Campeche	11.2
Coahuila	18.7
Colima	20.5
Chiapas	8.4
Chihuahua	15.2
Distrito Federal	23.2
Durango	12.4
Guanajuato	13.2
Guerrero	10.1
Hidalgo	11.5
Jalisco	20.1
México	11.6
Michoacán	13.0
Morelos	10.4
Nayarit	12.3
Nuevo León	22.1
Oaxaca	9.4
Puebla	10.6
Querétaro	13.3
Quintana Roo	4.6
San Luis Potosí	9.0
Sinaloa	16.7
Sonora	21.2
Tabasco	9.7
Tamaulipas	19.7
Tlaxcala	13.3
Veracruz	11.0
Yucatán	14.2
Zacatecas	12.8

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de
Población a partir de las bases de defunciones.

Tasa de mortalidad por cáncer de la mama según entidad federativa, 1997



Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de defunciones.